

护士执业资格考试万人大模考

1. 用环氧乙烷消毒灭菌时，操作错误的是
 - A. 环氧乙烷应放在阴凉通风，无火源及明火处
 - B. 环氧乙烷可用于乙肝患者污染的光学仪器的消毒灭菌
 - C. 储存温度应低于 40°C
 - D. 环氧乙烷可用于化纤织物的消毒灭菌
 - E. 灭菌后的物品可直接使用
2. 1:5 000 高锰酸钾溶液在治疗外阴炎时的最主要作用是
 - A. 杀菌
 - B. 止痒
 - C. 解毒
 - D. 清洁
 - E. 防腐
3. 关于护理目标与护理诊断关系的论述错误的是
 - A. 护理目标是针对护理诊断制定的
 - B. 一个目标来自一个护理诊断
 - C. 一个护理诊断可以有多个护理目标
 - D. 护理诊断与护理目标之间的差距需选择适当的措施加以解决
 - E. 护理目标的实现程度是衡量护理诊断正确性的标志
4. 传染科，护士为患者及家属进行环境介绍时，应告知患者及家属以下属于半污染区的是
 - A. 药房
 - B. 治疗室
 - C. 配膳室
 - D. 患者浴室
 - E. 病区内走廊
5. 直接输血 200 mL，加入 3.8% 枸橼酸钠溶液的量应为
 - A. 8 mL
 - B. 10 mL
 - C. 16 mL
 - D. 20 mL
 - E. 24 mL
6. 对“剪切力”的描述错误的是
 - A. 剪切力是两层组织相邻表面间的滑行产生进行性的相对移位所引起
 - B. 皮肤擦伤后受到汗液浸渍而发生褥疮，该现象是剪切力的作用结果
 - C. 剪切力是造成褥疮的三个主要物理力之一
 - D. 剪切力是由摩擦力和压力相加而成
 - E. 剪切力与体位关系密切
7. 某传染病病室，长 5 m、宽 4 m，高 4 m，用食醋进行室内消毒，食醋用量是
 - A. 400~800 mL
 - B. 800~1 000 mL
 - C. 1 000~1 250 mL

- D. 1 250~1 500 mL
E. 1 500~1 750 mL
8. 严重心源性呼吸困难患者被迫采取端坐位，可减轻呼吸困难，其原因是
- A. 减轻肺循环淤血
 - B. 减轻下腔静脉淤血
 - C. 减轻肠系膜静脉淤血
 - D. 减轻门静脉淤血
 - E. 减轻上腔静脉淤血
9. 心房颤动心电图的典型表现是
- A. 大小形态及规律不一的 f 波替代窦性 P 波，QRS 波形态正常，R-R 间隔不等
 - B. P 波消失，呈现完全不规律的波浪状曲线
 - C. P 波正常，QRS 波群与 T 波消失，呈现相对规律快速大幅波动
 - D. P 波倒置，QRS 波形态正常
 - E. P 波正常，QRS 波宽大畸形
10. 洋地黄类药物的常见心血管系统毒性反应为各种心律失常，其中最常见的是
- A. 窦性心动过缓
 - B. III度房室传导阻塞
 - C. 室性期前收缩多成二联律、三联律
 - D. 长期房颤者心律变得规律
 - E. 恶心、呕吐，视力模糊
11. 执行胃溃疡患者的医嘱时，使用前应着重与医生进行沟通的药物是
- A. 胃复安
 - B. 硫糖铝
 - C. 奥美拉唑
 - D. 强的松
 - E. 多潘立酮
12. 为胃溃疡穿孔的患者行腹穿，其抽出液是
- A. 黄色，浑浊，无臭味，可有食物残渣
 - B. 暗红色血性液
 - C. 稀脓性略带臭味
 - D. 淡黄色透明液体
 - E. 血性，胰淀粉酶含量增高
13. 消化性溃疡患者应在餐前 0.5~1 小时服用的药物是
- A. 铝碳酸镁
 - B. 西咪替丁
 - C. 法莫替丁
 - D. 枸橼酸铋钾
 - E. 奥美拉唑
14. 为一胸腔闭式引流的患者拔管，拔管时应嘱患者
- A. 深吸气后屏气
 - B. 深呼气后屏气
 - C. 正常呼吸
 - D. 浅呼气后屏气
 - E. 浅吸气后屏气

15. 护理痰液过多且无力咳嗽的病人，为防止其窒息，在翻身前护士首先应
- 给病人吸氧
 - 给病人吸痰
 - 指导病人有效咳嗽
 - 给病人漱口
 - 慢慢移动病人
16. 夜班护士在巡视病房时，发现一气胸病人胸腔闭式引流管脱出，首先要措施是
- 立即报告医生
 - 用厚层无菌凡士林纱布封闭引流口
 - 把脱出的引流管重新插入
 - 给病人吸氧
 - 急送手术室处理
17. 患急性细菌性痢疾，每天排脓血便 7~8 次，下述护理措施错误的是
- 需执行接触隔离
 - 排便后用软纸擦拭肛门
 - 温水局部坐浴后肛门涂凡士林
 - 鼓励患者多饮水，卧床休息
 - 补充电解质
18. 下列关于骨盆的径线的说法不正确的是
- 骶耻内径是指从骶岬下缘中点到耻骨联合下缘的距离
 - 骶耻外径指第 5 腰椎棘突至耻骨联合上缘中点的距离
 - 髂棘间径指两侧髂前上棘外缘的距离
 - 坐骨棘间径指两侧坐骨棘之间的距离
 - 坐骨结节间径是指两侧坐骨结节之间的距离
19. 产褥期妇女，生殖系统的恢复正确的是
- 产后第 1 天子宫底位于脐下，以后每日下降 1~2 cm
 - 产后 1 周子宫降至盆腔内
 - 产后 3 周子宫颈完全恢复至非孕状态
 - 产后 6 周无胎盘附着面完全修复
 - 产后 6 周胎盘附着面完全修复
20. 护士向急性肾小球肾炎患儿家长介绍疾病预防的相关知识，告诉其防治该疾病的关键是
- 避免受寒着凉
 - 增强机体抵抗力，防治链球菌感染
 - 合理安排休息与活动
 - 避免过度劳累
 - 注意保暖
21. 强迫症和精神分裂症的强迫症状最主要的不同点是
- 强迫症状的刻板性与重复性
 - 强迫症状的多变、泛化
 - 强迫症状的异己感
 - 强迫内容的多样性
 - 强迫症状出现的年龄
22. 破伤风病人在应用镇静药后应集中采取护理的目的是
- 提高工作效率

- B. 增强治疗和护理效果
C. 减少毒素的中和
D. 减少刺激引起的抽搐
E. 防止交叉感染
23. 肉芽组织水肿创面换药时宜用
A. 生理盐水纱布湿敷
B. 油纱布覆盖
C. 双氧水纱布湿敷
D. 3%~5%高渗盐水纱布湿敷
E. 酒精纱布湿敷
24. 下列关于化脓性关节炎的叙述不正确的是
A. 好发于髋关节和膝关节
B. 溶血性链球菌为主要致病菌
C. 病变关节处疼痛剧烈
D. 膝化脓性关节炎浮髌试验(+)
E. 急性期患肢制动
25. 食管癌食管明显梗阻的病人术前减轻食管黏膜水肿的措施是
A. 术前禁食
B. 营养支持
C. 纠正水、电解质、酸碱失衡
D. 加强口腔卫生
E. 术前三天抗生素生理盐水冲洗食管
26. 确诊宫颈癌最可靠的检查方法是
A. 碘试验
B. 阴道镜检查
C. B超
D. 宫颈刮片细胞学检查
E. 宫颈和宫颈管活体组织检查
27. 治疗营养性缺铁性贫血铁剂服用的时间是
A. 血红蛋白正常后停药
B. 血红蛋白正常后2周停药
C. 血红蛋白正常后1个月停药
D. 血红蛋白正常后2个月停药
E. 血红蛋白正常后3个月停药
28. 关于癫痫发病特点的叙述不正确的是
A. 具有突发性和重复性的特点
B. 癫痫持续状态是该病的特殊情况死亡率为50%
C. 是一组由于大脑神经元突然异常放电，而造成短暂性大脑功能失常的临床综合症
D. 大脑功能异常可表现为运动、感觉、意识、行为、自主神经等不同障碍
E. 发病机制涉及神经系统的内在性质迄今无全面、一致的了解
29. 关于口服避孕药的避孕原理，不恰当的是
A. 抑制排卵
B. 改变输卵管功能
C. 抑制子宫内膜增生

- D. 改变子宫黏液性状
E. 改变阴道分泌物性状
30. 最能反映婴儿营养状况的体格发育指标
- A. 身长
B. 胸围
C. 头围
D. 体重
E. 上臂围
31. 正常情况 7 个月的小儿尚未接种过的疫苗是
- A. 卡介苗
B. 麻疹疫苗
C. 脊髓灰质炎疫苗
D. 乙肝疫苗
E. 百白破疫苗
32. “未病先防”的特点，应除外
- A. 顺应自然
B. 锻炼身体
C. 调节饮食
D. 人工免疫
E. 早期诊治
33. 中药的四气是指
- A. 中药的四种特殊气味
B. 寒凉药具有散寒、助阳的作用
C. 中药的寒、热、温、凉四种药性
D. 中药的辛、咸、甘、苦四种味道
E. 温热药具有清热、解毒的作用
34. 某护专科毕业生进入某综合医院工作，欲申请护士执业注册，不符合申请条件的是
- A. 高中毕业后获得护理专业函授学历
B. 申请人年龄为 19 周岁
C. 在三级综合医院有 8 个月护理临床实习经验
D. 申请人身高 155 cm
E. 双眼裸眼视力分别为 0.7 和 0.8
35. 以下哪项行为不属于护士行为规范要求的内容
- A. 积极与患者进行有效的沟通
B. 积极与患者亲属进行沟通
C. 积极化解患者与医务人员的矛盾
D. 积极帮助患者选择治疗方案
E. 积极协助患者进行康复
36. 可以促进有效沟通的行为是
- A. 按病人叙述内容转移展开的话题
B. 不评论病人所谈内容
C. 避免长时间的倾听，及时插话
D. 全神贯注，保持目光的接触
E. 病人担心疾病预后时可做出保证

37. 在进行沟通时，影响沟通并使对方产生不信任感的行为是
- A. 不时评论对方所谈内容
 - B. 言语简单明确
 - C. 两眼注视对方
 - D. 倾听中特别注意对方的“弦外音”
 - E. 全神贯注的倾听
38. 患者说：“我每顿都喝一杯酒！”护士问：“请您告诉我您的杯子有多大？”护士在沟通中运用到的沟通技巧是
- A. 重述
 - B. 总结
 - C. 澄清
 - D. 反映
 - E. 阐释
39. 护士小张正在为一位拟行子宫肌瘤摘除术的患者进行术前导尿，当初消毒结束时小张不慎将手套划破。你认为护士应如何处理
- A. 立即更换无菌手套
 - B. 用无菌治疗巾包裹手指操作
 - C. 重新初消毒
 - D. 脱掉手套，洗手或消毒手后继续操作
 - E. 继续戴着划破的手套开展操作
40. 患者，女，70岁。右侧肢体偏瘫，护士为患者进行床上擦浴，错误的做法是
- A. 室温应保持在24℃
 - B. 水温40~45℃
 - C. 脱衣时先左侧后右侧
 - D. 穿衣时先右侧后左侧
 - E. 骨突处用50%乙醇按摩
41. 患者，女，30岁。外伤后昏迷伴尿路感染。医嘱尿培养，留取尿标本的正确方法是
- A. 导尿管留取
 - B. 留取前段尿
 - C. 留取晨尿
 - D. 采集24小时尿
 - E. 留取12小时尿
42. 患者，女，35岁。因高热3天伴呼吸困难转入院。护理病历显示近3天体温维持在39~40℃。为进一步诊断，遵医嘱查血沉、心肌酶及进行血培养。护士在检查血沉标本时，应选用的试管是
- A. 石蜡油试管
 - B. 无菌试管
 - C. 血培养瓶
 - D. 抗凝试管
 - E. 干燥试管
43. 患儿，男，5岁。白血病入院治疗。今晨面色潮红、口唇干燥、呼吸和脉搏加快测体温为39.6℃。无寒战。适宜的物理降温方式为
- A. 乙醇拭浴
 - B. 冷盐水灌肠
 - C. 头部戴冰帽

- D. 温水拭浴
- E. 颈部置冰袋
44. 患者男，55岁，以腹泻急诊入院，确诊为霍乱。因病情严重，最终患者死亡。对此患者的尸体处理正确的是
- A. 立即火化
- B. 停尸屉内冷藏保存待检
- C. 立即进行卫生处理，就近火化
- D. 上报卫生防疫部门批准后火化
- E. 立即进行卫生处理交给家属
45. 患者，男性，长期卧床，自理困难，最近护理时发现骶尾皮肤发红，除去压力无法恢复原来肤色，根据患者的情况，护士采取的护理措施应除外
- A. 定时用 50% 乙醇按摩受压部位
- B. 定时变换体位
- C. 温水擦浴，
- D. 保持床铺无渣屑
- E. 防止床褥潮湿
46. 患者女性，2岁。因误服安眠药中毒，意识模糊不清，呼吸微弱，浅而慢，不易观察，护士应采取的测量方法是
- A. 观察腹部起伏，一起一伏为一次
- B. 先测脉率，将数值除以 4 得出呼吸次数
- C. 用手放在患者鼻孔前感觉呼吸气流计数
- D. 测脉率后保持诊脉姿势，观察胸部起伏次数
- E. 用少许棉花置患者鼻孔前观察棉花飘动
47. 患者，女，41岁。患有肥厚型心肌病，因胸痛 1 小时急诊入院，首要的护理措施是
- A. 预防呼吸道感染
- B. 建立静脉通路
- C. 给予高热量饮食
- D. 给予 1~2 L/min 吸氧
- E. 立即停止活动，卧床休息
48. 患者女性，59岁。风心病伴二尖瓣狭窄 6 年，伴心房颤动 5 年，无明显原因突然出现意识障碍，最可能的原因是
- A. 发生室颤
- B. 心排出量减少，脑供血不足
- C. 心房血栓脱落，脑栓塞
- D. 高凝状态，脑血栓形成
- E. 短暂性脑缺血发作
49. 患者男性，66岁。胸痛 2 小时，诊断为急性心肌梗死，给予急诊溶栓治疗，下列对直接诊断冠脉再通最有价值的是
- A. 胸痛 2 小时内基本消失
- B. 冠脉造影示闭塞动脉再通
- C. 心电图抬高 ST 段回降 > 50%
- D. 血清心肌酶峰值提前
- E. 2 小时内出现再灌注性心律失常

50. 患者，男，65岁。发生急性心肌梗死3小时入院，既往有高血压病史。下列哪种情况提示该患者可溶栓治疗
- A. 曾患过出血性脑卒中
 - B. 近1个月内发生过胃出血
 - C. 目前高血压1级
 - D. 超声疑有主动脉夹层
 - E. 肝功能异常，大三阳
51. 患者，女，风湿性心瓣膜病，二尖瓣狭窄。心电图提示出现心律失常，最常发生的应是
- A. 心律不齐
 - B. 房性期前收缩
 - C. 窦速
 - D. 房颤
 - E. 室性期前收缩
52. 患者，男，62岁。心前区压榨样疼痛3小时不缓解，伴冷汗、恐惧，急诊就医。下列措施中哪项不妥
- A. 拍X线胸片
 - B. 抽血送检
 - C. 查体
 - D. 心电监护
 - E. 监测血压
53. 患者，男性，56岁。突然心悸、气促，咳粉红色泡沫痰，病人被迫端坐位，大汗淋漓，护士应首先准备哪组药物
- A. 西地兰，硝酸甘油，异丙肾上腺素
 - B. 硝普钠，西地兰，呋塞米
 - C. 毒毛花苷K，硝普钠，普萘洛尔
 - D. 胍乙啶，酚妥拉明，西地兰
 - E. 硝酸甘油，西地兰，多巴胺
54. 患者，女性，60岁。突发心慌气短，胸闷，来院急诊。检查：心率120次/分，脉率110次/分，心律不齐，心音强弱不定。应考虑
- A. 室性心动过速
 - B. 室上性心动过速
 - C. 窦性心动过速
 - D. 心室颤动
 - E. 心房颤动
55. 患者，男性，40岁。患急性心包炎，心包积液2月余，近几日出现咳嗽、活动后气促，有心绞痛样胸痛。体检：有颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿、心率增快，可见Kussmaul征。考虑诊断为
- A. 亚急性心包炎
 - B. 急性心包炎
 - C. 缩窄性心包炎
 - D. 纤维蛋白性心包炎
 - E. 渗出性心包炎
56. 患者，女，30岁。消化性溃疡患者，给予奥美拉唑+枸橼酸铋钾+克拉霉素+阿莫西林四联治疗期间出现黑便，但粪便隐血试验报告为阴性。护士判断患者出现黑便的原因是
- A. 溃疡出血
 - B. 奥美拉唑不良反应

- C. 枸橼酸铋钾不良反应
D. 克拉霉素不良反应
E. 服用铁剂
57. 患者，女，35岁。十二指肠球部溃疡并发瘢痕性幽门梗阻，反复呕吐宿食，消瘦，皮肤干燥，弹性下降。经术前准备，拟在全麻下行胃大部切除术。若术后并发胃肠吻合口出血，护士可最早观察到的表现是
- A. 脉搏细速，血压下降
B. 尿量减少，血压改变不明显
C. 焦虑不安，呼吸浅快
D. 心悸，头晕，目眩
E. 胃管内引流大量血液
58. 患者，女，37岁。患胃溃疡病5年，近半月胃区疼痛。发病前饱食并少量饮酒，饭后5分钟突然腹痛，痛如刀割，腹呈板状，来院急诊。对该患者最简单、有效的检查方法是
- A. 腹部B超
B. 查血钙
C. 腹部X线检查
D. 查血清脂肪酶
E. 查血清淀粉酶
59. 患者，女，42岁。排便时有一组织团块脱出，便后可自行回纳，伴无痛性出血。对脱出肛门的组织团块进行视诊时，患者应采取的体位是
- A. 右侧卧位
B. 左侧卧位
C. 蹲位
D. 截石位
E. 膝胸位
60. 患者，男，40岁。畏寒、高热，右上腹痛7天，巩膜轻度黄染，右季肋区饱满有叩痛，肝右肋下2cm，B超提示肝区单个较大液性暗区。该患者最可能出现了
- A. 亚急性肝炎
B. 慢性肝炎
C. 急性肝炎
D. 细菌性肝脓肿
E. 阿米巴性肝脓肿
61. 患者，男，42岁。反复发作右上腹痛、向右肩背放射2个月。查体：右上腹轻度压痛，肝不大，未扪及包块。首选的检查是
- A. 静脉胆管造影
B. 腹部CT扫描
C. 腹部B超
D. 纤维胆道镜检查
E. 经皮肝胆管造影(PTC)
62. 患者，男，45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物时，护士应提出质疑
- A. 氢氧化铝凝胶
B. 口服补盐液
C. 奥美拉唑
D. 枸橼酸铋钾
E. 克拉霉素

63. 患者男, 55 岁。因胃溃疡行胃大部切除术。术后发生并发症倾倒综合征, 患者询问原因, 护士正确的解释是

- A. 胃酶缺乏
- B. 肝脏产生肝糖原过量
- C. 肠道分泌消化酶不足
- D. 肠道分泌消化酶过量
- E. 胃内容物迅速排空进入小肠

64. 患者, 男, 50 岁。肝硬化病史 5 年。1 小时前突然呕血约 600 mL, 昏倒, 急送医院。体检: 血压 70/50 mmHg, 脉搏 125 次/分, 此时最有效的止血措施是

- A. 冷盐水冲洗
- B. 立即补充血容量
- C. 三腔二囊管压迫止血
- D. 禁食、胃肠减压
- E. 服用血管加压素

65. 患者, 女, 25 岁。上消化道出血入院 2 天, 已行三腔管止血, 今晨护士接班时, 注意到患者出血已停止, 接下来可采取的处理措施是

- A. 放气数分钟再注气加压
- B. 可进行鼻饲
- C. 遵医嘱拔管
- D. 放气留观 24 小时
- E. 拔出三腔二囊管, 改为静脉点滴奥美拉唑

66. 患者, 男, 68 岁。患 COPD 十余年。今日因呼吸困难就诊, 医生诊断为并发 II 型呼吸衰竭。下列表现哪个与病情不符合

- A. 皮肤干燥
- B. 头痛、头晕
- C. 球结膜水肿
- D. 神经精神症状
- E. 呼吸深快

67. 某甲状腺功能亢进患者, 既往有哮喘病史, 在制定治疗方案时, 应禁用的药物是

- A. 甲硫氧嘧啶
- B. 甲亢平
- C. 地西洋
- D. 丙硫氧嘧啶
- E. 普萘洛尔

68. 患者, 男, 65 岁。因气喘就诊, 医生查体后诊断为慢性阻塞性肺气肿, 符合慢性阻塞性肺气肿的体征是

- A. 叩诊呈鼓音
- B. 单侧语音震颤减弱
- C. 单侧呼吸运动减弱
- D. 气管偏移
- E. 呼气时间延长

69. 患者, 男, 23 岁。支气管扩张 8 年。近日因上呼吸道感染咳嗽剧烈, 有大量黄色脓痰。胸部 X 线显示病变位于右肺下叶, 体位引流时护士应指导患者采取

- A. 左侧卧位, 头高脚低
- B. 左侧卧位, 头低脚高

- C. 右侧卧位，头高脚低
D. 右侧卧位，头低脚高
E. 半坐卧位
70. 患者，男，35岁。常常在晨起及晚间躺下时咳大量脓痰，伴少量鲜血，痰液放置后可分层，可能的诊断是
- A. 慢性支气管炎
B. 肺癌
C. 肺结核
D. 支气管扩张症
E. 肺气肿
71. 患者，女性，16岁。支气管哮喘发作1小时，烦躁、发绀，呼吸26次/分，心率120次/分，心律齐，以下哪项措施不当
- A. 协助病人采取舒适坐位
B. 吸氧3 L/min
C. 守候病人床旁，安慰病人
D. 忌用普萘洛尔
E. 禁用糖皮质激素
72. 患者，男，67岁。因肺癌行双肺叶切除术后给予胸膜腔闭式引流。护士巡视时，发现患者出现胸腔活动性出血。护士判断的依据是引流血量
- A. 150 mL/h
B. 200 mL/h
C. 250 mL/h
D. 300 mL/h
E. 500 mL/h
73. 患者，男，36岁。曾在幼时患麻疹，长期咳嗽、咳痰，痰可分层。患者到医院就医，其典型X线表现为
- A. 片状阴影
B. 不规则的蜂窝状或卷发状阴影
C. 条索状阴影
D. 斑点状阴影
E. 肺纹理增粗
74. 患儿，女，4岁。3天前受凉后，出现发热、声音嘶哑、喉鸣和吸气性呼吸困难，双肺可闻及喉传导音或管状呼吸音，心率加快，该患儿最可能的诊断是
- A. 上呼吸道感染
B. 支气管炎
C. 支气管肺炎
D. 急性感染性喉炎
E. 肺炎合并心衰
75. 患儿，女，1岁半。近来每日午后发热、咳嗽、盗汗、啼哭，X线检查示右侧肺门阴影，现结核菌素试验检查呈强阳性反应，提示患儿
- A. 新近感染活动性肺结核
B. 曾有过结核感染
C. 营养不良
D. 皮肤过敏反应
E. 应用糖皮质激素

76. 1 名青年男性在每年员工例行体检时发现 HBsAg 阳性, 判断他是乙肝病毒携带者还是患病者的检查指标是
- A. HBeAg
 - B. HBsAg
 - C. 抗 HBe
 - D. HBcAg
 - E. 丙氨酸氨基转移酶
77. 患儿, 5 岁。双侧腮腺肿大, 表面不红, 有触痛。针对该患儿的护理措施不足的是
- A. 多进食水果、果汁
 - B. 肿胀处醋调青黛散外敷
 - C. 忌酸、辣、干、硬食物
 - D. 温盐水漱口, 保持口腔清洁
 - E. 肿胀处冷敷
78. 患者, 男性, 32 岁。右手部外伤 2 天后, 伤口感染, 伴体温升高, 右侧腋窝部可见一 4 c m 直径的肿块, 质韧、压痛、无波动感, 皮肤红、肿、热。血白细胞 $15 \times 10^9 / L$, 中性粒细胞 89%, 该患者考虑为
- A. 急性淋巴结炎
 - B. 急性蜂窝织炎
 - C. 丹毒
 - D. 急性淋巴管炎
 - E. 右腋窝部脓肿
79. 某孕妇, 27 岁。孕 39 周, 因头痛、眼花、恶心、呕吐就诊。测血压 170/115 mmHg, 尿蛋白(+++), 呼吸、脉搏正常, 以“先兆子病”收入院。遵医嘱予硫酸镁治疗, 医师停药的指征是
- A. 呼吸 20 次/分
 - B. 心率 72 次/分
 - C. 膝反射消失
 - D. 血压 120/75 mmHg
 - E. 尿量 1500 mL/24 h
80. 产妇, 24 岁。妊娠 40 周分娩, 在会阴侧切下顺产一活婴。胎盘胎膜已完整娩出, 产后 30 分钟阴道出血增多, 测血压 90/60 mmHg, P 90 次/分钟, 宫底位于脐上 3 横指, 子宫软, 按压宫底排出血液及血块约 600 mL。首要的处理原则是
- A. 抗休克
 - B. 抗感染
 - C. 加强宫缩
 - D. 检查软产道
 - E. 清理宫腔
81. 初孕妇, 孕 28 周。今晨被车撞伤, 持续性腹痛伴阴道少量出血。查体: 子宫硬如板状, 有压痛, 宫底位于脐 1 横指。子宫处于高张状态。首先考虑的情况是
- A. 胎盘早剥
 - B. 子宫破裂
 - C. 先兆早产
 - D. 难免流产
 - E. 先兆子宫破裂
82. 产妇, 胎儿娩出后数分钟胎盘娩出, 阴道持续出血, 检查发现胎盘有缺损。首选护理措施是
- A. 按摩子宫

- B. 清宫
C. 按摩子宫，并肌肉注射宫缩剂
D. 积极术前准备
E. 抗凝治疗
83. 某新生儿，日龄 5 天，出生体重 3 kg，目前体重 2.8 kg，妈妈很担心孩子的体重会继续下降，护士向妈妈解释孩子的体重将恢复正常，下列解释正确的是
- A. 1 天内恢复正常
B. 6 天内恢复正常
C. 10 天内恢复正常
D. 2 周内恢复正常
E. 3 周内恢复正常
84. 足月儿，出生后医生检查前囟张力稍高，拥抱、吸吮反射减弱，瞳孔缩小，对光反应迟钝，上肢肌张力减退较下肢重。诊断为新生儿缺氧缺血性脑病并采取相应治疗措施。新生儿缺氧缺血性脑病的治疗方法中除外
- A. 供氧
B. 苯巴比妥控制惊厥
C. 青霉素抗感染
D. 脱水剂
E. 康复干预
85. 患者，女，29 岁。泌尿系感染。拟采集中段尿做细菌学培养，不正确的操作是
- A. 温水清洗外阴
B. 0.1% 苯扎溴铵消毒尿道口
C. 排尿不中断
D. 弃前、弃后、留中段尿
E. 取无菌试管，留取尿量 < 5 mL
86. 患者，男，80 岁。患帕金森病 8 年，行走时以碎步、前冲动作为主，自觉害怕。护士指导患者行走时应避免
- A. 双臂自然摆动
B. 尽量跨大步
C. 目视前方
D. 足跟先着地
E. 将注意力集中于地面
87. 患者，女，27 岁。1 年多来为“唱歌的敲门声”困扰。一听到有人敲门的声响，就同时听到有人在唱歌，而敲门声停了同时歌声也停了。该患者最可能的症状是
- A. 功能性幻听
B. 联想障碍
C. 错觉
D. 被害妄想
E. 内脏性幻觉
88. 患者，女性，32 岁。急性有机磷中毒，使用阿托品治疗，出现以下那种情况时应减少阿托品剂量
- A. 口干
B. 心率加快
C. 颜面潮红
D. 瞳孔较前扩大

E. 以上都是

89. 患者，女性，41岁。开水烫伤1小时。检查见面、胸腹部、右上肢、臀部Ⅱ度及Ⅲ度烫伤，左下肢三个手掌大小面积Ⅱ度烫伤。该患者烧伤面积约为

- A. 43%
- B. 33%
- C. 34%
- D. 35%
- E. 47%

90. 患者，男性，41岁。炎热夏天，天气闷热，在外面连续工作数小时，由于大量出汗导致失水、失钠等引起的周围循环灌注不足，体温基本正常，该患者发生了

- A. 热痉挛
- B. 热衰竭
- C. 热射病
- D. 日射病
- E. 中暑痉挛

91. 患者，男，30岁。右侧胸外伤后，出现吸气时胸壁内陷，呼气时外凸，呼吸困难，发绀，应考虑

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 多根多处肋骨骨折
- D. 单根单处肋骨骨折
- E. 张力性气胸

92. 8岁患儿胫骨中段骨折拆除石膏绷带后，发现小腿肌萎缩，膝关节屈伸范围减小考虑发生了下列哪项并发症

- A. 骨化性肌炎
- B. 缺血性肌挛缩
- C. 关节僵硬
- D. 关节强直
- E. 神经损伤

93. 男性病人，食管癌切除，食管胃吻合术后第5天，突然出现寒战，高热、呼吸困难、胸痛，WBC $20 \times 10^9/L$ ，高度怀疑发生了

- A. 肺炎、肺不张
- B. 吻合口瘘
- C. 吻合口狭窄
- D. 出血
- E. 乳糜胸

94. 患者女，37岁。患有绒毛膜癌。咳嗽、咯血近1周，胸片显示左肺上叶有一个4 cm×4 cm阴影，该患者可能发生了

- A. 肺炎
- B. 肺转移
- C. 肺结核
- D. 脑转移
- E. 胸腔转移

95. 患者女，40岁。侵蚀性葡萄胎，给予5-氟尿嘧啶和更生霉素联合化疗8天。该患者可能出现的最严重不良反应是

- A. 骨髓抑制
B. 出血性膀胱炎
C. 口腔溃疡
D. 恶心、呕吐
E. 复发
96. 患者，女性，35岁，再生障碍性贫血病人，出现高热，伴抽搐，此时，最合适的降温措施是
A. 温水擦浴
B. 酒精擦浴
C. 冰水灌肠
D. 口服退热剂
E. 头部及大血管处放置冰袋
97. 患者，女性，39岁。因甲状腺功能亢进服用丙硫氧嘧啶治疗，2个月后出现药物反应。下列需停药观察的重要指征是
A. 出现皮疹
B. 中性粒细胞 $<1.5 \times 10^9/L$
C. 突眼加重
D. 头晕、乏力
E. 胃肠道反应
98. 某2型糖尿病人，体态肥胖，“三多一少”症状不太明显，血糖偏高，长期采用饮食控制和口服降糖药物治疗，但血糖仍偏高，针对此病人最应增加的措施是
A. 加大胰岛素剂量
B. 注射胰岛素
C. 运动疗法
D. 应用抗生素
E. 碳酸氢钠
99. 患者女，32岁。车祸后出现颅脑损伤，双侧瞳孔时大时小，变化不定，提示可能是
A. 小脑幕切迹疝
B. 脑干缺血
C. 枕骨大孔疝
D. 颅内血肿
E. 颅内压增高
100. 患者，女性，62岁。高血压病史30余年。活动后出现头痛，检查发现右侧偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲，诊断为脑出血。其出血部位最可能是
A. 小脑
B. 左侧脑桥
C. 右侧脑桥
D. 左侧内囊
E. 右侧内囊
- (101~102题共用题干)
- 患者，女，16岁。急性阑尾炎住院治疗，临近中考，因担心住院影响复习和考试，忧心忡忡，不能安心休养，不利于身体康复
101. 此时患者出现了角色适应中的
A. 角色行为缺如
B. 角色行为冲突

- C. 角色行为强化
- D. 角色行为消退
- E. 角色行为紊乱

102. 目前影响该患者角色适应的主要因素是

- A. 医院制度
- B. 疾病的性质
- C. 症状的可见性
- D. 疾病的严重程度
- E. 患者的社会特征

(103~105 共用题干)

吴先生，患血友病，在输血过程中出现头部胀痛、四肢麻木、腰背剧痛、黄疸、血压下降等症状。

103. 此病人因输血发生了

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 枸橼酸钠中毒反应
- E. 急性肺水肿

104. 病人尿液中可含有

- A. 红细胞
- B. 大量白细胞
- C. 大量上皮细胞
- D. 血红蛋白
- E. 胆红素

105. 对病人护理，下列哪项不妥

- A. 停止输血，与医生联系
- B. 滴注碳酸氢钠，碱化尿液
- C. 静脉注射 10% 葡萄糖酸钙
- D. 双侧腰部封闭
- E. 密切观察生命体征和尿量

(106~108 共用题干)

患儿，女，3岁。自幼发现心脏病杂音，经常患肺炎，查体胸骨左缘第3~4肋间IV级粗糙收缩杂音，心电图左室及右室均肥大，X线肺血多。

106. 所患疾病可能是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

107. 患儿出现心力衰竭时，正确的饮食指导是

- A. 低脂饮食
- B. 低盐饮食
- C. 半流食
- D. 普通饮食
- E. 无渣饮食

108. 如果患儿服用强心苷，正确的护理是

- A. 服药前数脉搏
- B. 服药后数脉搏
- C. 药物饭中服用
- D. 药物饭后服用
- E. 与果汁同时服用

(109~110 题共用题干)

患者女，50岁。十二指肠溃疡病史10余年。近日患者自觉疼痛加剧，1小时前突感上腹刀割样疼痛，很快蔓延到全腹疼痛，急诊入院。查体：血压100/85 mmHg，全腹有明显压痛、反跳痛，腹部呈板样强直，初诊为十二指肠溃疡穿孔。

109. 该护士此时为患者采取的首要措施是

- A. 安慰患者，给予镇静药
- B. 持续低流量吸氧
- C. 立即禁食和胃肠减压
- D. 输注冷冻红细胞
- E. 持续心电监护

110. 医嘱予非手术治疗，其措施不包括

- A. 禁食
- B. 胃肠减压
- C. 静脉补液
- D. 应用抗生素
- E. 腹腔穿刺抽液

(111~113 题共用题干)

患者，女，32岁。因“咯血3天，胸憋、气紧2天”入院，血气分析示II型呼吸衰竭

111. 患者发生II型呼吸衰竭最可能原因是

- A. 肺血管疾病
- B. 气道阻塞
- C. 肺组织病变
- D. 胸膜病变
- E. 胸廓病变

112. 该患者首要的护理诊断为

- A. 焦虑
- B. 咯血
- C. 潜在并发症：误吸
- D. 清理呼吸道无效
- E. 自理缺陷

113. 患者呼吸困难逐渐加重，听诊左肺呼吸音弱，适宜的体位为

- A. 右侧卧位
- B. 平卧位
- C. 端坐位
- D. 半坐卧位
- E. 左侧卧位

(114~115 题共用题干)

患者，女性，39岁。已婚，因肺部感染应用抗生素2周，近日发现外阴瘙痒伴阴道分泌物增多。查体：阴道壁充血，宫颈光滑，阴道分泌物粘稠呈豆腐渣样。

114. 该患者最可能的疾病是

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 老年性阴道炎
- C. 细菌性阴道炎
- D. 外阴阴道假丝酵母菌病
- E. 急性肾盂肾炎

115. 护士指导患者应选择下列那种阴道灌洗液

- A. 1%乳酸溶液
- B. 0.1%~0.5%醋酸溶液
- C. 2%~4%碳酸氢钠溶液
- D. 0.2%苯扎溴铵溶液
- E. 1:5 000高锰酸钾溶液

(116~117题共用题干)

患者，女性，52岁。车祸致骨盆部肿胀、疼痛4小时，4小时前被相向而行的汽车撞伤，伤后感到左臀部疼痛、肿胀、活动受限。检查发现，右腹股沟处肿胀明显，可见淤血斑，骨盆挤压及分离实验均为阳性

116. 该患者可能发生了

- A. 骨盆骨折
- B. 右腹股沟区血肿
- C. 右股静脉损伤
- D. 右股骨颈骨折
- E. 右髋关节脱位

117. 首选的辅助检查是

- A. 腹部B超
- B. CT
- C. X线摄片
- D. MRI
- E. 同位素扫描

(118~120题共用题干)

患者男，73岁。全麻下行“直肠癌切除术”后6天，意识清醒，术后体温持续维持在38.2~39.6℃，脉搏112~124次/分，呼吸24~30次/分，血压148/94mmHg。自感气促、胸闷。痰液多且浓稠，难以自行咳出。肺部听诊闻及明显湿啰音，血常规检查：WBC $19 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例增加。既往有糖尿病史，自发病以来体重降低7.5kg。

118. 该患者目前已发生什么并发症

- A. 急性肺水肿
- B. 坠积性肺炎
- C. 脓血症
- D. 急性支气管炎
- E. 低氧血症

119. 以下与该患者的此并发症的发生无关的是

- A. 呕吐物误吸
- B. 补液过快过多
- C. 患者体质虚弱

D. 气管插管

E. 伤口疼痛

120. 对患者的处理，以下不妥的是

A. 鼓励早期下床活动

B. 严格限制补液量

C. 加强营养支持

D. 控制血糖水平

E. 加大吸氧浓度

金英杰·护理