

临床执业（含助理）医师资格考试考前 100 考点

考点 1.绪论部分年龄的分期:婴儿期-出生后到 1 周岁。

考点 2.绪论部分幼儿期特点:意外事故较多见, 营养障碍性疾病及腹泻病亦较多见。

考点 3.小儿生长发育体重测定的意义:体重是反映小儿近期营养状态的指标, 身高 是反映小儿远期营养状态的指标。

考点 4.小儿牙齿的发育:乳牙总数 20 颗, 恒牙 32 颗。

考点 5.儿童保健中疫苗的接种:五苗防七病, 生乙肝卡介苗; 2、3、4 月脊髓苗; 3、4、5 月百白破;8 月麻疹岁乙脑。

考点 6.婴儿喂养中奶量的计算:婴儿每日能量需要量为 100 kcal/kg,每日水需要量为 150 ml/kg,8%糖牛奶 100 ml 供能 100 kcal,故婴儿每日需要量= $\frac{100 \text{ ml/kg} \times \text{体重}}{8\%}$,每日补水量= $\frac{150 \text{ ml/kg} \times \text{体重}}{8\%}$ - 奶量。

考点 7.营养性维生素 D 缺乏性佝偻病与营养性维生素 D 缺乏性手足抽搦症发病机制的区别:甲状旁腺功能不能代偿性升高血钙。

考点 8.佝偻病治疗后恢复的标志:长骨干骺端临床钙化带重现,密度增加。

考点 9.蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪层减少的顺序:腹部——躯干——臀部——四肢——面部。

考点 10.先天性甲状腺功能减低症明确诊断的首选检查:染色体核型分析。

考点 11.新生儿溶血的确诊:改良直接抗人球蛋白试验。

考点 12.考查新生儿遗传性疾病中苯丙酮尿症 (PKU) 的诊断及检查,PKU = 智能低下+ 尿有鼠臭味+皮肤、毛发发黄。检查:采足跟血测定苯丙氨酸 (Phe) 浓度。

考点 13.风湿热诊断的五项主要表现:五:舞蹈症、环:环形红斑、星:心脏炎、光:关节炎、下:皮下小结。(五环星光下)

考点 14.HIE 惊厥首选苯巴比妥钠 (鲁米那)。HIE 脑水肿首选呋塞米。

考点 15.考查川崎病的治疗。糖皮质激素适应证:丙种球蛋白耐药、合并全心炎或无法得到丙种球蛋白时;副作用:易并发冠状动脉瘤并影响冠脉病变的修复,不宜单独应用抗凝 治疗,加用双嘧达莫 (潘生丁) O

考点 16.重症肺炎的表现除呼吸系统改变外, 可有循环、神经和消化等系统功能受累。

考点 17.考查先心病中的房缺。房间隔缺损的特点是:心前区隆起, 心搏弥散,心界扩大, 胸骨左缘第 2、3 肋间闻及 2~3 级收缩期杂音 (系右心室增大, 排血量增多, 大量血液通过右心室流出道形成); 肺动脉第二心音亢进并固定分裂。

考点 18.考查室缺的分型及特点: (1) 小型室间隔缺损:缺损直径 < 5 mm,Roger 病好发于肌部; (2) 中型室间隔缺损:缺损直径 5 ~ 10 mm,好发于膜周部; (3) 大型室间隔缺损:缺损直径 > 10 mm。

考点 19.小儿腹泻病中脱水的分度及脱水性质的分度。小儿皮肤弹性差, 眼窝及前囟 明显凹陷, 符合中度;血钠 130 mmol/L,符合等渗性脱水。

考点 20.考查小儿腹泻病中的电解质紊乱,补液后最易出现的电解质紊乱是低钾血症。

考点 21.肺心病急性加重期的治疗原则:积极控制感染(首选)。

考点 22.缺氧是肺动脉高压形成的最重要因素。

考点 23.支气管扩张典型症状为慢性咳嗽伴大量脓痰和反复咯血。

考点 24.肺炎克雷伯杆菌肺炎——砖红色胶冻状痰,X线蜂窝状脓肿,叶间隙下坠——头孢类抗生素。

考点 25.小叶性肺炎(葡萄球菌肺炎):X线:沿肺纹理分布的不规则斑片状阴影致病菌为葡萄球菌,致病力为凝固酶,发病急,易并发脓胸,黄色浓痰,脓血痰,X线可形成空洞,气液囊腔,X线多变,首选苯哩西林,耐药万古霉素。

考点 26.肺炎支原体肺炎(肺间质性肺炎):青少年,最不容易休克,咽痛,阵发刺激性干咳,支原体抗体确诊,X线表现下叶间质性肺炎,首选大环内酯类。

考点 27.肺结核确诊:包括痰涂片(抗酸染色)和痰结核分枝杆菌培养等,早期诊断为X线。

考点 28.呼吸衰竭分型

| | I型呼衰 | II型呼衰 |
|------|---------------------------|---|
| 别称 | 低氧血症型 | 高碳酸血症型 |
| 血气 | $PaO_2 < 60 \text{ mmHg}$ | $PaO_2 < 60 \text{ mmHg}$, $PaCO_2 \geq 50 \text{ mmHg}$ |
| 机制 | 肺换气功能障碍 | 肺通气功能障碍 |
| 常见疾病 | 严重肺部感染、急性呼吸窘迫综合征、急性肺栓塞等 | COPD 最常见 |

考点 29.急性呼衰:呼吸困难是出现最早的症状;发紺是缺氧的典型表现。

考点 30.急性呼吸窘迫综合征动脉血气分析:典型的改变是 Pa_{aO_2} 降低、 Pa_{aCO_2} 降低,pH 升高。目前 Pa_{aO_2}/FiO_2 的正常值是 400 - 500 mmHg, $W300 \text{ mmHg}$ 是诊断 MODS 的必要条件。

考点 31.肺源性心脏病失代偿期右心衰竭常见体征有颈静脉怒张(仅有怒张是代偿),肝大且有压痛,肝颈静脉回流征阳性(最特异),下肢水肿,重者可有腹水。

考点 32.肺结核确诊包括痰涂片(抗酸染色)和痰结核分枝杆菌培养。

考点 33.小细胞癌肺癌(小细胞未分化癌):①年龄较轻,多见男性。与吸烟有关。②大多数为中心型肺癌。又称为燕麦细胞癌。③小细胞癌细胞质内含有神经内分泌颗粒,恶性程度高,生长快,较早出现淋巴和血行广泛转移。④对恶性程度高,预后较差。

考点 34.病理活检是肺癌的金标准。中央型肺癌:纤维支气管镜,多为鳞癌和小细胞癌。周围型肺癌:经胸壁穿刺活检,多为腺癌。

考点 35.通气血流比值失调,弥散功能障碍,动静脉分流——I型呼吸衰竭。

考点 36.一秒钟用力呼气容积与用力肺活量(FVC)的比值(FEV₁/FVC),简称一秒率,是评价气流受限的敏感指标。(慢阻肺诊断金标准)

考点 37.血气分析核心考点小结

代偿失代偿:由 pH 判定。

7.35-7.45 (代偿) ; <7.35 酸; >7.45 碱。

呼吸性因素(呼酸呼碱):由 PaCO_2 判定。

35-45 mmHg。 >45 呼酸;<35 呼碱

代谢性因素:

BE: -3~+3。 >+3 代碱;<-3 代酸

AB (HCO_3^-) : 22 ~ 27 mmol/L,平均 24 mmol/L ; 大于 27 代碱, 小于 22 代酸

考点 38.支气管扩张最有意义体征:局限性粗湿啰音,可在下胸部、背部闻及固定而持久的局限性粗湿啰音。

考点 39.纤维空洞型肺结核:厚壁空洞,周围有广泛的纤维条索,肺门抬高,肺纹呈垂柳状改变。纵膈气管牵拉至患侧。

考点 40.抗结核药副作用(均有肝损)

链霉素—肾,耳

乙胺丁醇——视神经

利福平——肝损害,橘红色尿

异烟肼——周围神经

吡嗪酰胺——高尿酸,关节痛

考点 41.子宫+附件切除—不需要切除的韧带为卵巢固有韧带

全子宫切除,保留卵巢——不需要切除骨盆漏斗韧带

考点 42.子宫峡部上端为解剖内口,下端为组织学内口。

考点 43.卵泡膜细胞、颗粒细胞为排卵前雌激素的主要来源,排卵后,黄体细胞分泌孕激素及雌激素。

考点 44.hCG 在受精后 10 日可自母体血清中测出,至妊娠 8 ~ 10 周血清浓度达最高峰,持续 10 天后迅速下降,持续至分娩,约于产后 2 周内消失。

考点 45.卵巢功能检查包括:①基础体温测定;②阴道脱落细胞检查;③宫颈黏液结晶 检查;④子宫内膜检查。

考点 46.预产期推算按末次月经第一日起,月份减 3 或者加 9,日数加 7。

考点 47.硫酸镁是治疗妊娠期高血压疾病的首选药物。

考点 48.念珠菌阴道炎主要出现白色稠厚呈凝乳状或豆渣样白带。

考点 49.卵巢纤维瘤伴有腹腔积液或胸腔积液,称为梅格斯 (Meigs) 综合征。

考点 50.侵蚀性葡萄胎活组织镜下见绒毛或绒毛痕迹,绒毛膜镜下见大量滋养细胞及出血坏死,无绒毛结构。

考点 51.伞部是术中识别输卵管的标志。

考点 52.女性生殖器官血管除卵巢动脉(来源腹主动脉)外,均来自髂内动脉。

考点 53.乳房发育是女性第二性征发育最早的标志。

考点 54.妊娠早期羊水——母体血清;妊娠中期——胎儿尿液;妊娠晚期——胎儿肺参与羊水的生成。



考点 55.妊娠 8 周 5~10 ml,妊娠 10 周约 30 ml,妊娠 20 周约 400 ml,妊娠 38 周约 1 000 ml,此后羊水量逐渐减少,妊娠足月羊水量约 800 ml。过期妊娠羊水量明显减少,可减少至 300 ml 以下。

考点 56.妊娠期手测宫底高度:12 周末:耻骨联合上 2~3 横指,16 周末:脐耻之间,20 周末:脐下 1 横指,24 周末:脐上 1 横指,28 周末:脐上 3 横指,32 周末:脐与剑突之间,36 - 周末:剑突下 2 横指,40 周末:脐与剑突之间或略高。

考点 57.妊娠晚期或临产时,发生无诱因、无痛性反复阴道流血是前置胎盘的主要症状,阴道流血时间的早晚、反复发作的次数、流血量的多少与前置胎盘的类型有关。

考点 58.外阴阴道假丝酵母菌病的传播途径主要为内源性传染,假丝酵母菌除作为条件致病菌寄生于阴道外,也可寄生于人的口腔、肠道。一旦条件适宜即可引起感染。

考点 59.卵巢颗粒细胞瘤可致血清雌激素升高。

考点 60.眼底检查视网膜小动脉痉挛程度反映全身小血管痉挛程度,可反映妊娠期高血压疾病的严重程度。

考点 61.骨折特有体征:畸形、反常活动、骨擦音/感。注意:有的骨折不出现特有体征(如裂缝骨折和嵌插骨折)。

考点 62.骨折的早期并发症:(1)休克。(2)脂肪栓塞(综合症)。(3)重要内脏损伤:肺损伤,肝、脾破裂,膀胱、尿道、直肠损伤等。(4)重要周围组织损伤。(5)骨筋膜室综合征。

考点 63.骨折功能复位标准:①旋转移位、分离移位:必须完全矫正。②缩短移位:成人:下肢骨折不超过 1 cm;儿童:无骨髓损伤者下肢短缩不超过 2 cm。③长骨干横形骨折:骨折端对位至少达 1/3;干髓端骨折对位至少 3/4。④成角移位:a.上肢肱骨干骨折,稍有畸形自行矫正;b.前臂双骨折对位对线均好,否则影响旋转功能;c.下肢轻微向前或向后成角,与关节活动方向一致自行矫正;d.下肢侧方成角移位,与关节活动方向垂直必须完全矫正,否则易引起创伤性关节炎。

考点 64.桡骨下端骨折:Colles 骨折:掌着地,刺枪银叉样畸形。远端向背近向掌,治疗复位小夹板。Smith 背着地,反刺枪样反银叉。远端向掌近向背,治疗复位小夹板。

考点 65.肱骨髁上骨折临床表现:局部压痛,有骨擦音及异常活动,肘后三角关系正常。

考点 66.胫骨骨折:供应下 1/3 的血循环明显减少。同时该处几乎无肌肉附着,由远端获得的血液供应很少,骨折易发生骨愈合延迟(营养动脉损伤)。

考点 67.脊髓神经损伤:看软组织查 MRI,MRI:查软组织、查水肿、查神经、查关节。

考点 68.肩关节脱位诊断公式:有外伤病史(手掌撑地)+健手托住患侧前壁+方肩畸形+Dugas 征阳性+X 线检查=肩关节脱位。

考点 69.保存断肢(指):(1)用无菌或清洁敷料包扎,用干燥冷藏的方法保存,但不让断肢(指)与冰块直接接触,以防冻伤,也不要任何液体浸泡断肢。(2)到达医院后,放入 4 乞冰箱内。

考点 70.慢性骨髓炎:临床表现(全身中毒症状不明显)经久不愈的溃疡。邻近关节处畸形,窦道口皮肤反复受到脓液的刺激会发生癌变。X 片可以显示脓腔与小型死骨。

考点 71.(1)内收骨折:Pauwels 角大于 50。的骨折,属于不稳定骨折,容易移位。(2)

外展骨折:外展骨折是指 **Pauwels** 角小于 **30°** 的骨折,属于稳定骨折。手术指征:①青少年;② **65** 岁以上老人股骨头下型骨折;③有移位的和内收型(不怕外展怕内收)骨折;④陈旧性骨折不愈合、畸形愈合、股骨头缺血坏死或合并髓关节骨性关节炎者。

考点 **72**.胫腓骨骨折:胫骨中上段横切面是三角形,而中下 **1/3** 交界处变成四方形,二者移行交界处是骨折的好发部位。

考点 **73**.髓关节后脱位(最常见)的典型表现:(1)明显外伤史,通常暴力很大。(2)明显疼痛,髓关节不能活动。(3)患肢缩短,髓关节呈屈曲、内收、内旋畸形。

考点 **74**.桡神经

| 受损伤的神经 | | 感觉异常 | 运动异常 |
|--------|----------------------|--|--------------------------|
| 桡神经 | 肱骨中下 1/3 骨折所致 | 手背桡侧和桡侧 3 个半手指背面皮肤,主要是手背虎口处皮肤麻木 | 伸腕、伸拇、伸指、前臂旋后障碍;典型的畸形:垂腕 |
| | 桡骨小头脱位或前臂背侧近端骨折所致 | 伸腕功能基本正常,仅有伸拇、伸指障碍,而无手部感觉障碍 | |

考点 **75**.肩周炎诊断

- (1) 中老年患者多见,女性多见,常为单侧,亦可双侧同时发病。一般病程在 **6~24** 个月。
- (2) 肩部某一处疼痛,并牵涉到上臂中段。肩关节活动受限。
- (3) 三角肌有轻度萎缩,斜方肌痉挛。肩关节以外展、外旋、后伸受限最明显。与颈椎病不同的是没有涉及前臂和手的根性疼痛,定位体征不明确。

考点 **76**.狭窄性腱鞘炎

临床表现及诊断:

- (1) 起病缓慢,早期仅为患指晨起僵硬、疼痛,缓慢活动后即消失。
- (2) 随病程的延长逐渐出现各手指弹响伴明显疼痛,严重者患指屈曲不敢活动,各手指发病频度依次为中、环指最多。
- (3) 疼痛常在近端指间关节,扪及黄豆大痛性结节,活动时随屈肌腱上下移动,并可发生弹响。
- (4) 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎,表现在腕关节桡侧疼痛,握拳尺偏腕关节时,桡骨茎突处出现疼痛,称为 **Finkelstein** 试验阳性。

考点 **77**.脊髓型颈椎病

- ①运动障碍(无力)。
- ②肢体麻木。
- ③共济失调(最早表现)即病理反射(+).

总结:四肢乏力,行走、持物不稳为最先出现的症状。病理反射(+) **O**

考点 **78**.腰间盘突出症

症状:腰痛伴有坐骨神经痛是主要症状,也是最先出现的症状。疼痛主要在腰背部或腰散部,反复发作。疼痛为放射痛。

体征:行走时脊柱侧凸,骨盆倾斜,腰部活动受限。直腿抬高试验和加强试验阳性(特征性症状)。

考点 79.急性血源性骨髓炎

溶血性金黄色葡萄球菌是最常见的致病菌，经过血源性播散。

考点 80.骨肉瘤

是高度恶性的骨肿瘤，股骨下端、胫骨或腓骨上端和肱骨上端。

临床表现主要为疼痛，局部皮肤发热，浅表静脉怒张。肺转移发生率高。

诊断 X 线表现：**Codman** 三角；形成 X 线片上的“日光射线”征象。

考点 81.蛋白质变性特点：蛋白质变性后溶液黏度增加，溶解度降低，结晶能力消失，生物活性丧失，易被蛋白酶水解。

考点 82.必需脂肪酸：人体内不饱和脂肪酸包括油酸、软油酸、亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸，其中亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸为必需脂肪酸，只能从食物获取。

考点 83.第二信使：第二信使是指在细胞内传递信息的小分子化合物，如 **cAMP**、**cGMP**、**Ca²⁺**、**IP₃**、**DAG**、**Cer** 等。

考点 84.酶的化学修饰包括：磷酸化/去磷酸化、乙酰化/去乙酰化、甲基化/去甲基化、腺苷化/去腺苷化等，最多见的是磷酸化/去磷酸化调节。

考点 85.肝脏生物转化：第一相反应为氧化、还原、水解等，第二相反应为各种结合反应，主要为葡萄糖醛酸结合反应。

考点 86.酮体包括：乙酰乙酸、**B-羟丁酸**、丙酮。

考点 87.核酸代谢产物：嘌呤核苷酸最终代谢产物为尿酸；胞嘧啶、尿嘧啶最终代谢产物为 **B-丙氨酸**、二氧化碳和 **NO**；胸腺嘧啶最终代谢产物为 **B-氨基异丁酸**、二氧化碳和 **NH₃**

考点 88.心指数：心指数为以单位体表面积计算的心输出量，即心输出量/体表面积，其为评价不同个体之间心泵功能的指标。

考点 89.**CO₂** 在血液中的运输形式有两种：一种为物理溶解，约占 **5%**，余为化学结合，其中 **88%** 与碳酸氢盐结合，余下 **7%** 与氨基甲酰血红蛋白结合。

考点 90.胰蛋白酶原的激活：能将胰蛋白酶原转变为胰蛋白酶的物质有肠激酶、胃酸、胰蛋白酶本身及组织液等，最重要的为肠激酶。

考点 91.内脏痛的特点：（1）最主要特点为定位不准确；（2）发生缓慢、持续时间长；（3）对牵拉刺激、扩张刺激敏感，对切割、烧灼刺激不敏感；（4）特别能引起不愉快的情绪活动。

考点 92.收缩压：心室收缩时，主动脉压升高，在收缩期的中期达到最高值，此时的动脉血压称为收缩压。

考点 93.肺泡表面活性物质的功能有：（1）降低肺泡表面张力，有助于肺泡稳定性；（2）减少肺泡组织液生成，防止肺水肿；（3）降低吸气阻力，减少吸气做功；（4）防止肺不张，可使肺顺应性变大，减少肺弹性阻力 0

考点 94.体温调定点学说认为：体温的调节类似于恒温器的调节。如果某种原因使调定点向高温侧移动，发热初期体温低于新的调定点水平，则机体出现皮肤血管收缩、减少散热，随即出现寒战等产热反应，直至体温上升至新调定点。

考点 95.组织细胞再生能力:结缔组织细胞)平滑肌细胞)心肌细胞)神经细胞。

考点 96.坏死的主要形态学特征:细胞肿胀、细胞器崩解和蛋白质变性。细胞核的主要改变是核固缩、核碎裂和核溶解。

考点 97.原位癌:指异型增生的细胞与癌细胞相同,并累及上皮全层,但未突破基底膜。

考点 98.脂褐素增加的病理基础:脂褐素大量增加见于细胞萎缩。脂褐素是细胞自噬溶酶体内未被消化的细胞器碎片残体,其成分是脂质和蛋白质的混合体。

考点 99.血栓的结局通常有:软化、溶解、吸收;机化、再通;钙化。血栓一般不会主动排出。由肉芽组织逐渐取代血栓的过程称为血栓机化。如血栓未能软化又未能完全机化,可发生钙盐沉积,称为钙化。

考点 100.癌与肉瘤的区别:癌与肉瘤在发生部位、质地、发生年龄都有很大区别,但最主要的区别在于组织来源不同。癌由上皮组织分化,肉瘤由间叶组织分化。

临床执业（含助理）医师资格考试考前 100 考题

例题 1. 小儿年龄分期中的婴儿期是指

- A. 从出生结扎脐带到满 28 天
- B. 从出生到 1 岁
- C. 3 周岁到 6~7 岁
- D. 从 6 岁至 12-14 岁
- E. 从 6 岁至 12 岁

正确答案: B

例题 2. 意外伤害较多见, 营养性疾病亦多见的年龄段是

- A. 学龄期
- B. 青春期
- C. 婴儿期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

正确答案: D

例题 3. 最敏感反映小儿近期营养状态变化的指标

- A. 身高
- B. 体重
- C. 胸围
- D. 腹围
- E. 头围

* B

例题 4. 出至的小儿乳牙数目是

- A. 14 个
- B. 20 个
- C. 22 个
- D. 18 个
- E. 16 个

正确答案: B

例题 5. 6 个月以下小儿免疫预防接种不包括

- A. 乙肝疫苗
- B. 卡介苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 百白破疫苗
- E. 脊髓灰质炎疫苗

正确答案: C

例题 6. 3 个月婴儿, 体重 5 kg, 人工喂养, 每日喂 8% 糖牛奶量和补水量是

- A. 400 ml, 150 ml
- B. 450 ml, 750 ml
- C. 500 ml, 250 ml
- D. 600 ml, 750 ml
- E. 700 ml, 250 ml

正确答案: C

例题 7. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症的发病机制与维生素 D 缺乏性佝偻病最根本的不同在于

- A. 神经系统兴奋性较高
- B. 甲状旁腺反应迟钝, 甲状旁腺激素代偿不足/
- C. 食物中钙含量过低
- D. 维生素 D 缺乏的程度较重
- E. 食物中磷含量过高

正确答案: B

例题 8. 佝偻病恢复期长骨 X 线片改善的特点是

- A. 骨临时钙化带重新出现
- B. 临时钙化带消失
- C. 干髓端增宽
- D. 骨质稀疏, 密度减低
- E. 干髓端呈毛刷状

正确答案: A

例题 9. 蛋白质-能量营养不良患儿皮下脂肪逐渐减少的顺序是

- A. 躯干——臀部——四肢——腹部——面颊
- B. 四肢——躯干——腹部——臀部——面颊
- C. 躯干——臀部——腹部——四肢——

面颊

D. 腹部——躯干——臀部——四肢

面颊

E. 腹部——躯干——面颊——臀部——四肢

四肢

正确答案■ D

例题 10. 男孩, 2 岁。生长发育迟缓及智力发育落后。查体: 眼裂小、眼外眦上斜、眼距宽、外耳小、鼻梁低平, 皮肤细腻。为明确诊断首选的检查是

- A. 尿三氯化铁试验
- B. 尿蝶呤分析
- C. 血 T_3, T_4, TSH

D. 骨龄测定

E. 染色体核型分析

正确答案: E

例题 11. 诊断新生儿 ABO 溶血, 最重要的检查是

- A. 血常规
- B. 血型
- C. 肝功能与胆红素
- D. 改良直接抗人球蛋白试验
- E. 血涂片查红细胞形态

正确答案· D

例题 12 患儿 1 岁半。生后半年发现尿有霉臭味, 经常呕吐, 1 岁时发现智力较同龄儿落后。查体: 目光呆滞, 皮肤白皙, 毛发浅黄。明确诊断的检查是

- A. 血苯丙氨酸浓度测定
- B. 血 T3T4 测定
- C. 染色体核型分析
- D. 头颅 CT
- E. 脑电图

正确答案: A

例题 13. 高诊风湿热的主要表现哪项是错误的

- A. 心脏炎
- B. 游走性多发性关节炎
- C. 舞蹈病
- D. 发热
- E. 环形红斑

确案■ D

例题 14. 新生儿缺氧缺血性脑病时发生惊厥, 首选的药物是

厥, 首选的药物是

- A. 甘露醇
- B. 地塞米松
- C. 苯巴比妥
- D. 苯妥英钠
- E. 咪塞米

正确答案: C

例题 15. 卡列川崎病的治疗中, 易发生冠状动脉瘤和影响冠脉修复, 而不宜单独使用的是

- A. 阿司匹林
- B. 泼尼松
- C. 静脉注射丙种球蛋白
- D. 双嘧达莫
- E. 心脏手术

正确答案: B

例题 16. 判断小儿支气管肺炎严重程度的指标是

- A. 白细胞高低
- B. 呼吸频率
- C. 有无累及其他系统
- D. 胸片显示程度
- E. 感染菌群

正确答案: C

例题 17. 两骨左缘第 2、3 肋间及 2~3 级收缩期杂音, 第二心音固定分裂常见于

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 肺动脉瓣关闭不全

正确答案■ D

例题 18. 所谓无血流动力学变化的 Roger 病是指

- A. 原发性房间隔缺损
- B. 继发性房间隔缺损
- C. 小型室间隔缺损
- D. 中型室间隔缺损
- E. 大型室间隔缺损

正确答案: C

例题 19 患儿, 8 个月。3 天来腹泻 6~8 次/日, 为黄色水样便, 呕吐 3~5 次/日, 为胃内容物, 尿量减少, 哭时少泪。查体: 精神萎靡, 口唇干燥, 呼吸略深长, 皮肤弹性差, 眼窝及

前囟明显凹陷，血钠 130 mmol/L 最可能的诊断是

- A. 重度低渗性脱水
- B. 中度低渗性脱水
- C. 中度等渗性脱水
- D. 重度等渗性脱水
- E. 轻度等渗性脱水

正确答案:C

例题 20. 旻, 2 岁。腹泻 3 天, 诊断为重型腹泻。经静脉补充有效量的 3:2:1 液治疗, 脱水明显纠正, 尿量增加, 但患儿仍有腹胀, 经检查, 肌张力低, 首先需考虑

- A. 低钠血症
- B. 低钙血症
- C. 低钾血症
- D. 低镁血症
- E. 低氯血症

正确答案:C



金英杰医学山东总校区

例题 21. 患者, 男, 68 岁。反复咳嗽、咳痰、气促 41 年, 心悸、水肿 5 年, 近 1 周来症状加重入院。查体: 呼吸急促, 双肺可闻及干湿啰音, P2 亢进, 三尖瓣区闻及 3/6 级收缩期杂音。肝右肋下 4 cm, 压痛(+), 肝颈静脉回流征阳性, 下肢水肿。此时首选的治疗是使用

- A. 强心剂
- B. 利尿剂
- C. 心血管扩张剂
- D. 抗生素
- E. 祛痰剂

正确答案: D

例题 22. COPD 发生肺动脉高压最主要的机制是

- A. 低氧、CO₂潴留所致肺小动脉收缩
- B. 肺小动脉内膜广泛增厚
- C. 肺小动脉内原位血栓形成
- D. 肺毛细血管断裂所致血管阻力增加
- E. 慢性缺氧所致血液黏滞度增加

正确答案: A

例题 23. 慢性咳嗽、大量脓痰、反复咯血 最多见于

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管肺癌
- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 肺炎

正确答案: C

例题 24. 5 年患者突然发生寒战、高热、咳嗽、咳痰, 痰黏稠, 砖红色, 胶冻状, 引起感染最可能的病原菌是

- A. 葡萄球菌
- B. 克雷伯杆菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 流感嗜血杆菌
- E. 嗜肺军团杆菌

正确答案: B

例题 25. 为并发脓胸、脓气胸的肺炎是

- A. 呼吸道合胞病毒肺炎
- B. 腺病毒肺炎
- C. 金黄色葡萄球菌肺炎
- D. 支原体肺炎
- E. 衣原体肺炎

正确答案: C

例题 26. 肺炎伴感染性休克常见于以下肺部炎症, 除了

- A. 肺炎球菌肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 克雷伯杆菌肺炎
- D. 绿脓杆菌肺炎
- E. 支原体肺炎

正确答案: E

例题 27. 期发现肺结核的最主要方法是

- A. 询问病史
- B. X 线检查
- C. 痰菌检查
- D. 血沉检查
- E. 结核变态反应

正确答案: B

例题 28. 弓形引起 I 型呼吸衰竭最常见的疾病是

- A. 慢性支气管炎
- B. 阻塞性肺气肿
- C. 气管异物
- D. 膈肌麻痹
- E. ARDS

正确答案: E

例题 29. 呼吸衰竭最主要的临床表现是

- A. 呼吸费力伴呼气相延长
- B. 呼吸频率增快
- C. 呼吸困难与发绀
- D. 神经精神症状
- E. 双肺有大量湿啰音

正确答案: C

例题 30. 急性呼吸窘迫综合征(ARDS) 最重要的诊断依据是

- A 肺内分流量减少
- B. 肺泡气-动脉血氧分压差降低
- C. 氧合指数(PaO₂/FiO₂) < 300

mmHg

- D. 呼吸频率增加, 每分钟大于 28 次
- E. 血气分析显示为低氧伴轻度二氧化碳

潴留

正确答案:C

例题 31 慢性肺心病患者提示右心功能不全的主要体征是

- A. 双下肢水肿
- B. 肝静脉回流征阳性
- C. 心脏向左扩大
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进
- E. 肝大, 触痛阳性

正确答案: B

例题 32. 确定肺结核是否为传染源的最主要依据是

- A. 血沉检查
- B. X 线检查
- C. 痰结核菌检查
- D. 结核菌素试验
- E. 血结核抗体检查

正确答案:C

例题 33. 癌后最差的肺癌是

- A. 鳞形细胞癌
- B. 小细胞癌
- C. 腺癌
- D. 大细胞癌
- E. 细支气管肺泡癌

正确答案: B

例题 34. 最有助于诊断支气管肺癌的检查是

- A. 肺动脉造影
- B. 胸部 B 超
- C. 痰培养+药敏
- D. 支气管镜检
- E. 支气管造影

■答案: D

例题 35. 房室传导功能障碍最常出现

- A. PaO_2 正常, $PaCO_2$ 上升
- B. PaO_2 下降, $PaCO_2$ 上升
- C. PaO_2 正常, $PaCO_2$ 正常
- D. PaO_2 正常, $PaCO_2$ 下降
- E. PaO_2 下降, $PaCO_2$ 正常或下降

正确答案:E

例题 36. 男性, 68 岁。慢性咳嗽 12 年, 活动后气急 3 年, 下列哪项对诊断慢性阻塞性肺疾病最有价值

- A. PaO_2 降低
- B. $FEV_1/FVC < 80\%$
- C. FEV_1 占预计值百分比 $< 80\%$
- D. $FEV/FVC < 70\%$
- E. 最大呼气中期流速降低

正确答案:D

例题 37. 男 65 岁, 慢支 30 年, 近 3 年来下肢水肿, 活动后气短, 3 天前受凉后加重, 神志恍惚嗜睡, 血气分析: $pH 7.15, PaCO_2 80 mmHg, PaO_2 45 mmHg, BE -10 mmol/L$ 。此结果符合

- A. 呼吸性酸中毒失代偿期
- B. 呼吸性酸中毒代偿期
- C. 呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒+代谢性酸中毒
- E. 呼吸性酸中毒+代谢性酸中毒

正确答案:E

例题 38. 支气管扩张最有意义的体征是

- A. 贫血貌
- B. 杵状指
- C. 发绀
- D. 固定吸气性哮鸣音
- E. 局限性固定持久湿啰音

正确答案:E

例题 39. 胸片可见环形透亮区、肺门上提、肺纹呈垂柳状改变的多为

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 干酪样肺炎
- D. 纤维空洞性肺结核
- E. 结核球

正确答案: D

例题 40. 关于抗结核药物副作用下列哪一条是错误的

- A. 异烟肼: 肝功损害
- B. 利福平: 肝功损害
- C. 吡嗪酰胺: 肝功损害、肾功损害
- D. 链霉素: 耳鸣耳聋
- E. 乙胺丁醇: 视神经炎

正确答案:C

例题 41. 子宫切除术时无需切断的韧带是

- A. 宫骶韧带
- B. 骨盆漏斗韧带
- C. 卵巢固有韧带

- D. 子宫圆韧带
- E. 子宫主韧带

正确答案:B

例题 42.关于子宫峡部解剖学特点,错误的是

- A. 非孕期长约 1 cm
- B. 子宫粘子宫龄间形窄的峡
- C. 上端为组织学内口
- D. 下端与子宫颈内腔相连
- E. 妊娠末期可达 7 ~ 10 cm 正确答案:C

例题 43.品卵前雌激素的主要来源是

- A. 子宫内膜
- B. 黄体细胞
- C. 卵泡膜细胞
- D. 初级卵泡
- E. 滋养细胞

正确答案:C

例题 44.产妇血清绒毛膜促性腺激素(hCG)浓度达高峰是在妊娠

- A. 5-7 周
- B. 8-10 周
- C. 11-13 周
- D. 14-16 周
- E. 17-19 周

正确答案· B

例题 45.卵巢功能检查不包括的是

- A. 宫颈细胞学检查
- B. 阴道脱落细胞检查
- C. 宫颈黏液检查
- D. 基础体温测定
- E. 月经期前子宫内膜组织检查

正确答案:A

例题 46.末次月经第一天为 2016 年 7 月 6 日,计算预产期应是

- A. 2017 年 5 月 12 日
- B. 2017 年 4 月 13 日
- C. 2017 年 5 月 14 日
- D. 2017 年 5 月 15 日
- E. 2017 年 5 月 16 日

正确答案:B

例题 47.治疗子痫首选的药物是

- A. 氯丙嗪

- B. 硫酸镁
- C. 双氢克尿塞
- D. 20%的甘露醇
- E. 白蛋白

正确答案:B

例题 48.盖珠菌性阴道炎典型的白带是

- A. 凝乳块状
- B. 泡沫状
- C. 黄色脓性
- D. 水样
- E. 血性

正确 * A

例题 49.卵巢纤维瘤伴胸腹水形成称为

- A. Meigs 综合征
- B. Downs 综合征
- C. Meniere 综合征
- D. Cushing 病
- E. 类癌综合征

正确答案:A

例题 50.侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是

- A. 阴道流血时间长短
- B. 距葡萄胎排空后时间长短
- C. 尿中 hCG 值高低
- D. 子宫大小程度不同
- E. 活组织镜下见有无绒毛结构

正确案■ E

例题 51.术中识别输卵管的标志是

- A. 输卵管伞部
- B. 输卵管间质部
- C. 输卵管系膜
- D. 输卵管漏斗
- E. 输卵管外侧端

正确答案:A

例题 52.卵巢动脉来自

- A. 腹主动脉
- B. 髂总动脉
- C. 髂内动脉
- D. 髂外动脉
- E. 肾动脉

正确答案* A

例题 53.女性第二性征发育最早的标志是

- A. 月经来潮
- B. 乳房发育

- C. 身高增长
- D. 阴毛出现
- E. 卵巢增大

正确答案■ B

例题 54. 妊娠早期羊水的主要来源是

- A. 母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
- B. 胎儿皮肤
- C. 胎儿尿液
- D. 胎儿肺
- E. 胎膜

正确答案:A

例题 55. 正常妊娠 38 周时的羊水量约为

- A. 600 ml
- B. 800 ml
- C. 1000 ml
- D. 1200 ml
- E. 1500 ml

正确答案:C

例题 56. 正常妊娠于 32 周末时宫底高度应为

- A. 脐上 3 横指
- B. 脐与剑突之间
- C. 耻骨联合上刚能触及
- D. 脐耻之间
- E. 剑突下 2 横指

正确答案■ B

例题 57. 前置胎盘时阴道流血特征是

- A. 有痛性阴道流血
- B. 宫缩时阴道流血停止
- C. 阴道流血量与贫血程度不成正比
- D. 阴道流血与外伤有关
- E. 无痛性阴道流血

正确答案■ E

例题 58. 外阴阴道假丝酵母菌病的主要感染方式是

- A. 内源性感染
- B. 性生活直接传播
- C. 经接触感染衣物传播
- D. 经血液传播
- E. 垂直传播

正确答案:A

是

例题 59. 奇致血清雌激素升高的卵巢肿瘤

- A. 卵巢浆液性囊腺瘤
- B. 内胚窦瘤
- C. 畸胎瘤
- D. 无性细胞瘤
- E. 颗粒细胞瘤

正确答案:E

例题 60. 初孕妇, 28 岁。妊娠 32 周, 2 天前突发头痛, 视物模糊。查体 P 70 次/分, BP 170/120 mmHg, 脚踝部凹陷性水肿, 神经系统检查未发现异常。产科检查: 胎心率 120 次/分, 为评估病情严重程度, 首选的检查是

- A. 眼底检查
- B. 甲状腺功能测定
- C. 尿常规
- D. 头颅 CT
- E. 心脏彩超

正确答案:A

例题 61 肩于骨折专有体征的是

- A. 张力水疱
- B. 肿胀疼痛
- C. 皮下瘀斑
- D. 反常活动
- E. 活动受限

TF ■ D 例题 62 肩于骨折早期并发症的是

- A. 创伤性关节炎
- B. 缺血性骨坏死
- C. 关节僵硬
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 坠积性肺炎

正确答案■ D

例题 63. 荐合骨折功能复位标准的是

- A. 骨折部分的分离移位不必完全矫正
- B. 儿童下肢骨干骨折缩短 2 cm 以内
- C. 骨折部分的旋转移位不必完全矫正
- D. 复位后骨折断端对位达 1/5
- E. 允许下肢骨折存在与关节活动方向垂直的侧方成角

正确答案■ B

例题 64. 75 岁。摔倒时右手撑地, 腕部疼痛、肿胀。查体: 右腕部呈“枪刺刀”畸形。诊断为

- A. Galeazzi 骨折
- B. Colles 骨折

- C. **Monteggia** 骨折
- D. **Chance** 骨折
- E. **Smith** 骨折 正确答案: **B**

例题 65. 未属于桡骨髁上骨折的临床表现

是

- A. 肘部疼痛肿胀
- B. 肘部皮下瘀斑
- C. 肘后三角异常
- D. 手部皮肤苍白、皮温较低
- E. 前臂缺血性肌坏死

正确答案: **C**

例题 66. 男, 40 岁。因车祸右小腿受伤, 经拍 X 线片, 诊断为右胫骨中下 1/3 交界处斜形骨折, 其易发生

- A. 骨筋膜室综合征
- B. 脂肪栓塞
- C. 延迟愈合或不愈合
- D. 血管损伤
- E. 损伤性骨化

正确答案: **C**

例题 67. 确诊脊髓损伤最有价值的检查是

A. MRI



金英杰医学教育山东总校区

- B. ECT
- C. X线片
- D. CT
- E. B超

正确答案[^]案[■] A

例题 68 男, 34 岁。由于侧身倒地右掌支撑, 只右肩部肿胀, 疼痛剧烈。检查: 右肩轻度外展, 弹性固定, 方肩畸形, Dugas 征 (搭肩试验) 阳性。临床诊断是

- A. 肱骨外科颈骨折
- B. 臂丛损伤
- C. 锁骨骨折
- D. 肩关节挫伤
- E. 肩关节脱位

正确答案* E

例题 69. 血运断肢最好的方法是

- A. 浸泡于生理盐水中
- B. 浸泡于抗生素溶液中
- C. 浸泡于新洁尔灭溶液中
- D. 包装于口袋内干燥冷藏
- E. 置于冰块内

正确案[■] D

例题 70. 慢性骨髓炎最有意义的诊断依据是

- A. 皮肤有窦道并见死骨排出
- B. 局部肿痛及患肢功能障碍
- C. 寒战、高热等感染中毒症状
- D. 白细胞总数及中性粒细胞增高
- E. X线未见骨质破坏和骨膜反应

正确答案: A

例题 71. 男, 78 岁。跌倒后感右髓部疼痛 1 小时来诊。X 线片检查示右股骨颈头下型骨折, Pauwells 角为 60°。最适宜的治疗方法是

- A. 手术治疗
- B. 右下肢皮牵引
- C. 石膏固定
- D. 休息制动 F
- E. 手法复位

正确 * A

例题 72. 低骨易发生骨折的部位是

- A. 上端干髓端部位
- B. 横切面三棱形部位
- C. 横切面四边形部位
- D. 踝上部
- E. 横切面三棱形与四边形移行部位

正确答案: E

例题 73. 男, 45 岁。乘汽车时急刹车, 左髋关节挫伤, X 线示股骨头向后方脱位, 未见股骨头及髓臼骨折。髓臼关节畸形位置应该为

- A. 屈曲、内旋、内收
- B. 反屈曲、内收、外旋
- C. 屈曲、外展、外旋
- D. 屈曲、外展、内旋
- E. 过伸位、内收、内旋

正确答案: A

例题 74. 男, 24 岁。左腕部切割伤 12 小时, 伤及梯神经, 其临床表现是

- A. 拇、示、中指不能屈曲
- B. 不能屈腕
- C. 手部内在肌萎缩
- D. 手背虎口区域麻木
- E. 手掌梯侧感觉减弱

正确答案: D

例题 75. 女, 50 岁。右肩部疼痛, 不能梳头。查体: 右肩三角肌萎缩, 肩关节外展、外旋、后伸明显受限。X 线片未见骨质疏松, 肩峰下钙化。其首选诊断为

- A. 肩周炎
- B 肩关节结核
- C. 肩关节肿瘤
- D. 肱骨外上像炎
- E. 风湿性关节炎

正确答案: A

例题 76. 男, 48 岁。晨起左中指发僵、疼痛, 缓慢活动后可消失, 屈伸中指时有弹响。最可能的诊断是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 狭窄性腱鞘炎
- C. 腱鞘囊肿
- D. 滑囊炎
- E. 创伤性关节炎

正确答案■ B

例题 77.幕髓型颈椎病最重要的诊断依据为

- A. 头痛头晕
- B. 双上肢麻木
- C. 眼痛、面部出汗失常
- D. 肢体发凉, 无或少汗
- E. 四肢麻木、无力, 病理反射 (+)

正确答案: E

例题 78.男, 35 岁。腰痛伴右侧下肢放射性痛 3 个月, 无明显发热、盗汗。查体: 右侧直腿抬高试验阳性, 小腿前外侧和足底感觉减退, 姆背伸肌力减退。最可能的诊断是

- A. 腰椎间盘突出症
- B. 腰肌劳损
- C. 腰椎肿瘤
- D. 腰椎结核
- E. 强直性脊柱炎 正确答案■ A

例题 79.互性化脓性骨髓炎最常见的致病菌是

- A. 乙型溶血性链球菌
- B. 铜绿假单胞菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 肺炎双球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

正确答案: E

例题 80.男, 14 岁。左胫骨近端疼痛 2 个月, 呈进行性加重。X 线片检查发现左胫骨骨髓端骨膜反应呈“日光射线”形态。最可能的诊断是

- A. 骨肉瘤
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨结核
- E. 骨囊肿 正确答案: A

例题 81.蚤性蛋白质的主要特点是

- A. 不易被蛋白酶水解
- B. 分子量降低
- C. 溶解性增加
- D. 生物学活性降低
- E. 共价键被破坏 正确答案■ D

例题 82 肩于必需脂肪酸的是

- A. 亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸
- B. 油酸、亚麻酸、花生四烯酸
- C. 亚油酸、软脂酸、花生四烯酸

D. 亚麻酸、硬脂酸、亚油酸

E. 亚麻酸、亚油酸、软脂酸 正确答案: A

例题 83.不属于参与细胞内信息传递的第二信使物质是

- A. cAMP
- B. 钙离子
- C. IP3
- D. DAG
- E. ATP

正确答案: E

例题 84.备化学修饰调节最多见的是

- A. 别构调节
- B. 磷酸化/去磷酸化
- C. 酶原激活
- D. 催化物调节
- E. 温度调节

正确案■ B

例题 85.室生在肝生化转化第二阶段的是

- A. 葡萄糖醛酸结合反应
- B. 氧化反应
- C. 还原反应
- D. 水解反应
- E. 酯化反应

正确答案: A

例题 86.属于酮体的是

- A. a-酮戊二酸
- B. 乙酰乙酸
- C. 肌醇
- D. 胆汁酸
- E. 琥珀酰 CoA

正确案■ B

例题 87.诚吟核苷酸的分解代谢终产物是

- A. 尿酸

- B. 酮体
- C. B-丙氨酸
- D. B-氨基羟丁酸
- E. 尿素

正确答案:A

例题 88.比较不同个体之间的心泵功能,宜选用的评定标准是

- A. 每搏输出量
- B. 每分输出量
- C. 射血分数
- D. 心指数
- E. 心脏做功量

正确答案:D

例题 89.虹液中 CO₂的主要运输形式是

- A. 和水结合形成碳酸
- B. 形成碳酸氢盐
- C. 形成一氧化碳血红蛋白
- D. 形成氨基甲酸血红蛋白



金英杰医学山东总校区

E. 物理溶解

* B

例题 90 促使胰蛋白酶原转变为胰蛋白酶的最重要的物质是

- A. 胃酸
- B. 胰蛋白酶
- C. 糜蛋白酶
- D. 肠激酶
- E. 组织液

正确答案■ D

例题 91. 阑尾痛的主要特点是

- A. 刺痛
- B. 慢痛
- C. 定位不精确
- D. 必有牵涉痛
- E. 对牵拉不敏感

正确答案■ C

例题 92. 心动周期中, 主动脉压的最高值为

- A. 舒张压
- B. 循环系统平均充盈压
- C. 平均动脉压
- D. 收缩压
- E. 脉压

正确答案* D

例题 93. 卡列有关肺表面活性物质的描述不正确的是

- A. 维持肺泡的扩张状态
- B. 降低肺泡表面的张力
- C. 稳定肺泡容积
- D. 降低肺的顺应性
- E. 防止毛细血管内的液体流入肺泡内

正确案· D

例题 94. 藁患者突起畏寒、寒战, 体温 39 度, 这种体温升高是由于

- A. 产热中枢抑制
- B. 散热中枢抑制
- C. 皮肤血管收缩
- D. 调定点上移
- E. 体温调节功能障碍

正确答案: D

例题 95. 下列哪种组织细胞再生能力最强

- A. 骨组织
- B. 神经节细胞
- C. 软骨细胞

D. 心肌

E. 神经胶质细胞

正确答案■ E

例题 96. 癌细胞坏死的主要形态学特征是

- A. 核分裂
- B. 细胞核异型
- C. 线粒体肿胀
- D. 细胞核碎裂
- E. 细胞质脂质增多

正确答案· D

例题 97. 原位癌是指

- A. 异型增生细胞累及全层, 侵破基膜
- B. 异型细胞累及上皮层的下 1/3
- C. 上皮细胞异乎常态的增生
- D. 异型细胞累及上皮层的下 2/3
- E. 异型细胞累及上皮全层, 未突破基膜

正确答案■ E

例题 98. 浦肯野细胞大量增加最常见于

- A. 细胞萎缩
- B. 细胞坏死
- C. 细胞凋亡
- D. 细胞水样变
- E. 细胞玻璃样变

正确答案: A

例题 99. 属于血栓结局描述的是

- A. 溶解
- B. 钙化
- C. 软化
- D. 机化
- E. 硬化

正确答案: E

例题 100. 癌与肉瘤的主要区别是

- A. 发生的部位不同
- B. 肿瘤的颜色不同
- C. 肿瘤的质地不同
- D. 发生的年龄不同
- E. 组织来源不同

正确答案: E



金英杰医学山东校区