

计划生育（中级）

专业代码:360

精华必背考点

-
- 1、精子通过人附睾的运行时间一般为**数天**
 - 2、目前认为**附睾**是精子受精能力形成与调控的中心
 - 3、精液的组成是**精子、附睾液和前列腺的分泌物**
 - 4、精子形成直接由**精子细胞变形**而来
 - 5、正常男性一次排出精液的数量是 **2 ~ 5ml**
 - 6、尿道球腺位于**尿生殖膈内**
 - 7、前列腺的神经内分泌细胞不能产生**胰岛素**
 - 8、**克氏(Klinefelter)综合征**患者的雄激素水平明显降低
 - 9、正常成人前列腺重量约 **20g**
 - 10、人类胚胎发育期间间质细胞分泌睾酮的最早时间是 **10 周左右**
 - 11、精子成熟于**附睾**
 - 12、精索内容物为**睾丸动脉，蔓状静脉，淋巴管，神经，输精管，鞘韧带(鞘突韧带的残余)**
 - 13、抑制性驱动(sexual drive)的中枢神经递质的受体是 **5-羟色胺受体**
 - 14、所有女性甾体激素生物合成的前体物质是**孕烯醇酮**
 - 15、妊娠 40 周，规律性腹痛 20 小时，破膜 6 小时，宫底剑下 3 指，母体腹部右下方触及圆而硬的胎头，胎心位于脐耻之间，手脱出于阴道外口，右肩已入阴道内骶岬前方，胎位最正确的诊断是**肩右后位**
 - 16、**骨盆漏斗韧带**是临床上寻找卵巢血管的标志
 - 17、进入第二产程的标志是**宫口开大 10cm**
 - 18、若排出的卵未受精，黄体开始退化萎缩是在其形成后的第 **10 天**
 - 19、中枢神经系统由**外胚层**分化而来
 - 20、正常排卵周期中，宫颈黏液清亮，有粗大分支，典型的羊齿状结晶出现在**月经周期中期**

-
- 21、排卵时排出的结构是卵细胞、透明带、放射冠、小部分卵丘内颗粒细胞
 - 22、阴道上段的血供主要由子宫动脉宫颈-阴道支供应
 - 23、仅由腹膜形成的韧带是子宫阔韧带
 - 24、早期妊娠最重要的症状是停经
 - 25、产后第二天，下腹阵痛，出汗较多，无恶心呕吐，查体温 37.6℃，脐下三横指可触及一硬块，白细胞为 $120 \times 10^9 / L$ ，中性为 0.78，可能的诊断是产后宫缩痛
 - 26、子宫壁的外层称浆膜层
 - 27、女性青春期后，卵巢周期中，体内主要的雌激素和孕激素是雌二醇和孕酮
 - 28、排卵后未孕女性黄体萎缩的原因是雌激素和孕激素的负反馈作用
 - 29、胚外中胚层形成于受精后第二周
 - 30、胎盘接替卵巢产生甾体激素是在妊娠的 10 周后
 - 31、正常月经周期阴道出血的发生是由于血中雌激素与孕激素水平下降
 - 32、排卵后，由于孕激素对体温中枢的作用，基础体温可上升 $0.3 \sim 0.5^\circ C$
 - 33、B 型超声检查，最早见到妊娠环的时期是妊娠 5 周
 - 34、促使卵巢中成熟卵泡排卵的激素是黄体生成素
 - 35、卵子受精是在输卵管的壶腹部与峡部连接处
 - 36、成熟卵泡直径可达程度是 $10 \sim 20mm$
 - 37、成年妇女的卵巢大小约 $4cm \times 3cm \times 1cm$
 - 38、月经黄体维持的时间为 2 周
 - 39、睾丸活检固定液宜用 Bollin 液
 - 40、前列腺炎急性炎症期禁忌的检查是尿道内器械检查
 - 41、正常男性精液的 pH 值是 $7.2 \sim 7.8$

-
- 42、疾病诊断的首要环节和最基本的检查步骤是**病史采集**
- 43、输精管结扎术中，使用输精管外固定钳先固定输精管再分开阴囊皮肤的术式是**直视钳穿法**
- 44、输精管结扎术后，阴囊皮下出血的首选处理是**局部压迫**
- 45、判断输精管结扎术成功的客观指标是**精液两次离心沉淀无精子**
- 46、输精管结扎术中需切除 **1.0cm** 长一段输精管
- 47、输精管结扎术后发生并发症的危险信号是**术后 1 周内阴囊内肿胀加疼痛**
- 48、直视钳穿法输精管结扎术的最大特点是**先将输精管固定**
- 49、患者，男性，36 岁，有勃起功能障碍病史，要求做输精管绝育手术，医生的意见是**慎重考虑手术**
- 50、输精管结扎术后数小时，阴囊极度肿大，青紫，局部胀痛，甚至阴茎会阴及腹股沟区**肿胀青紫**，严重时休克，属于**阴囊血肿**类型
- 51、输精管注射粘堵法的最大特点是**输精管腔内注射药物**
- 52、输精管再通与**输精管残端处理方式**最密切
- 53、异位睾丸中最常见的是**间质辜**
- 54、最大尿流率是 **10mL/s** 时提示有尿路梗阻
- 55、前尿道单纯性狭窄是指单发而无并发症，且狭窄长度为 **3cm**
- 56、骨盆骨折最易损伤的尿道部位是**膜上尿道**
- 57、球部尿道损伤在施行尿道吻合术时不必**保持黏膜内翻**
- 58、睾丸下降固定术 **2 岁**时手术为宜
- 59、尿道损伤最常见的并发症是**损伤性尿道狭窄**
- 60、青年男性，砸伤半小时，BP 120/70mmHg，神志清，不能排尿，下腹膨隆，尿道口有少量滴血，X 线示骨盆骨折，最佳处理是**耻骨上高位膀胱造瘘**

-
- 61、正常男性精浆组成中前列腺液所占比例是 20% ~ 30%
- 62、后尿道严重破裂或断裂时，患者内出血及尿外渗严重，此时的处理是纠正休克后，只行膀胱造瘘
- 63、患者，男性，35 岁，绝育术后 4 天，因发热 38°C，阴囊疼痛、肿胀、脓尿就诊，可能的原因为感染性附睾炎
- 64、睾丸鞘膜积液的最佳治疗方法是手术治疗
- 65、骑跨伤造成尿道损伤时尿外渗应采用多处切开阴囊、会阴及腹壁进行引流
- 66、精索静脉曲张伴有精子异常的不育者，最佳治疗为精索静脉高位结扎术
- 67、能确诊前列腺癌所必用的方法是经直肠 B 超引导下前列腺穿刺活检
- 68、 α -受体激动剂治疗逆行射精
- 69、勃起功能障碍的治疗中西地那非疗效既肯定又安全
- 70、抗抑郁药可治疗男性早泄
- 71、24 岁已婚妇女来门诊检查，主诉停经 77 天，具有意义的检查是 B 型超声波检查
- 72、患者，35 岁，孕 9 周，腹痛、阴道流血十天，为确定妊娠能否再继续，宜首选的检查方法是 B 型超声波
- 73、年轻妇女，闭经泌乳，X 线检查蝶鞍稍增大，内分泌激素测定，PRL 值异常增高对诊断有意义
- 74、阴道避孕环属于缓释避孕系统类节育措施
- 75、甾体激素避孕药的作用机制是抑制排卵
- 76、米非司酮配伍米索前列醇终止妊娠，成功率可达 90%
- 77、口服避孕药 1 号需连服 22 天
- 78、复方炔雌醚属于长效口服避孕药

79、患者，35岁，女性，采用皮下埋植避孕4+年，闭经1年。应给予的处理是**取出皮下埋植剂观察**

80、择期手术的妇女，术前至少应停用避孕药**4周**

81、中国研究成功的1号避孕药是**复方炔诺酮**

82、国产单相口服避孕药的避孕有效成分存在于**药片的糖衣表层中**

83、我国开始临床应用药物避孕是在**1963年**

84、口服雌激素效应最强的是**乙炔雌二醇**

85、药物流产最常用的药物是**米非司酮**

86、复方短效口服避孕药中的炔雌醇含**0.03mg**时易发生突破性出血

87、皮下埋植的部位，应在肘关节上**6~8cm**

88、**先兆流产**适宜药物流产

89、米非司酮的作用机理是**拮抗孕激素**

90、米非司酮药物流产适用于**停经7周以内**

91、口服避孕药2号是**复方甲地孕酮**

92、妈富隆的成分组成为**地索高诺酮0.15mg+炔雌醇0.03mg**

93、根据子宫腔大小，**宫腔<5.5cm**，均可放置IUD

94、患者，29岁，女性，停经85天，终止妊娠后要求放置宫内节育器，最佳时间是在术后**立即放置**

95、经产妇，产后半年月经未复潮，在哺乳中，要求避孕。检查：子宫颈光滑，外口1cm，宫颈位于阴道口上1cm，子宫大小正常，双附件无异常。宜选用的避孕方法是**宫内节育器**

96、患者，35岁，女性，放置宫内节育器后经期延长、经量过多2年。检查：子宫正常大小，双附件未见异常，经治疗半年后无好转。**取出宫内节育器**，改用其他避孕方法

-
- 97、左旋 18 甲基炔诺酮 T 形宫内节育器的有效期是 **15 年**
- 98、经期延长是指月经期 **> 7 天**
- 99、患者，54 岁女性，放置宫内节育器已 30 年，现已绝经 2 个月，**半年~1 年**取出 IUD 为宜
- 100、活性γ形 IUD 含吲哚美辛为 **25mg**
- 101、患者，38 岁女性，宫内置聚乙烯 V 形节育器已 4 年，阴道不规则流血 3 个月。检查子宫大小正常，最常选择的处置方法是 **B 超检查**
- 102、患者，28 岁，女性，月经后第 3 天，置宫内节育器，探宫腔 6cm，选择 VCu200 节育器最适宜的型号是 **24 号**
- 103、检查宫内节育器是否存在最常用的方法是**盆腔 B 超检查**
- 104、患者，28 岁，妇女，放置 IUD 10 天。第二天出现发热，T38.2℃，伴下腹疼痛，有压痛，无反跳痛。妇查：宫颈有举痛，宫体常大，有压痛，左附件区有压痛。最可能的诊断是**合并感染**
- 105、能够防止置器后月经过多的 IUD 是**活性γ形 IUD**
- 106、患者，34 岁，女性，宫内置 IUD 2 年，阴道不规则流血伴有下腹痛 2 个月。化验血红蛋白 100g/L，查体子宫正常大小，B 超检查显示 IUD 上缘距宫底浆膜层 3cm，首选的处置应是**取出节育器**
- 107、月经过多是指月经量 **> 80m**
- 108、体温在 **37.5℃**以上者，不宜放置 IUD
- 109、取环时应注意，在钩取宫内节育器时，为避免损伤宫颈管，环钩要**平位**出子宫内口
- 110、术时选择与子宫腔**大小、形态相符**的 IUD，可杜绝副反应的出现
- 111、放置宫内节育器时应注意，上环时无需扩宫，但宫口较紧时，应逐号扩宫至 **6 号**

-
- 112、剖宫产术后宫腔内放置节育器的时间应是 6 个月后
- 113、放置 IUD 后的感染一般发生在 20 天内
- 114、我国优选 IUD 的标准是放置 1 年时的妊娠率 $\leq 2\%$
- 115、经产妇，30 岁，已有一 5 岁小孩，放置 IUD 4 年，停经 50 天，恶心、呕吐 1 周，妇科检查，子宫如孕 7 周大小，质软，双附件未见异常，尿 β -HCG $> 25\text{U/L}$ ，尿酮体(±)。B 超检查，宫内见妊娠囊及节育环，恰当的处理方法是人工流产同时取环
- 116、产后 3 个月的哺乳妇女，在行宫内节育器的放置术中，突然出现腹痛，最可能的诊断是子宫穿孔
- 117、年龄轻、孕产次少的妇女易于脱落和带器妊娠，特别是环形 IUD 更明显
- 118、葡萄胎清宫术后 3 年以后可以放置宫内节育器
- 119、排卵后卵子在体内的寿命是 12 ~ 24 小时
- 120、自然避孕法时，可通过测量基础体温推测安全期
- 121、安全期避孕是最不可靠的避孕方法
- 122、患者，女性，28 岁，G3P1，末次妊娠 3 个月前，诊断为葡萄胎，吸宫 2 次。术后定期随访，恢复良好。目前该病人避孕措施可以选择阴茎套避孕
- 123、新婚夫妇短期避孕，最宜选择避孕方法为阴茎套
- 124、避孕方法失败率最低并能防止性传播疾病(STD)传播是阴茎套
- 125、不宜使用避孕套的情况是对乳胶过敏
- 126、紧急避孕药能使排卵延迟，服药后如不采取可靠避孕措施，很可能造成妊娠
- 127、紧急避孕药分为激素类和非激素类
- 128、速效避孕药的服用时间不受经期限制，因此可用于短期探亲夫妇
- 129、避免绝育后感染的措施中，不必要的是术前三天给予广谱抗生素预防感染

-
- 130、输卵管结扎术的术前检查中必须做的是**血常规**
- 131、判断输卵管绝育是否成功，可靠的方法是**子宫输卵管碘油造影**
- 132、**阻止精子、卵子相遇**为女性绝育方法的避孕原理
- 133、注射粘堵法与直视钳穿法最大不同点是**不需切断输精管**
- 134、防止输卵管结扎术失败的技术要点是找到输卵管**追踪到伞端**
- 135、患者，32岁，女性，已婚，G3P0，患风湿性心脏病10余年，现孕37周，心功能Ⅲ级，住院待产已3+月，准备剖宫产终止妊娠。剖宫产手术同时，还应考虑手术同时行**双侧输卵管结扎术**
- 136、患者，28岁，女性，人工流产术后38天无月经复潮，近4天下腹及肛门坠痛难忍。查体：子宫近鸭卵大，附件正常。首先应**探查宫腔**
- 137、患者，女，28岁，妊娠13周，需终止妊娠，最常用的方法是**钳刮术**
- 138、人工流产综合征的原因是由于**迷走神经兴奋**
- 139、人工流产出血的概念是吸宫术后出血超过**200mL**
- 140、人工流产术后3天体温37.8℃，下腹坠痛并有血性分泌物，子宫稍大、触痛明显，附件正常，应考虑**子宫肌炎**