

## 2023 年临床执业第二单元考生回忆真题试卷

温馨提示:

题目源自考生回忆,内容的进一步完善还需要大家的积极参与,若有不同建议及补充请联系身边的金英杰老师,我们会根据大家的反馈综合评估后进行实时修订,祝大家顺利拿证!

1.不具有内分泌功能的细胞是

- A.胰腺导管细胞
- B.睾丸间质细胞
- C.甲状旁腺主细胞
- D.肾上腺髓质细胞
- E.胃黏膜的 G 细胞

2.苯妥英钠的不良反应不包括

- A.牙龈增生
- B.共济失调
- C.肾损害
- D.过敏反应
- E.贫血

3.储存铁的指标是

- A.血清铁
- B.血清铁蛋白
- C.转铁蛋白饱和度
- D.肌红蛋白铁
- E.红细胞内铁

4.对于运动系统慢性损伤非甾体抗炎药使用,下列说法正确的是

- A.为了减轻肝功能损害可联合使用叫哌美辛和阿司匹林
- B.局灶浅表性病变可使用非甾体抗炎药口服液
- C.为了减轻胃肠功能损害可使用考克斯 1
- D.非甾体抗炎药可多种合用,加强疗效
- E.短期最低有效药物剂量

5.急性心肌梗死行 PCI 手术治疗的抗血小板药物用量用法

- A.阿司匹林 300mg+氯吡格雷 450mg
- B.阿司匹林 100mg+氯吡格雷 300mg
- C.阿司匹林 100mg+氯吡格雷 600mg
- D.阿司匹林 300mg+氯吡格雷 300mg

E.阿司匹林 300mg+氯吡格雷 600mg

6.高血压伴双侧肾动脉狭窄，禁用下列哪项药物

- A.坎地沙坦
- B.美托洛尔
- C.地尔硫草
- D.洋地黄
- E.呋塞米

7.急性白血病患者最不可能出现的临床表现是

- A.匙状甲
- B.脸色苍白
- C.牙龈出血
- D.持续高热
- E.间断性血尿

8.疟疾血常规典型表现

- A.白细胞升高
- B.粒细胞升高
- C.网织红细胞升高
- D.红细胞、血红蛋白减少
- E.血小板减少

9.锁骨骨折不需要手术的是

- A.锁骨中部 2/3 对位
- B.锁骨远端伴缘突韧带损伤
- C.不能耐受八字绷带包扎
- D.开放性损伤后三小时
- E.陈旧性骨折不愈合

10.有助于确诊 PNH 的实验室检查是

- A.骨髓细胞学检查
- B.网织红细胞检测
- C.外周血涂片
- D.血粒细胞弗莱尔检测
- E.红细胞渗透脆性试验

11.股骨头的营养动脉不包括

- A.旋髂深动脉
- B.股骨干滋养动脉升支
- C.旋股外侧动脉分支
- D.小凹动脉

E.旋股内侧动脉分支

12.治疗室上性心动过速的药物首选

- A.胺碘酮
- B.利多卡因
- C.腺苷
- D.美托洛尔
- E.维拉帕米

13.高血压眼底病变四期的表现是

- A.视网膜静脉交叉
- B.视盘水肿
- C.视网膜动脉反光增强
- D.视网膜棉絮状渗出
- E.视网膜动脉变细

14.伤寒的临床表现不包括

- A.出血性皮疹
- B.脾大
- C.相对缓脉
- D.表情淡漠
- E.持续高热

15.以无痛性肉眼血尿为主要临床表现的是

- A.膀胱肿瘤
- B.肾结核
- C.肾囊肿
- D.上尿路结石
- E.肾盂肾炎

16.Addison 病的主要治疗方式为

- A.糖皮质激素替代治疗
- B.盐皮质激素替代治疗
- C.手术治疗
- D.对症治疗
- E.静脉输注糖皮质激素

17.小剂量可以增加肾动脉血流量的是

- A.肾上腺素
- B.去甲肾上腺素
- C.异丙肾上腺素
- D.多巴胺
- E.氨茶碱

18.评价肾小球滤过率最常用的指标是

- A.血尿素
- B.血肌酐
- C.菊粉清除率
- D.内生肌酐清除率
- E. EGFR

19.大量心包积液的典型体征是

- A.颈静脉怒张
- B.心输出量下降
- C.奇脉
- D.低血压
- E.口唇发绀

20.二尖瓣狭窄咯血原因是

- A.支气管静脉破裂
- B.肺毛细血管破裂
- C.支气管动脉破裂
- D.肺淤血
- E.肺栓塞

21.确诊甲状旁腺亢进，可以用下列哪项检查

- A.颈部 CT
- B.纵隔 CT
- C.Mibi 核素扫描
- D.颈部超声
- E.颈部核磁共振

22.需要血浆置换的疾病是

- A.急性肾炎
- B.急性肾小管坏死
- C.急性间质性肾炎
- D.狼疮肾炎
- E. ANCA 相关性血管炎伴肺出血

23.碱性尿液中形成的结石

- A.尿酸结石
- B.草酸结石
- C.胱氨酸结石
- D.磷酸盐结石
- E.黄嘌呤结石

24.我国正常血压标准是

- A.低于 150/90mmHg
- B.低于 140/90mmHg
- C.低于 120/80mmHg
- D.低于 135/80mmHg
- E.低于 130/80mmHg

25.伸直型桡骨踝上骨折最常见于

- A.中年女性
- B.儿童
- C.中年男性
- D.老年男性
- E.老年女性

26.下列有关蛋白尿的说法错误的是

- A.尿蛋白大于 3.5g，每天为大量蛋白尿
- B.尿中 B 微球蛋白蛋白为肾小管性蛋白尿
- C.尿中出现 IgG 为肾小管性蛋白尿
- D.含本周蛋白的为溢出性蛋白尿
- E.肾小球性蛋白尿以白蛋白为主

27.下列属于镇静催眠药过量的常见表现是

- A.多语、多汗
- B.恶心呕吐
- C.意识障碍
- D.耳鸣头昏
- E.焦虑不安

28.风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄最常并发的心律失常

- A.窦性心动过速
- B.室性期前收缩
- C.窦性心动过缓
- D.房室传导阻滞
- E.心房颤动

29.以下哪项是乙类传染病

- A. 疫
- B.霍乱
- C.流行性腮腺炎
- D.风疹
- E.艾滋病

30.缺铁性贫血中最常见的是

- A.慢性胃炎

- B.慢性溶血
- C.慢性感染
- D.慢性肝炎
- E.慢性失血

31.前列腺癌首选治疗方法

- A.手术
- B.化疗
- C.内分泌治疗
- D.观察
- E.放疗

32.肾小球疾病不包括

- A.急性肾小球肾炎
- B.急进性肾小球肾炎
- C.无症状血尿蛋白尿
- D.IgA 肾病
- E.肾病综合征

33.伤寒的血常规变化

- A.淋巴细胞百分比减少
- B.白细胞减少
- C.红细胞及血红蛋白减少
- D.中性粒细胞百分比减少
- E.血小板减少

34.小儿支原体肺炎感染用药

- A.阿奇霉素
- B.左氧氟沙星
- C.环内霉素
- D.青霉素
- E.头孢哌酮舒巴坦

35.甲状腺滤泡旁细胞分泌降钙素的作用

- A.促进细胞内的氧化作用
- B.维持糖和蛋白质的代谢
- C.促进机体的发育
- D.抑制骨骼的吸收
- E.促进机体各系统和器官的生理

36.烧神经深支受损表现

- A.虎口感觉障碍
- B.能伸腕，但是不能伸拇指
- C.尺侧一个半手指感觉缺失



- D.不能对掌
- E.请等待更新

37.骨筋膜室综合症的晚期并发症是

- A.缺血性骨坏死
- B.肾衰竭
- C.缺血性肌挛缩
- D.肺栓塞
- E.损伤性骨化

38.关于成人心肺复苏，下列错误的是

- A.胸外按压与人工呼吸的比例 30:2
- B.行心肺复苏前先人工呼吸 2 次
- C.胸骨按压深度至少 5cm
- D.胸外按压是体外循环
- E.按压频率至少 100 次/分

39.患者发热，尿蛋白(+)，全身淋巴结肿大，腓肠肌压痛(+)。首选什么检查

- A.血液涂片
- B.粪便常规
- C.血培养
- D.粪培养
- E.显微凝集试验

40.女性，尿频、尿痛伴肉眼血尿 1 天既往体健。查体无异常。亚硝酸阳性尿沉渣检查提示红白细胞满视野，抗生素疗程一般为多少天

- A.14 天
- B.3 天
- C.5 天
- D.7 天
- E.10 天

41.男，外伤，24 小时后到院检查，血压 150/100mmHg，体温 37.8℃，骨盆分离试验阳性，问病人发热的主要原因

- A.泌尿系感染
- B.休克
- C.肺炎
- D.肺栓塞
- E.骨血肿吸收热

42.女，31 岁，反复尿频尿痛一年，使用抗生素治疗无效，下列尿常规中最可能的是

- A.尿呈酸性，有脓细胞，无细菌生长
- B.尿呈酸性，有脓细胞，有细菌生长
- C.尿呈中性，有脓细胞，有细菌生长

- D.尿呈碱性，有脓细胞，无细菌生长
- E.尿呈碱性，有脓细胞，有细菌生长

43.男，65岁，胸痛3小时，感胸闷心悸，伴恶心、呕吐、大汗，口服硝酸甘油不缓解，查体：心率40次/分，大炮音。冠脉造影示右冠严重堵塞。下列可能出现的心律失常是

- A.三度房室传导阻滞
- B.二度房室传导阻滞
- C.一度房室传导阻滞
- D.一度窦房传导阻滞
- E.二度房室传导阻滞

44.女，70岁，突发心悸两小时，伴头晕乏力出冷汗，BP80/50mmHg，心脏无扩大，心率180次/分，心率绝对不齐第一心音强弱不等，各瓣膜听诊未闻及病理性杂音，最合适的治疗是

- A.临时心脏起搏
- B.胺碘酮静注
- C.同步电复律
- D.美托洛尔静注
- E.电除颤

45.男性，27岁，腹泻、呕吐1天。7月13日就诊，一天前稀水样便10次，呕吐1次，查体：T37.5℃，P110次/分，R24次/分，BP90/52mmHg，WBC $8 \times 10^9$ /L，N0.78，为快速临床诊断，应立即进行的检查是

- A.血生化检查
- B.粪常规及涂片
- C.血培养及药敏
- D.类动力及促动试验
- E.粪培养及药敏

46.女性，57岁。左手拇指晨起僵硬伴疼痛3年，近半年出现该处的肿胀及活动受限，左手手指及指掌可触及硬性结节被动活动患指可出现伴疼痛的弹响。临床诊断最可能是

- A.骨关节炎
- B.关节内游离
- C.类风湿性关节炎
- D.风湿性关节炎
- E.狭窄性腱鞘炎

47.一男性发热三天，服用扑热息痛治疗后，查血常规显示中心粒细胞中毒现象，白细胞 $1.0 \times 10^9$ /L，红细胞血小板正常，中性粒细胞绝对值 $<0.5 \times 10^9$ /L，应考虑为什么疾病

- A.低增生性白血病
- B.粒细胞缺乏
- C.传染性单核细胞增多症
- D.嗜酸细胞增多症
- E.骨髓异常增生综合征



48.行人跑步不慎跌倒，肩部着地，方肩畸形，活动受限，搭肩试验阴性，影像学检查示:脑骨大结节下方骨皮质不连续，向内侧移位，属于脑骨近端骨折 neer 分型

- A.neer 一部分骨折
- B.neer 二部分骨折
- C.neer 三部分骨折
- D.neer 四部分骨折
- E.neer 五部分骨折

49.男，66岁。发作性胸痛1小时。在问病史过程中突然跌倒，对呼唤和推搡无反应。此时应立即采取的措施是

- A.做心脏彩超
- B.送抢救室
- C.触诊大动脉
- D.做心电图
- E.查看瞳孔

50.一男子偶有头痛胸闷，多次自测血压150/110mmHg左右，就医按指导控制饮食、运动后仍控制不佳，测血压150/95mmHg，双侧肾动脉B超无殊应采取的治疗是

- A.口服氢氯噻嗪
- B.继续观察半年
- C.口服比索洛尔
- D.症状出现时舌下含服托那普利
- E.请等待更新

51.中年男性，急性广泛前壁心肌梗死入院。第二天，患者气促加重BP76/50mmHg，P130次/分，双中下肺可闻及湿罗音。治疗选用

- A.酸甘油
- B.味塞米
- C.去甲肾上腺素
- D.肾上腺素
- E.洋地黄

52.女性患者，血压190/110，B超提示左肾动脉狭窄55%，右肾动脉狭窄50%，可能是什么原因导致血压升高

- A.激活交感神经系统
- B.激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统
- C.激活激肽系统
- D.血管加压素升高
- E.心房利钠肽升高

53.男，58岁，突发胸痛2小时，呈持续性撕裂样疼痛，向肩背部和腰部放射既往有高脂血症和高血压5年，未规范治疗。查体，左上肢血压140/85，右上肢180/105，心率102次/分，以下哪种检查诊断

- A.主动脉CTA

- B.胸部 X 线
- C.心电图
- D.超声心动图
- E.冠状动脉造影

54.男, 62 岁, 既往陈旧性心肌梗死 PCI 术后 3 年, 2 年半前开始出现活动后心累, 夜间阵发性呼吸困难, 间断双下肢水肿, 口服利尿药治疗有效。心脏超声示:左室扩大, 左室前壁节段性运动减弱, LVEF35%, 近期开始出现阵发性房颤, 推荐使用的药物不包括

- A.普萘洛尔
- B.普罗帕酮
- C.地高辛
- D.比索洛尔
- E.胺碘酮

55.患者, 女, 70 岁。反复双膝关节疼痛 10 年, 逐渐加重 2 年, 活动时关节有弹响。体检: 双膝关节骨摩擦音(+), 但无明显红肿及压痛。最可能的诊断是

- A.骨关节炎
- B.类风湿关节炎
- C.反应性关节炎
- D.强直性脊柱炎
- E.系统性红斑狼疮

56.化学药品 A 适应症为原发性高血压现拟用 B 药进行人体生物等效性研究, 口服给药剂量 0.5mg, A 药与 B 药的曲线下面积(AUC)分别为 27.2ng/h/ml 和 23.3ng/h/ml, 上面关于 A 药与 B 药的生物利用度描述正确的是

- A.A 药与 B 药, 不具有生物等效性
- B.A 药的绝对生物利用度是 54%
- C.B 药的绝对生物利用度是 46%
- D.B 药对 A 药的相对生物利用度为 86%
- E.A 药对 B 药的相对生物利用度为 86%

57.女, 16 岁, 随旅行团到边远地区旅游, 晚饭后发生腹痛, 腹泻, 一天腹泻 4 次, 于当地卫生院治疗后好转, 第二天烈日下阳光照射后皮肤出现红斑, 癌痒。可能是什么治疗药物的不良反应

- A.头孢他呢
- B.庆大霉素
- C.盐酸小梁碱
- D.氧氟沙星
- E.峰比酮

58.女, 66 岁, 发热伴尿急、尿频、尿痛 3 天。既往糖尿病病史 10 年。查体: 左肾区叩击痛(+), 尿沉渣镜检: RBC3~5/HP, WBC 满视野。清洁中段尿细菌定量培养:大肠埃希菌 106cfu/ml, 应首选

- A 抗生素治疗 1 周

- B. 抗生素治疗 2 周
- C. 不使用抗生素治疗
- D. 抗生素治疗 3 天
- E. 单剂量抗生素

59. 女, 35 岁, 阵发性头痛 2 个月

近一周来间断发生多次癫痫, 平日喜食烧烤, 查体: 神情, 颈无抵抗, 躯干和四肢可触及多个皮下结节, 血 WBC $16 \times 10^9$ , N0.61, L0.20, E0.12 头颅 CT: 脑内可见多个 0.5-1.0cm 结节最可能的是

- A. 脑出血
- B. 癫痫
- C. 脑肿瘤
- D. 脑脓肿
- E. 囊尾物病

60. 男, 68 岁, 胸痛 3 年, 位于胸骨后凌晨发作, 数分钟后可自行缓解, 发作时心电图提示 V<sub>1</sub> ~ V<sub>6</sub> 导联压低 0.3mv, 后复测心电图为正常, 该患者为

- A. 中间综合征
- B. 初发型心绞痛
- C. 变异型心绞痛
- D. 恶化型心绞痛
- E. 劳累型心绞痛

61. 女, 30 岁。月经增多, 心肺正常, Hb86g/L, PaO<sub>2</sub>82.3mmHg, PaCO<sub>2</sub>37.6mmHg, pH7.43。血氧容量降低的原因是

- A. 二氧化碳下降
- B. 红细胞内 2-3-DPG 下降
- C. 体温下降
- D. pH 下降
- E. 蛋白下降

62. 男, 40 岁, 股骨干骨折入院, 入院次日突然出现呼吸困难, 继而昏迷, 广泛皮下出血点, 应考虑为

- A. 脂肪栓塞
- B. 骨筋膜室综合征
- C. 骨折端再发严重移位
- D. 感染
- E. 大血管破裂

63. 男, 65 岁。腹泻一周, 心悸 2 天。既往有高血压、房颤病史。口服华法林培哌普利, 硝酸酯类, 地高辛治疗。急诊心电图: 频繁室性期前收缩, 短阵室性心动过速。如果想探究患者病情转变的原因, 应选择哪项检查

- A. 地高辛浓度测定
- B. 凝血时间测定

C.D-二聚体测定

D.心肌坏死标志物测定

E.脑钠肽

64.男性，28岁，发热2周，最高温度39.6°C，伴腹痛、腹泻，稀便3-4次/天查体:一个月前下河游泳下肢一过性皮炎，肝肋下2cm，有压痛，脾肋下可触及，WBC15.7x10<sup>9</sup>，N0.42，E0.4，可选以下哪种药物进行治疗

A.阿苯达唑

B.多西环素

C.吡喹酮

D.左氧氟沙星

E.甲硝唑

65.男性，68岁，发热，头痛腰痛，腹泻三天，少尿300ml一天，查体体温38.5°C，心率116次/分，呼吸24次/分面部充血，眼睑水肿，软聘有出血点血常规Hb134g/l，WBC14x10<sup>9</sup>/L，N:0.84，粪常规及镜检:WBC:5/hp，为明确诊断，应当首选检查

A.血涂片

B.血培养

C.汉坦病毒抗体

D.钩端螺旋体抗体

E.EB病毒抗体

66.男性，16岁，参加1500米长跑后出现头晕，乏力，尿蛋白(++)，休息1天后症状消失，尿蛋白(-)，最可能的情况是

A.分泌性蛋白尿

B.组织性蛋白尿

C.肾小管性蛋白尿

D.功能性蛋白尿

E.溢出性蛋白尿

67.有研究员的单盲的实验中，针对甲类，乙类药物对轻中度原发性高血压降压疗效，对分组不了解的是

A.研究员

B.统计人员

C.患者本人

D.患者家属

E.测血压的护理人员

68.女，65岁，糖尿病12年，视物模糊3月。眼底检查:眼底微血管瘤，少量出血伴棉絮状软性渗出。患者糖尿病视网膜病变分期是

A.2期

B.4期

C.3期

D.1期

E.5期

69.男性患者，高处坠落，腰背挫伤，双下肢弛缓瘫痪，来院急诊。查体：腰部不能活动，双侧腹股沟以下感觉、运动及反射消失。X线显示胸椎骨折。后其双下肢功能逐渐恢复。该患者的脊髓伤可能是

- A.脊髓半切综合征
- B.脊髓横断损伤
- C.脊髓空洞症
- D.脊髓震荡
- E.马尾综合征

70.男，65岁，腰痛数年，直腿抬高试验加强试验(+)。查体：左拇指(+)，背伸无力。最可能的原因是

- A.L4-L5，L5神经根受压
- B.L3-L4，L4神经根受压
- C.L2-L3，L3神经根受压
- D.S1-S2，S2神经根受压
- E.L5-S1，S1神经根受压

71.男，23岁，高处摔下后右手着地，伤后右前臂畸形，活动受限。查体：右前臂畸形，肿胀，挠骨中下1/3交界处可触及骨擦感，腕部可触及异常凸起的尺骨远端，未及尺骨摩擦感，最可能的诊断是

- A.Smith骨折
- B.Monteggia骨折
- C.colles骨折
- D.Barton骨折
- E.Galeazzi骨折

72.女，32岁，怕冷，嗜睡两个月余。查体：脉搏56次/分，眼睑水肿，甲状腺弥漫性肿大，质地韧。最可能的甲状腺功能表现是

- A.TT3正常，TT4正常，TSH减少
- B.TT3下降，TT4下降，TSH增加
- C.TT3增加，TT4增加，TSH减少
- D.TT3增加，TT4增加，TSH增加
- E.TT3正常，TT4正常，TSH增加

73.男，22岁，修理水泵时绞伤右手，查体：右手掌侧可见不规则伤口，出血不止，2-5指远端皮肤苍白，感觉减退，指间关节屈曲受限，行清创，肌腱神经血管吻合术。术后处理正确的是

- A.患肢制动，弹力绷带固定
- B.局部冰敷，预防血肿形成
- C.包扎时指蹼间隔开，露出指尖
- D.石膏固定手指于伸直位
- E.励患者早期活动手指



74.女, 50 岁, 活动后胸闷 1 年  
夜间阵发性呼吸困难 4 天。查体

BP130/80mmHg, P 亢进, 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音, 该患者最易出现的心律失常是

- A.三度房室传导阻滞
- B.室上性心动过速
- C.心房颤动
- D.室性心动过速
- E.心房扑动

75.男, 18 岁, 右踝扭伤 2 小时, 右踝肿胀, 外踝前方轻压痛, 关节稳定性可, x 线未见骨折移位, 早期治疗不恰当的是

- A.局部按摩
- B.休息, 减少行走
- C.弹力绷带适当固定
- D.冷敷
- E.右下肢抬高

76.男性, 22 岁。2 周前发热病史, 心悸、乏力 3 天。查体: 心率 100 次/分, 无不齐, 心脏超声未见明显异常。最可能的诊断是

- A.扩张型心肌病
- B.肥厚型心肌病
- C.急性病毒性心肌炎
- D.冠心病
- E.急性心肌梗死

77.女, 68 岁, 体检时发现血压偏高但无明显症状, 自我感觉良好, 未进行规范化治疗。今日早餐后常规散步, 突感腹部不适, 随到社区医院就诊, 初步考虑为胃肠炎, 给与静脉补液治疗。回家途中, 突感胸闷, 倒地不起, 抢救无效死亡。尸检发现心包腔内有血液, 约 200ml。该患者最可能的心脏病变是

- A.心肌间大量淋巴细胞浸润
- B.心肌纤维增粗肥大
- C.心肌间可见肉芽肿形成
- D.心肌间广泛纤维化
- E.左室前壁透壁心梗

78.女性, 62 岁, 左腰痛伴发热 5 天, 最高体温 39.2℃, 抗生素治疗体温无明显下降, 左肾区叩击痛, 心率 102 次/分血压 110/75mmHg。血常规: 白细胞  $15.3 \times 10^9$ , N0.85, 尿沉渣: 白细胞满视野, RBC3-5/HP。泌尿 CT 平扫: 左肾扩张积水, 左输尿管上段 1.2cm 结石, 下一步治疗措施是

- A.体外冲击波碎石
- B.输尿管镜取石
- C.尿道逆行置管术
- D.膀胱输尿管镜取石



E.经皮肾镜取石

79.男, 50 岁, 发作性胸痛 1 月, 常于凌晨 3 点左右发作, 白天活动无特殊不适 Holter 提示胸部导联 ST 段抬高, 症状休息后缓解, 多次查 cTn 正常, 冠脉 CTA 提示前降支轻度狭窄。患者长期治疗最佳的是什么

- A. 尼可地尔
- B. 曲美他嗪
- C. 美托洛尔
- D. 卡托普利
- E. 地尔硫草

80.男, 32 岁。体检时心脏听诊发现心尖区收缩中期喀喇音, 闻及 3/6 级收缩中晚期吹风样杂音, X 线显示心影正常。拟诊断为

- A. 二尖瓣脱垂
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄
- D. 主动脉关闭不全
- E. 主动脉狭窄

81.女, 59 岁。因高热、腹泻静脉点滴庆大霉素治疗, 5 天后出现恶心、呕吐、伴少尿。查血白细胞总数及分类正常, 尿比重 1.010, 蛋白 (+), 红细胞 0~2/HP, 白细胞 3~5/HP。血肌酐 320 $\mu$ mol/L, 尿素氮 17mmol/L, 尿钠 100mmol/日。该患者肾功能减退最可能的原因是

- A. 急性肾小管坏死
- B. 肾前性氮质血症
- C. 急性肾小球肾炎
- D. 急进性肾小球肾炎
- E. 急性间质性肾炎

82.男, 61 岁, 摔倒致左臀部着地 5 小时, 左部疼痛肿胀, 活动障碍, 查体:左下肢外旋 60°, Bryant 较健侧缩短 2cm, 左侧腹股沟区压痛阳性, 左侧大转子叩击痛阳性, 考虑为诊断为下列哪种疾病

- A. 髋关节前脱位
- B. 股骨干骨折
- C. 股骨颈骨折
- D. 股骨转子间骨折
- E. 髋关节后脱位

83.女性, 30 岁, 间断右腹痛 1 周, 加重伴尿频、尿急 1 天。查体: 右肾区叩击痛阳性, 检查:尿 RBC (++) , 右肾积水, 集合系统 1.0cm, 考虑尿路结石, 结石可能在

- A. 肾小管和肾盂交界处
- B. 肾盂输尿管口
- C. 输尿管下段
- D. 肾结石

E.膀胱壁内

84.女, 28岁, 酱油色3天。查体: 无双侧无肾区扣痛, 为明确诊断, 接下来应做的检查是

- A.尿隐血是试验
- B.尿三杯试验
- C.尿沉渣镜检
- D.尿常规
- E.尿胆原

85.患者男, 50岁, 1年来心慌胸闷气短, 近1月来加重, 入院后查体, R120次/分, 心音低钝, 遥远, Ewart征阳性, 超声提示室间隔不同步, 下列最可能的治疗措施是

- A.手术治疗
- B.心包穿刺术
- C.球囊扩张
- D.静脉注射味塞米
- E.静脉注射胺碘酮

86.男, 72岁。糖尿病多年, 一直长期服用阿卡波糖, 长期胰岛素, 瑞格列奈格列本脲, 罗格列酮等药物, 空腹血糖 5.2mmol/L, 餐后两小时 6.5mmol/L, 射血分数 42%, 如果现在要停药的话, 停哪一种药

- A.阿卡波糖
- B.长期胰岛素
- C.瑞格列奈
- D.格列本脲
- E.罗格列酮

87.女性, 62岁, 确诊糖尿病多年, 胰岛素 30R, 早 18单位, 晚 16单位, 餐前半小时给药。晚餐后两小时血糖 6.7mmol/L, 晚上感饥饿, 头晕, 第二天空腹血糖 10.2mmol/L, 为了降低空腹血糖, 应该调整的是

- A.加用二甲双胍
- B.减少晚餐前胰岛素用量
- C.增加早餐前胰岛素用量
- D.减少晚餐量
- E.晚餐后运动

88.男, 61岁, 腰背部疼痛, 夜间疼痛明显, L3-5 椎体及周围间隙叩击痛, 直腿抬高试验及“4”字实验 (+), MRI显示 L3、5 及 S1 间隙有异常, 椎间隙无狭窄。该患者最有可能诊断为

- A.腰椎间盘突出症
- B.腰椎结核
- C.腰椎管狭窄症
- D.腰椎转移瘤
- E.腰椎肿瘤

89.男, 18岁, 因“感冒”后自行服用抗菌药物半小时后突然出汗、面色苍白。查体: 血压

40/20mmHg，神志不清，面色苍白，脉搏细速，四肢冰冷，发绀，该患者首要治疗措施是

- A 多巴胺静滴
- B.肾上腺素肌肉注射
- C.地塞米松静滴
- D.请等待更新
- E.吸氧、心电监护

90.女，40岁，因甲亢药物治疗2年未控制，改用<sup>131</sup>I治疗。<sup>131</sup>I治疗2天后突感高热、心悸，伴恶心呕吐。查体：T40°C呼吸急促，大汗淋漓，P160次/分，律齐。最可能的诊断是

- A 请等待更新
- B.甲状腺危象
- C.感染中毒性休克
- D.神经中枢系统感染
- E.放射性甲状腺炎

91.患者男，2天前因心梗入院，1天前突发喘憋和咳粉红色泡沫痰，不能平卧。在心尖部可闻及3/6收缩期杂音。该患者喘憋是由于

- A 心肌梗死后综合征
- B.乳头肌断裂
- C.肺部感染
- D.肺栓塞
- E.心室膨胀瘤

92.女，近日感乏力、怕冷、面色苍白每年增重2kg，甲状腺2度肿大，触之疼痛。双下肢水肿，血红蛋白58g/L，尿常规：红细胞(0-2)。尿蛋白(1-2)，未见明显管型。应诊断为哪种疾病该患者诊断为

- A.甲状腺功能亢进
- B.甲状腺癌
- C.桥本甲状腺炎
- D.亚急性甲状腺炎
- E.甲状腺功能减退

93.女，27岁，尿频尿急尿痛2天，右肾区叩痛阳性，尿沉渣检查，RBC5-10/hp，WBC50-60/hp，最可能的诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.急性膀胱炎
- D.急性间质性肾炎
- E.急进性肾小球肾炎

94.男，48岁，因急性心梗后入住ICU.出现心率增快，多次发房颤室颤室速后电复律电除颤抢救成功。形成电风暴的原因是

- A 迷走神经兴奋

- B. 交感神经兴奋
- C. 副交感系统激动
- D. 中枢神经系统抑制
- E. 迷走神经系统抑制

95. 某患者，上二层楼即感胸闷，休息后缓解，此患者心功能分级为

- ANYHA 分级:I 级
- B. Killip 分级:I 级
- C. NYHA 分级:II 级
- D. NYHA 分级:III 级
- E. NYHA 分级:IV 级

96. 男，7岁，突发寒战高热，左大腿远端剧痛，左膝关节拒做伸屈活动，查体局部轻度肿胀，皮温高，深压痛，浮髌试验阴性，WBC16，N0.94。早期检查首选

- A. 局部分层穿刺
- B. 血常规
- C. X线
- D. CT
- E. MR

97. 男性，15岁，突发乏力，厌油腻食物，学校30余人有同样症状，无黄疸肝下1cm，压痛。最可能是

- A. 伤寒，副伤寒
- B. 甲型肝炎
- C. 霍乱
- D. 乙型肝炎
- E. 戊型肝炎

98. 女17岁，疲劳无力，心烦易怒怕热多汗，体重下降5kg，月经量减少，经期缩短，查体P100次/分

BP140/70mmHg，手有颤动，甲状腺有弥漫性肿大，无触痛。该患者最可能的诊断是

- A. 糖尿病
- B. 单纯性甲状腺肿
- C. Graves病
- D. 自主神经紊乱
- E. 缺铁性贫血

99. 男，22岁，全身进行性水肿10天，既往体健，查体: BP120/80mmHg，颜面及双下肢重度凹陷性水肿，血浆白蛋白20，血Cr72，血胆固醇8.6，尿蛋白定量4.8，尿沉渣镜检红细胞8-10/HP。下列治疗措施中，错误的是

- A. 利尿治疗
- B. 静脉补充大量白蛋白
- C. 低分子肝素抗凝
- D. 限制盐摄入

E.根据肾活检病理决定下一步治疗措施

100.女性，54岁，心悸气短十年，加重伴大咳血一天，查体:颈静脉怒张，双肺可闻及湿罗音，心率120次每分钟，心律不齐，第一心音亢进可听见开瓣音P<sub>2</sub>亢进，心尖部舒张期隆隆样杂音，双下肢轻度水肿，心电图示心房颤动伴快心室率，胸部x线片示心影呈梨形心。应首选治疗药物是

- A.β受体拮抗剂
- B.利尿剂
- C.普罗帕酮
- D.美西律
- E.西地兰

101.男，58岁，发热2周，查体，体温38°C，周部皮肤针刺处可见瘀斑，胸骨压痛(+)，心肺未见异常，脾肋下未及，血常规:Hb86，WBC12.4，PLT34，骨髓细胞学检查:增生极度活跃，胞质内粗大颗粒的早幼粒细胞占0.75。骨髓检查最可能出现的结果是

- A.MPO 阴性
- B.CD13 阴性
- C.PAS 阳性
- D.CD33 阳性
- E.NSE 阴性

102.男，58岁，发热2周，查体，体温38°C，周部皮肤针刺处可见瘀斑，胸骨压痛(+)，心肺未见异常，脾肋下未及，血常规:Hb86，WBC12.4，PLT34，骨髓细胞学检查:增生极度活跃，胞质内粗大颗粒的早幼粒细胞占0.75。治疗用什么

- A.维甲酸口服
- B.HA 方案化疗
- C.伊马替尼
- D.VLDP 方案化疗
- E.DA 方案化疗

103.男，22岁，2小时前骑自行车不慎摔倒骑跨在车梁上，会阴部肿胀痛，尿道口滴血。查体:生命体征稳定，会阴部肿胀，可见瘀斑。急诊用16号导尿管可插入尿道膀胱，导出清亮液体。最可能的诊断是

- A.尿道球部挫伤
- B.尿道膜部损伤
- C.尿道阴茎部损伤
- D.前列腺损伤
- E.膀胱破裂

104.男，22岁，2小时前骑自行车不慎摔倒骑跨在车梁上，会阴部肿胀痛，尿道口滴血。查体:生命体征稳定，会阴部肿胀，可见瘀斑。急诊用16号导尿管可插入尿道膀胱，导出清亮液体。下一步处理的方法

- A.立即手术
- B.插尿管24小时后手术



- C.插尿管 24 小时，拔，让其自由排尿
- D.插尿管，2~3 周拔出
- E.插尿管 72 小时后拔出，每周扩张尿道一次

105.女，16 岁，心慌、多汗 2 年，体重下降 5kg，大便次数增加，3-4 次/日，不成形，月经 2-3 月一次，量少。查体:P:100 次/分，血压 120/80mmHg，无突眼，甲状腺 I 度肿大。实验室检查:TT3: 8.6nmol/L，TT4: 220nmol/L.TSH 小于 0.002。下列哪项有助于诊断

- A.TAb
- B.TRAb
- C.FT3
- D.TPOAb
- E.Tg

106.女，16 岁，心慌、多汗 2 年，体重下降 5kg，大便次数增加，3-4 次/日，不成形，月经 2-3 月一次，量少。查体:P:100 次/分，血压 120/80mmHg，无突眼，甲状腺 I 度肿大。实验室检查:TT3: 8.6nmol/L，TT4: 220nmol/L.TSH 小于 0.002。该患者所患疾病

- A.桥本氏甲状腺炎
- B.亚急性甲状腺炎
- C.弥漫性毒性甲状腺肿
- D.单纯性甲状腺肿
- E.甲状腺癌

107.63 岁男性，进行性右侧睾丸肿大一年，无疼痛，行走不便。查体: 睾丸 6x5x4cm，无压痛，右侧睾丸及附睾未触及，透光试验阳性，平卧后不变。诊断为

- A.睾丸鞘膜积液
- B.精索鞘膜积液
- C.睾丸肿瘤
- D.腹股沟斜疝
- E.交通性鞘膜积液

108.63 岁男性，进行性右侧睾丸肿大一年，无疼痛，行走不便。查体: 睾丸 6x5x4cm，无压痛，右侧睾丸及附睾未触及，透光试验阳性，平卧后不变。首选的治疗

- A.右侧斜疝修补术
- B.右侧睾丸切除术
- C.右侧鞘膜突高位结扎术
- D.右睾鞘膜睾丸翻转术
- E.穿刺抽液

109.男，40 岁，水肿，少尿 2 周，血压 160/100mmHg，肌酐 300，尿蛋白 2g 镜下血尿 20- 30，镜下红细胞 8 个，呈新月体征，免疫荧光有线型分布，诊断为

- A.急进性肾小球肾炎 I 型
- B.急进性肾小球肾炎 II 型
- C.急进性肾小球肾炎 III 型



- D.肾病综合征
- E.急性肾小球肾炎

110.男, 40 岁, 水肿, 少尿 2 周, 血压 160/100mmHg, 肌 300, 尿蛋白 2g 镜下血尿 20 - 30, 镜下红细胞 8 个, 呈新月体征, 免疫荧光有线型分布, 治疗首选

- A.血浆置换
- B.泼尼松
- C.泼尼松+免疫抑制剂
- D.血液透析
- E.泼尼松+细胞毒药物

111.患者胸闷气短数年, 2 日前开始出现憋喘、咯血, 咳粉红色痰, 心电图示房颤, 心超显示, 左心房内径 56mm, 二尖瓣口面积 0.8cm<sup>2</sup>, 成墙垛样改变, 考虑是何诊断

- A.急性肺栓塞
- B.急性心肌梗死
- C.支气管扩张
- D.扩张型心肌病
- E.感染性心内膜炎

112.患者胸闷气短数年, 2 日前开始出现憋喘、咯血, 咳粉红色痰, 心电图示房颤, 心超显示, 左心房内径 56mm, 尖瓣口面积 8.0cm<sup>2</sup> 平方, 成墙垛样改变下列治疗不正确的是

- A.利尿剂
- B.球囊扩张术
- C.阿司匹林抗血小板
- D.硝酸酯扩冠脉
- E.洋地黄

113.男性, 42 岁。腹胀伴乏力 2 天突发胸痛 5 小时。既往高脂血症病史 2 年, 未治疗。查体: P: 68 次/分 Bp120/78mmhg, 心肺腹未见异常血 cTnT: 0.83mg/fl, D-DIMER: 0.3g/, 心电图 I、avL、Vs-V。导联 ST 段压低 0.2mv。为进一步明确诊断应进行什么检

- A.超声心动图
- B.冠状动脉造影
- C.肺动脉 CTA
- D.主动脉 CTA
- E.心脏核磁共振

114.男性, 42 岁。腹胀伴乏力 2 天突发胸痛 5 小时。既往高脂血症病史 2 年, 未治疗。查体: P: 68 次/分 Bp120/78mmhg, 心肺腹未见异常血 cTnT: 0.83mg/fl, D-DIMER: 0.3g/, 心电图 I、avL、V5-V6 导联 ST 段压低 0.2mv。请问目前考虑什么诊断

- A.主动脉夹层
- B.急性心肌梗死
- C.急性肺动脉梗死
- D.急性心肌炎
- E.急性心包炎

115.女性 20 岁, 口干、多饮, 多尿半月。每日尿量 7-8L。尿常规提示: 血糖: 4.8ml/l, 比重: 1.007。禁水试验后尿量明显减少。测量渗透压, 血浆渗透压 305mosm/L, 尿液渗透压: 200mosm/L。静脉注射去胺加压素后尿量无明显减少。测渗透压: 血浆: 300mosm/L。尿渗透压: 550mosm/L。考虑以下哪种疾病

- A.完全中枢性尿崩症
- B.部分中枢性尿崩症
- C.完全肾性尿崩症
- D.部分肾性尿崩症
- E.神经性烦渴

116.女性 20 岁, 口干、多饮, 多尿半月。每日尿量 7-8L。尿常规提示: 血糖: 4.8ml/l, 比重: 1.007。禁水试验后尿量明显减少。测量渗透压, 血浆渗透压 305mosm/L, 尿液渗透压 200mosm/L。静脉注射去胺加压素后, 尿量明显减少。测渗透压: 血浆 300mosm/L。尿渗透压: 550mosm/L。应首选药物

- A.氯丙嗪
- B.氯磺苯胺
- C.氢氯噻嗪
- D.去氨加压素
- E.卡马西平

117.男, 22 岁, 全身进行性水肿 10 天既往体健。查体: BP:120/80mmhg, 双下肢及颜面部凹陷性水肿。实验室检查: 血浆白蛋白 20;尿蛋白: 4.8, 尿沉渣检测: RBC:8~10;血 Cr: 73;血胆固醇: 8.2。问可能考虑的诊断:

- A.急性肾小球肾炎
- B.肾病综合征
- C.急性间质性肾炎
- D.慢性肾小球肾炎
- E.急进性肾小球肾炎

118.男, 22 岁, 全身进行性水肿 10 天既往体健。查体: BP:120/80mmhg, 双下肢及颜面部凹陷性水肿。实验室检查: 血浆白蛋白 20;尿蛋白: 4.8, 尿沉渣检测: RBC:8~10;血 Cr: 73;血胆固醇: 8.2。不应选用的治疗

- A.限盐
- B.注射大量白蛋白
- C.利尿
- D.活检后治疗
- E.补液

119.适合 Allis 法治疗的是

- A.关节后脱位
- B.膝关节后脱位
- C.肘关节后脱位
- D.烧骨小头半脱位

E.肩关节前脱位

120.适合用 Hippocrates 手法复位的是

- A.关节后脱位
- B.膝关节后脱位
- C.肘关节后脱位
- D.烧骨小头半脱位
- E.肩关节前脱位

121.IgA 确诊选择什么检查

- A.肾活检
- B.肾动脉造影
- C.肾 B 超
- D.肾 ct
- E.肾盂造影

122.鉴别急慢性肾衰竭的检查方法

- A.肾活检
- B.肾动脉造影
- C.肾 B 超
- D.肾 ct
- E.肾盂造影

123.肠切除术后肠痿长期禁食的患者可能出现的凝血因子异常是

- A.凝血因子 VIII 和 IX
- B.凝血因子 II 和 X
- C.凝血因子 III 和 X
- D.凝血因子 I 和 V
- E.凝血因子 IV 和 VII

124.血友病患者缺乏的凝血因子是

- A.凝血因子 VIII 和 IX
- B.凝血因子 II 和 X
- C.凝血因子 III 和 X
- D.凝血因子 III 和 V
- E.凝血因子 IV 和 VII

125.男, 35 岁, 发热头痛 5 天, 于 1 月 5 日就诊, 查体: T38.6° C, 血压 85/45mmgh, 结膜充血, 眼睑水肿腋下可见出血点, WBC17x10<sup>9</sup> /L, Plt55x10<sup>9</sup> /L, 尿蛋白 (+++) , 最可能的传染源是

- A.犬
- B.人
- C.羊
- D.啮齿动物

E.猪

126. 学生，16岁，发热头痛4天，呕吐2天，加重伴意识不清1天，于8月10日就诊。体温 $39.8^{\circ}\text{C}$ ，血压 $140/90\text{mmHg}$ 。浅昏迷，颈反抗+，克氏征及布氏征+，白细胞 $17.5\times 10^9/\text{L}$ ， $\text{N}0.75\times 10^9/\text{L}$ ，脑脊液检查：CSF透明，压力 $200\text{cmH}_2\text{O}$ 有核细胞 $400\times 10^6/\text{L}$ ，多核细胞 $1.5\times 10^6/\text{L}$ ，蛋白 $0.8\text{g}/\text{L}$ ，糖 $3.8\text{mmol}/\text{L}$ ，氯化物 $120\text{mmol}/\text{L}$ 。最可能的传染源是

A

B.人

C.羊

D.啮齿动物

E.猪

127. 味塞米的作用是

A.降低心室前负荷

B.降低心室后负荷

C.降低心室前后负荷

D.降低心肌收缩力

E.增加心排血量

128. 硝普钠的作用是

A.降低心室前负荷

B.降低心室后负荷

C.降低心室前后负荷

D.降低心肌收缩力

E.增加心排血量

129. 女，76岁，扩张型心肌病，持续房颤，慢性心力衰竭，为增加营养一周前开始每天加饮用牛奶 $500\text{ml}$ ，3天前出现下肢水肿及气短，除了限制入量，能够短期控制症状的是

A.味塞米

B.阿司匹林

C.硝酸甘油

D.普蔡洛尔

E.地高辛

130. 女，76岁，扩张型心肌病，持续房颤，给予B受体阻滞剂后血压偏低但心室率仍偏快，应该加用控制心室率的药物是

A.味塞米

B.阿司匹林

C.硝酸甘油

D.普蔡洛尔

E.地高辛

131. 男，37岁，血压升高5年余，平素血压 $160-180/100-120\text{mmHg}$ ，未诊治。体型肥胖，

有打鼾史。半年前开始在医生的指导下进行低脂饮食控制和药物治疗，厄贝沙坦片每次150mg，每日两次，托拉塞米5mg经过三个月的治疗，血压控制在150-160/90-100mmHg，该患者为

- A.高血压急症
- B.高血压亚急症
- C.顽固高血压
- D.高血压危象
- E.恶性高血压

132.男，56岁，血压升高3年，呼吸困难1周，加重1天。患者1周前无明显诱因出现活动时喘憋，1天前出现呼吸困难，端坐呼吸，伴大汗，有高血压家族史。查体：P:100次/分，BP230/150mmHg 双肺可闻及中小水泡音，心率100次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音，双下肢不肿。心电图提示左室肥厚劳损。该患者目前的情况为

- A.高血压急症
- B.高血压亚急症
- C.顽固高血压
- D.高血压危象
- E.恶性高血压

133.患者前列腺特异性抗原阴性，经尿道前列腺切除术后病理活检发现前列腺癌病灶，可能的分期是

- AT1 期
- BT2 期
- C.T3a 期
- D.T3b 期
- E.T4 期

134.前列腺癌根治术后病理报告突破两叶包膜，未侵犯精囊，最可能的分期是

- AT1 期
- BT2 期
- C.T3a 期
- D.T3b 期
- E.T4 期

135-150.请等待更新

- A.请等待更新
- B.请等待更新
- C.请等待更新
- D.请等待更新
- E.请等待更新



### 答案

1~5ACBEE	6~10AADAD	10~15ACBAA	16~20ADDCA
21~25CEDCB	26~30CCEEE	31~35ADBAD	36~40BCBCB
41~45EAACD	46~50EBCCC	51~55EBABA	56~60DDBEC
61~65EAACC	66~70DCCDA	71~75EBCCA	76~80CECAA
81~85ACACB	86~90EBDBB	91~95BDBBD	96~100ABCBE
100~105DAADB	106~110CADAA	110~115EEBBA	
116~120DBEAE	121~125ACBAD	126-130EACAE	
131~134CAAC			





