

## 口腔解剖学---牙体之乳牙试卷

1.下列哪项乳牙的外形特征是错误的（ C ）.

- A.乳牙体积小，呈乳白色
- B.乳牙颈嵴突出，冠根分明
- C.第一乳磨牙体积最大，第二乳磨牙次之
- D.乳磨牙根短，分叉大
- E.上颌乳尖牙的牙尖偏向远中

2.下列对乳牙的论述中哪项是错误的（ A ）.

- A.乳牙患龋率低
- B.完整的乳牙列有助于儿童的消化吸收
- C.健康的乳牙能刺激颌骨的正常发育
- D.乳牙缺失是造成牙合畸形的原因之一
- E.位置正常而健康的乳牙可引导恒牙的正常萌出

3.以下乳牙萌出先后顺序哪个是正确的（ C ）.

- A. I II V IV III
- B. I II III V IV
- C. I II IV III V
- D. V I II III IV
- E. I II V III IV

4.牙冠形态不同于任何恒牙的乳牙是（ C ）.

- A.上颌第一乳磨牙
- B.上颌第二乳磨牙

C.下颌第一乳磨牙

D.下颌第二乳磨牙

E.上下颌第一乳磨牙

5.区别左右上颌乳尖牙与恒尖牙最主要的标志是（ C ）。

A.乳牙体积小，颜色白

B.乳牙冠宽根窄

C.乳尖牙近中斜缘短于远中斜缘，牙尖偏远中

D.乳牙颈嵴最突

E.乳牙根尖偏远中并弯向唇侧

6.乳牙牙髓治疗效果好，其原因是（ E ）。

A.乳牙髓腔大

B.髓角高

C.根尖孔大

D.根管粗

E.以上均是

7.下列关于乳磨牙髓腔的描述错误的是（ A ）。

A.乳磨牙髓室颊舌径大于近远中径

B.乳磨牙通常有三个根管

C.上颌乳磨牙根管分为颊侧近、远中根管和舌侧根管

D.下颌乳磨牙根管分为近中颊、舌侧根管和远中根管

E.下颌第二乳磨牙有时出现 4 个根管

- 8.乳前牙特点描述正确的是（ E ）。
- A.乳前牙牙冠短小、色白
  - B.冠根分明，宽冠窄根
  - C.上颌乳尖牙牙尖偏向远中
  - D.下颌乳切牙与乳磨牙宽度的差距较下颌恒切牙与恒磨牙宽度的差距小
  - E.以上都正确
- 9.关于第二乳磨牙外形特点描述哪项是错误的（ C ）。
- A.牙冠短小、色白
  - B.牙冠明显缩小，颈嵴较突，牙冠由颈部向牙合缩小
  - C.下颌第二乳磨牙的近中颊尖大于远中颊尖和远中尖
  - D.牙根干短，牙根向外张开
  - E.与同颌的第一恒磨牙近似
- 10.正常生理条件下，乳牙在口腔内存在时间最长者可达（ C ）。
- A.6 年左右
  - B.8 年左右
  - C.10 年左右
  - D.12 年左右
  - E.14 年左右
- 11.对上颌乳中切牙外形的描述哪个不正确（ A ）。
- A.唇面呈梯形，切颈径大于近远中径
  - B.近中切角似直角

C.宽冠宽根

D.根长约为冠长的 2 倍

E.根尖 1 / 3 弯向唇侧，偏远中

12.符合下颌第一乳磨牙特点的是（ C ）。

A.（牙合）面似以近中缘为底的三角形

B.颊面远中缘长于近中缘

C.近中颊颈嵴特别突出

D.颊面似以远中缘为底的三角形

E.牙根细长，分叉度小

13.与下颌第一乳磨牙相似的恒牙是（ E ）。

A.下颌第一恒磨牙

B.下颌第二恒磨牙

C.下颌第一双尖牙

D.下颌第二双尖牙

E.没有恒牙与其相似

14.下述第二乳磨牙形态特点哪个不正确（ D ）。

A.第二乳磨牙的牙冠较小、色白

B.第二乳磨牙的牙冠颈部明显缩小，颈嵴较突

C.第二乳磨牙的牙冠由颈部向合方缩小

D.第二乳磨牙近中颊尖、远中颊尖、远中尖大小不相等

E.第二乳磨牙的根干短、牙根向外张开

15.下述乳前牙形态特点哪个不正确（ D ）。

- A.乳前牙色灰白，牙冠短小
- B.乳前牙冠宽根窄
- C.上颌乳尖牙尖顶偏远中
- D.下颌乳切牙舌面边缘嵴较恒切牙平坦
- E.从邻面看其唇舌侧颈嵴都较恒牙显著

16.乳牙中最早脱落的是（ B ）。

- A.上颌乳中切牙
- B.下颌乳中切牙
- C.上颌乳侧切牙
- D.下颌乳侧切牙
- E.下颌乳尖牙

17.一个 1 岁半男婴，口内检查发现，上下颌乳中切牙和乳侧切牙均已萌出，按照一般乳牙萌出顺序在其口内萌出的下一颗牙为（ D ）。

- A.上颌乳尖牙
- B.下颌乳尖牙
- C.上颌第一乳磨牙
- D.下颌第一乳磨牙
- E.下颌第二乳磨牙

18.不具备宽冠窄根为特点的乳牙是（ A ）。

- A.上颌乳中切牙
- B.上颌乳侧切牙
- C.下颌乳侧切牙

D. 上颌乳尖牙

E. 下颌乳尖牙

19. 第二乳磨牙与第一恒磨牙的区别要点中哪一点是错误的 ( C ) .

A. 第二乳磨牙的牙冠较小、色白

B. 第二乳磨牙的牙冠颈部明显缩小，颈嵴较突

C. 第二乳磨牙的牙冠面尖窝清晰

D. 第二乳磨牙的近中颊尖、远中颊尖、远中尖大小约相等

E. 第二乳磨牙的牙根干短，牙根向外张开

20. 乳牙在口内存留最短时间 ( C ) .

A. 6 个月

B. 2~3 年

C. 5~6 年

D. 10 年

E. 1 个月

21. 一个 7 岁的女孩，口内检查发现下颌后部牙槽骨上有两个形态似磨牙的牙齿存在，为鉴别是否有恒磨牙，下列哪种说法是正确的 ( C ) .

A. 恒牙的牙颈嵴突出，与牙根分界清楚

B. 恒牙牙冠颜色偏白

C. 下颌第二乳磨牙的近中颊尖，远中颊尖及远中尖的大小基本相等

D. 下颌第一恒磨牙的外形呈斜方形

E. 以上都不是

22. 一个 9 岁男孩，经口内检查发现上颌右侧区有恒中切牙，乳尖牙，第一乳磨牙，第二乳磨牙及第一恒磨牙，这个部位的这些牙齿可用临床牙位记录法(部位记录法)记录为 ( A ) .

A. 右上 6 V IV III 1

B. 左上 1 III IV V 6

C. 右上 65431

D. 左上 13456

E. 以上都不是

23. 10 岁，男童。下颌某牙体的特点是：颊面近似为一以近中缘为底的三角形；两颊尖之间有颊沟；颊颈嵴近中部分最突出，呈明显的结节状；近中面近似一以颈缘为底的三角形；咬合面近似为一以远中缘为底的三角形。该牙是 ( D ) .

A. 下颌第一磨牙

B. 下颌第二磨牙

C. 下颌第三磨牙

D. 下颌第一乳磨牙

E. 下颌第二乳磨牙