

- B.慢性阻塞性腮腺炎
- C.慢性复发性腮腺炎
- D.流行性腮腺炎
- E.腮腺良性肥大

138.应用下列哪项检查,可发现颞下颌关节紊乱病的一些早期改变,如关节盘糜烂、滑膜充血、关节腔内絮状物等

- A.X线平片
- B.关节造影
- C.颞下颌关节内镜
- D.CT
- E.MRI

139.下列有关急性化脓性腮腺炎说法错误的是

- A.常发生在儿童
- B.可发生于腹部大手术后
- C.可在慢性炎症基础上急性发作
- D.需全身支持治疗
- E.脓肿形成时应切开引流

140.女,25岁。右颌下区无痛性肿块发现10余年。肿块生长缓慢,压缩感(+),体位移动试验(+),触诊质软。该患者最可能的诊断是

- A.淋巴管瘤
- B.舌下腺囊肿口外型
- C.下颌下腺囊肿
- D.海绵状血管瘤
- E.皮样囊肿

141.男,38岁。右下颌角部无痛性肿大3年,结合X线检查,明确诊断为右下颌骨成釉细胞瘤。符合传统治疗原则的是

- A.成釉细胞瘤刮除术
- B.肿瘤外0.5 cm处切除
- C.肿瘤外1.0 cm处切除
- D.肿瘤外1.5 cm处切除
- E.肿瘤外2.0 cm处切除

142.涎石病最好发于

- A.腮腺

- B.唇腺
- C.下颌下腺
- D.舌下腺
- E.腮腺

143.男,40岁。左腮腺区切割伤,创口已缝合3周,但仍未愈,有较大量清亮液体流出,进食时明显。该患者发生了

- A.感染
- B.涎瘘
- C.血清肿
- D.腮腺囊肿破裂
- E.味觉出汗综合征

144.男,25岁。双侧腮腺区肿痛不适3年,时大时小。腮腺造影片显示主导管扩张、变形似腊肠状,末梢导管不规则扩张,可能的诊断是

- A.腮腺结核
- B.腮腺恶性肿瘤
- C.腮腺良性肥大
- D.慢性阻塞性腮腺炎
- E.舍格伦综合征

145.纤维化慢性下颌下腺炎的治疗方法

- A.硬化剂治疗
- B.导管结扎术
- C.药物治疗
- D.摘除涎石
- E.下颌下腺摘除

146.新生儿颌骨骨髓炎的感染来源多为

- A.腺源性
- B.血源性
- C.损伤性
- D.牙源性
- E.医源性

147.女,32岁。因患左舌下腺囊肿于门诊行左舌下腺及囊肿摘除术,术后第二天左下颌下区发生肿胀,且进食时明显。最可能的原因是

A.因左舌下腺囊肿口外型,口外部分未处理所致

B.因左下颌下腺导管结石所致

C.因前日术中误扎左下颌下腺导管所致

D.左下颌下淋巴结反应性肿胀

E.因急性左下颌下腺炎症所致

148.男,45岁。右耳垂下肿物5年,生长缓慢、无痛。检查肿物以耳垂为中心,界限清楚,活动,呈椭圆形,表面呈结节状,硬度中等。最可能的临床诊断是右侧腮腺

A.多形性腺瘤

B.沃辛瘤

C.血管瘤

D.黏液表皮样癌

E.淋巴结炎

149.女,50岁。左侧腮腺区反复肿胀3年,平时有胀感,口内有咸味。检查患者侧腮腺导管口时,较符合慢性阻塞性腮腺炎体征的是

A.清亮唾液

B.无唾液分泌

C.导管口无红肿

D.棕色唾液

E.雪花样唾液

150.患者,女,29岁。一侧颌下区膨隆2个月,以"囊肿"手术切除。术后半个月,术区又复肿起。检查见颌下区隆起,表面皮肤正常,膨隆区界限尚清,按压有囊性感。该患者必须做的检查是

A.穿刺

B.下颌下腺造影

C.手术探查

D.CT

E.MRI

151.关于腮腺多形性腺瘤手术的叙述中,错误的是

A.单纯肿瘤摘除术(剜除术)

B.将肿瘤连同周围腮腺组织一并切除术

C.肿瘤在浅叶时,将肿瘤和腮腺浅叶一并切除术

D.肿瘤在深叶时,将肿瘤连同全腮腺切除术

E.各种术式均要保留面神经

152.早期容易发生肺部转移的口腔颌面部肿瘤是

A.口底癌

B.舌癌

C.黏液表皮样癌

D.颊癌

E.腺样囊性癌

153.关于腮腺区低分化黏液表皮样癌的治疗,错误的是

A.面神经保留不能勉强

B.一般不做颈淋巴清扫术

C.术后辅助放疗

D.疑有血行转移可辅以化疗

E.涉及下颌骨时,应行下颌骨部分切除

154.对于腮腺区肿物不宜进行检查的是

A.细针吸取细胞学检查

B.CT或MRI

C.涎腺造影

D.切取活检术

E.B超

155.关于腮腺浅叶肿瘤手术切除,不正确的是

A.术前美蓝导管注入

B.可行区域切除术

C.需行面神经解剖术

D.可行浅叶切除术

E.需行腮腺全叶切除术

156.患儿,男,11岁。双侧腮腺反复肿胀4年,每年肿胀4~5次,每次持续1周,无口干、眼干症状,腮腺造影有点球状扩张,合适的处理为

A.理疗

B.多喝水,按摩腺体,保持口腔卫生,必

要时抗感染治疗

- C. 应行双腮腺手术切除
- D. 腮腺内注入甲紫致腺体萎缩
- E. 主导管结扎治疗

157. 急性化脓性腮腺炎的主要致病菌是

- A. 链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 肺炎双球菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 白色念珠菌

158. 牙源性角化囊肿易复发, 下列因素中与复发无关的因素是

- A. 囊壁薄
- B. 可能存在多发病灶
- C. 同一病灶内有多个囊肿
- D. 可能存在子囊
- E. 囊肿内有角化物

159. 患者, 男, 10 岁。近 5 年来左侧腮腺反复肿胀, 间隔 1~2 个月发作一次。有助于明确诊断的检查是

- A. CT 检查
- B. B 超检查
- C. 涎腺造影
- D. 放射性核素扫描
- E. 唇腺活检

160. Schinner 试验滤纸夹持时间是

- A. 1 分钟
- B. 2 分钟
- C. 3 分钟
- D. 4 分钟
- E. 5 分钟

161. 患者, 女, 35 岁。左下颌下腺炎长期反复发作, 双合诊左口底区可触及一硬结, 为明确是否有结石, 最正确的检查是

- A. 拍牙片
- B. B 超检查
- C. CT 检查
- D. MRI 检查

E. 拍下颌咬合片

162. 慢性阻塞性腮腺炎最常见的病因是

- A. 导管较长导致的唾液滞留
- B. 导管口黏膜损伤致导管口狭窄
- C. 导管异物
- D. 导管结石
- E. 增龄性改变, 导致唾液黏滞

163. 干槽症的特征性表现是

- A. 开口受限
- B. 冷热痛
- C. 术后 1 天放射性疼痛
- D. 术后 3~5 天肿痛开始消退
- E. 拔牙创内无血凝块

164. 患者, 男, 43 岁。近几年来左侧腮腺数次肿痛, 每年发作 1~2 次, 抗感染治疗可控制。平常口内有时有咸味液体流出。检查腮腺导管口有少量分泌, 尚清, 该患者不宜实行的治疗是

- A. 导管冲洗
- B. 急性发作时全身抗感染治疗
- C. 维生素 C 含服
- D. 按摩腮腺腺体帮助排唾
- E. 腮腺切除术

165. 玫瑰红染色试验用于

- A. 口腔癌
- B. 牙石检查
- C. 慢性腮腺炎
- D. 舍格伦综合征
- E. 口腔癌前病变

166. 急性化脓性腮腺炎的主要感染途径是

- A. 腮腺导管逆行感染
- B. 口内破损黏膜
- C. 牙源性途径
- D. 血源性途径
- E. 淋巴途径

167. 舍格伦综合征常合并肿大的腺体是

- A. 下颌下腺

- B.舌下腺
- C.腮腺
- D.泪腺
- E.唇腺

168.涎石病的临床特点是

- A.以 20~40 岁中青年多见
- B.病程长短不一
- C.进食时腺体肿胀并伴有疼痛
- D.导管口溢脓
- E.以上特点均对

169.患者,女,55 岁。右腮腺区肿块,缓慢生长,有时较硬,有时较软。检查肿块边界不很清楚,表面皮肤较对侧粗糙。该患者在询问病史时,必须问到的

- A.肿块是否疼痛
- B.服药是否有效
- C.皮肤是否瘙痒
- D.与进食是否有关
- E.与感冒是否有关



配套名师精讲课程

170.关节盘后区损伤的临床特征不包括

- A.关节区咀嚼痛
- B.可有自发痛
- C.开口中度受限
- D.开口型偏向患侧
- E.髁突后方明显压痛

171.关于腮腺良性肿瘤的诊断和治疗,哪项是错误的

- A.术中可行冰冻活组织检查
- B.可作穿刺细胞学检查
- C.术前行活组织检查以明确诊断
- D.最好不作简单的、顺包膜剥离的剝出术
- E.术中应保留面神经

172.关于颞下颌关节紊乱病特点的叙述错误的是

- A.病期较长
- B.关节内微小创伤是主要致病因素
- C.经常反复发作
- D.有自限性

E.长期不愈,可能发生关节强直

173.髁突、关节盘相对移位时,其弹性物质是

- A.开口初或闭口末单声弹响
- B.开口末或闭口初单声弹响
- C.连续摩擦音
- D.多声破碎音
- E.爆裂音

174.颞下颌关节的功能区是

- A.关节结节前斜面和髁突前斜面
- B.关节结节后斜面和髁突后斜面
- C.关节结节后斜面和髁突前斜面
- D.关节结节前斜面和髁突后斜面
- E.关节窝底和髁突顶

175.颞下颌关节混合性强直是指

- A.关节内同时存在骨性与纤维性强直
- B.双侧同时发生关节强直
- C.双侧同时发生关节强直,一侧为骨性,另一侧为纤维性
- D.关节内外同时存在强直
- E.双侧先后发生关节强直

- D.关节内外同时存在强直
- E.双侧先后发生关节强直

176.颞下颌关节脱位,口内法复位的用力方向是

- A.向上、前
- B.向前、上、后
- C.向下、后
- D.向上、后
- E.向下、前

177.属于颞下颌关节紊乱病不可逆性保守治疗的是

- A.药物治疗
- B.物理治疗
- C.封闭治疗
- D.咬合导板治疗
- E.正畸治疗

178.女,27 岁。左颞下颌关节弹响半年。弹响发生于开口初和闭口末期,左侧髁突后区及乙状切迹中点压痛。关节许勒位见左髁

突向后移位。该病人的诊断是

- A. 左侧可复性盘前移位
- B. 左侧不可复性盘前移位
- C. 左翼外肌痉挛
- D. 左关节盘后区损伤
- E. 左翼外肌亢进

179. 女, 20 岁。近半年来出现右侧颞下颌关节弹响(开口末、闭口初), 开口度 5.0 cm, 关节造影见关节囊扩张。最可能的诊断是

- A. 翼外肌功能亢进
- B. 关节囊扩张伴关节盘附着松弛
- C. 髁突、关节盘相对移位
- D. 关节盘破裂
- E. 髁突吸收破坏

180. 以下关于舌癌的叙述错误的是

- A. 以鳞癌多见
- B. 多发生于舌缘, 恶性度高
- C. 常发生早期颈部淋巴结转移
- D. 如有继发感染, 可发生剧烈疼痛
- E. 远处转移多转移至肝脏

181. 颞下颌关节紊乱病的主要致病因素是

- A. 免疫因素
- B. 关节内微小创伤与精神心理因素
- C. 两侧关节发育不对称和关节囊薄弱
- D. 夜磨牙和偏侧咀嚼
- E. 不良充填体和修复体

182. 女, 26 岁。右颞下颌关节周围肌肉疼痛 1 周, 张口受限, 关节无弹响。检查: 张口度 15 mm, 开口型偏右。右侧颞弓下方明显压痛。X 线检查未见异常。该病例的诊断是

- A. 右翼外肌功能亢进
- B. 右翼外肌痉挛
- C. 右关节盘后区损伤
- D. 右关节盘可复性前移位
- E. 右髁突骨质破坏

183. 男, 29 岁。左颞下颌关节咀嚼痛一年余。关节区压痛明显, 关节运动时出现摩擦音, 张口绞锁。X 线检查: 左髁突结构破坏。曾行理疗、封闭及调整咬合治疗, 但效果不佳。正确的处理方法是

- A. 心理治疗
- B. 自我治疗
- C. 药物治疗
- D. 外科介入治疗
- E. 暂时观察

184. 预防颞下颌关节紊乱病的措施中, 错误的是

- A. 保持乐观情绪
- B. 注意关节保护
- C. 纠正不良咀嚼习惯
- D. 多食质硬食物
- E. 避免长时间大张口

185. 应与颞下颌关节紊乱病鉴别的疾病中不包括

- A. 肿瘤
- B. 颞下颌关节急性化脓性关节炎
- C. 瘰病性开口受限
- D. 舍格伦综合征
- E. 创伤性关节炎

186. 颞下颌关节急性脱位, 如不及时复位, 形成陈旧性脱位的时间是

- A. 5 周
- B. 4 周
- C. 3 周
- D. 2 周
- E. 1 周

187. 患者, 男, 50 岁。行断根拔除术, 术中断根突然消失。此时首先应做的是

- A. 冲水吸根
- B. 开窗取根
- C. 拍 X 线片
- D. 服抗生素
- E. 扩大牙槽窝掏根

188. 颞下颌关节**双侧急性前脱位**所特有的症状和体征是

- A. 呈开口状不能闭口
- B. 言语不清
- C. 流涎
- D. 耳屏前触诊有凹陷
- E. 咀嚼及吞咽困难

189. 颞下颌关节急性前脱位时,**髁突的位置在关节节的**

- A. 前上方
- B. 前下方
- C. 前方
- D. 后方
- E. 下方

190. 颞下颌关节检查**不包括**

- A. 关节动度检查
- B. 咀嚼肌检查
- C. 下颌运动检查
- D. 咬合关系检查
- E. 分泌功能检查

191. 颞下颌关节内**强直最常见**的原因是

- A. 颞下颌关节炎紊乱病
- B. 关节损伤
- C. 类风湿关节炎
- D. 面部烧伤
- E. 颞下窝肿瘤放射治疗后

192. 关于**关节盘结构**的描述,**正确的是**

- A. 后带无滑膜层覆盖
- B. 双板区、中间带是穿孔好发部位
- C. 前带是关节负重区
- D. 双板区上层止于髁状突后斜面
- E. 双板区下层止于髁状突前斜面

193. **严重髁面磨损**引起颞颌关节炎紊乱病的主要原因是

- A. 颌间垂直距离过短,引起关节损伤
- B. 边缘嵴和发育沟缺损,导致髁面外形不完整
- C. 不均匀磨损遗留高陡牙尖,造成咬合

创伤

- D. 牙本质过敏,造成矜力不足,损害关节
- E. 长期的咀嚼使矜力应力集中,损害关节

194. **不可复性关节盘前移位**的临床特点是

- A. 往返弹响
- B. 关节运动时连续摩擦音
- C. 开口时下颌偏向健侧,有被动开口
- D. 重度开口受限,开口度5~15 mm
- E. 开口时下颌偏向患侧,无被动开口

195. 患者发生了**单侧颞下颌关节的真性强直**,其面部不对称表现的一般规律应是

- A. 健侧下颌骨较长,面部外观丰满
- B. 健侧下颌骨较长,但患侧面部外观丰满

- C. 颞点偏向患侧,健侧外观丰满
- D. 颞点偏向健侧,健侧外观丰满
- E. 患侧面部丰满,下颌骨较长

196. 患儿,男,7岁。渐进性开口受限2年。检查:**右面部丰满,开口度10 mm,开口型右偏,右髁突无滑动**。最可能的诊断是

- A. 右喙突肥大
- B. 左关节外强直
- C. 右关节内强直
- D. 左髁突良性肥大
- E. 右关节盘不可复性前移位

197. 患者,男,30岁。右颞下颌关节无病理性弹响3个月,检查:**开口度50 mm,两侧关节开口末弹响,关节区无压痛**。首选的治疗方法是

- A. 强的松龙翼内肌封闭
- B. 1%利多卡因咬肌封闭
- C. 2%普鲁卡因关节腔封闭
- D. 1%普鲁卡因翼外肌封闭
- E. 2%鱼肝油酸钠关节囊封闭

198. 治疗**颞下颌关节强直**引起的开口困难可选用

- A. 局部封闭
- B. 开口练习
- C. 理疗
- D. 关节镜手术
- E. 外科手术

199. 关于不可复性关节盘前移位临床特征的描述, 错误的是

- A. 关节弹响史, 继而间断性关节绞痛史
- B. 弹响消失而张口受限
- C. 开口时下颌偏向健侧
- D. 被动张口检查时开口度不能增大
- E. 开口时髁突运动受限

200. 为防止复发, 关节内强直的患者术后开口练习的时间为

- A. 术后 5~7 天
- B. 术后 7~10 天
- C. 术后 10~12 天
- D. 术后 12~15 天
- E. 术后 15 天以后

201. 面瘫的贝尔征是指

- A. 用力紧闭眼睑, 则眼球转向外上方
- B. 患侧口角下垂, 健侧向上歪斜
- C. 不能鼓腮、吹气
- D. 睑裂过大, 闭合不全
- E. 下结膜囊内常有泪液积滞

202. 患者, 男, 57 岁。拟诊为右侧三叉神经痛。对鉴别原发、继发三叉神经痛最有意义的检查结果是

- A. 角膜反射的变化
- B. 痛觉障碍
- C. 温觉障碍
- D. 触觉障碍
- E. 咀嚼肌力减弱

203. 患者, 女, 45 岁。突发左眼睑闭合不全口角左偏, 考虑为面瘫, 需鉴别属贝尔面瘫, 还是中枢性面瘫。两者主要的鉴别点在于

- A. 患侧口角下垂, 健侧向上歪斜

- B. 患侧眼睑闭合不全
- C. 不能鼓气, 鼓气时漏气
- D. 患侧鼻唇沟消失
- E. 患侧额纹消失, 不能皱眉

204. 典型的三叉神经痛不包括

- A. 阵发性剧痛
- B. 扳机点
- C. 痛性抽搐
- D. 夜间发作多见
- E. 病程可呈周期性发作

205. 患者, 男, 60 岁。上前牙区屡发针刺样短暂疼痛 3 周, 定位不清, 临床考虑三叉神经痛, 为提高治疗的针对性, 寻找“扳机点”部位。下列不属于三叉神经上颌支常见扳机点部位的是

- A. 上颌结节
- B. 鼻翼区
- C. 眶下区
- D. 耳屏
- E. 上唇

206. 三叉神经第三支属于

- A. 运动神经
- B. 交感神经
- C. 感觉神经
- D. 混合神经
- E. 分泌神经

207. 关于原发性三叉神经痛, 下列哪项是错误的

- A. 多为单侧发病
- B. 可有“扳机点”存在
- C. 疼痛呈阵发性、刀割样剧痛
- D. 神经系统检查往往有阳性体征
- E. 疼痛分布于三叉神经区域内

208. 三叉神经功能检查项目中不包括

- A. 三叉神经分布区皮肤与黏膜的触、温、痛觉
- B. 角膜反射
- C. 腭反射

- D.施墨(Schirmer)试验
E.咀嚼肌运动功能检查

209.有关治疗三叉神经痛的药物封闭疗法,错误的是

- A.适用于疼痛重的患者
B.适用于口服药物无效者
C.是短期治疗方法
D.封闭疗法的药物的浓度要高于阻滞麻醉

- E.注射时应注意无菌操作

210.患者,男性,44岁。夜间睡眠着凉后,晨起时发现左半侧口角歪斜,眼睑不能闭合,半侧不能皱眉,额纹消失。其可能的诊断为

- A.三叉神经痛
B.舌咽神经痛
C.贝尔麻痹
D.茎突过长综合征
E.蝶腭神经痛

211.患儿,女,9个月。右侧上唇Ⅲ度唇裂,其临床表现应该是

- A.裂隙只限于红唇部
B.裂隙由红唇至部分白唇,未至鼻底
C.整个上唇至鼻底完全裂开
D.皮肤和黏膜完好,下方肌层未联合
E.裂隙只限于白唇,红唇完好

212.患儿,男,2岁。双侧完全性腭裂,其临床表现不包括

- A.常与双侧唇裂同时发生
B.前颌部分向两侧裂开
C.双侧牙槽嵴裂
D.前颌骨孤立于中央
E.腭垂缺失

213. I度腭裂是指

- A.腭垂裂
B.软腭裂开
C.硬腭裂开
D.软硬腭裂开

- E.包括牙槽突的全腭裂开

214.主张腭裂早期手术的时间一般是患儿在

- A.出生时
B.出生后3~6个月
C.出生后7~9个月
D.出生后12~18个月
E.2~3岁

215.不符合隐性唇裂表现的是

- A.唇峰分离
B.黏膜亦出现裂隙
C.皮肤完好无裂开
D.裂侧皮肤浅沟状凹陷
E.皮肤下方的肌层未能联合

216.患儿,女,6个月。出生后即发现双侧上唇裂开。诊断为"先天性双侧唇裂,混合型"。其临床表现应该是双侧唇裂

- A.合并双侧腭裂
B.合并单侧腭裂
C.合并其他面裂
D.合并双侧牙槽突裂
E.一侧完全,一侧不完全唇裂

217.腭裂术后穿孔最主要的原因是

- A.感染
B.张力过大
C.出血
D.患儿哭闹
E.饮食

218.患儿,男,6个月。因先天性单侧完全性唇裂行直线法修复术。术后拆线时间为

- A.术后5~7天
B.术后3天
C.术后7~9天
D.术后10天
E.术后14天

219.一侧上唇裂是由于

- A.上颌突未能与球状突融合
B.两球状突未能正常融合

- C.上颌突与下颌突未能融合
D.上颌突与侧鼻突未能融合
E.球状突与下颌突未能融合
- 220.患儿,男性,1岁。先天性双侧完全性唇裂、双侧完全性腭裂,现拟行唇裂修复术。目前常用的方法是
- A.前唇加长法修复术
B.前唇原长法修复术
C.下唇阿贝瓣修复术
D.双侧鼻唇沟瓣修复术
E.上唇直线缝合法
- 221.患儿,男性,4岁。先天性左侧唇腭裂修复术后遗留左上牙槽嵴裂。如要行牙槽嵴植骨术,最佳的手术年龄是
- A.4~6岁
B.9~12岁
C.7岁
D.16岁
E.出生后任何年龄
- 222.牙颌面畸形的临床分类中,不包括
- A.颌骨发育过度
B.颌骨发育不足
C.长面畸形
D.不对称畸形
E.后天性畸形
- 223.手术后应加压包扎的是
- A.游离皮瓣移植术
B.中厚皮片移植术
C.皮管形成术后
D.旋转推进皮瓣术后
E.隧道式皮瓣转移术
- 224.在有感染的肉芽创面上植皮,宜选用
- A.表层皮片
B.薄中厚皮片
C.厚中厚皮片
D.全厚皮片
E.保存真皮下血管网全厚皮片
- 225.对偶三角瓣主要适用于
- A.整复邻近组织缺损
B.松解条索状瘢痕挛缩
C.覆盖感染创面
D.毛发移植
E.器官再造
- 226.皮肤创口缝合后过度外翻是因为
- A.进针点距创缘过远
B.两侧进针深度不一致
C.皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距
D.皮肤切口两侧进针间距小于皮下间距
E.打结过紧
- 227.表层皮片的厚度,在成年人为
- A.0.1~0.15 mm
B.0.2~0.25 mm
C.0.35~0.62 mm
D.0.75~0.80 mm
E.1.0~1.2 mm
- 228.下面哪个说法是错误的
- A.皮瓣移植抗感染力强,愈合快
B.皮瓣包括皮下脂肪层,可用于凹陷缺损畸形整复
C.皮瓣不适合于移植在肌腱、关节面、骨面等暴露的创面上
D.皮瓣移植后收缩性小
E.皮瓣可对重要血管、脑膜等起保护作用
- 229.通常颌面部随意皮瓣的长宽比例为
- A.1:1
B.1.5:1
C.(2~3):1
D.(4~5):1
E.6:1
- 230.牙槽嵴裂植骨术的时机主要是依据
- A.单侧还是双侧
B.裂隙宽度大小
C.患者发育情况
D.正畸治疗基本完成
E.手术侧恒尖牙未萌,牙根形成2/3

231.患者,女,34岁。右侧眉因外伤缺失,拟采用**皮肤移植方法行眉再造手术**。应选用的是

- A.表层皮片
- B.薄中厚皮片
- C.厚中厚皮片
- D.全厚皮片
- E.轴型皮瓣

232.拔除**下颌第一磨牙**应采用的**阻滞麻醉**方法是

- A.下牙槽神经
- B.下牙槽神经、舌神经
- C.下牙槽神经、颊神经
- D.下牙槽神经、舌神经、额神经
- E.下牙槽神经、舌神经、颊神经

233.哪一类物品不适用干热灭菌法

- A.棉织品和橡胶制品
- B.明胶海绵和各种粉制品
- C.凡士林和油脂
- D.玻璃和陶瓷
- E.液体石蜡

234.穿刺检查最适用于

- A.深部实体包块的诊断
- B.深部囊性包块的诊断
- C.表面实体包块的诊断
- D.表面新生物的诊断
- E.浆液期炎症的诊断和鉴别诊断

235.关于手术区的术前准备,哪种说法是不正确的

- A.患者在术前应行理发、沐浴和备皮
- B.与口腔相通的大手术,特别是需植骨、植皮者,应作洁治、充填等

C.术前应使用1:5 000高锰酸钾或1:1 000氯己定液含漱

D.取皮和取骨区应在术前1日彻底清洁备皮,以酒精消毒后用无菌敷料包扎

E.若具有强有效的消毒条件或整容手术时可免去剃发

236.核素诊断颌骨恶性肿瘤主要用

- A.99 锝
- B.131 碘
- C.32 磷
- D.35 锶
- E.67 镓

237.一般脓肿切开引流不用

- A.橡皮片引流
- B.盐水纱条引流
- C.乳胶管引流
- D.负压引流
- E.碘仿纱条引流

238.纵式或横式外翻缝合的选择根据是

- A.术者的习惯
- B.创缘血供方向
- C.创口区域皮纹方向
- D.创口内翻倾向的严重程度
- E.创口周围是否存在重要的解剖结构

239.手术病人术前12 h禁食,4 h禁水是为了

- A.减少术后感染
- B.防止术后腹胀
- C.防止吻合口瘘
- D.防止术后伤口裂开
- E.防止麻醉或手术中呕吐

240.手术中遇大面积静脉渗血时宜用

- A.荷包式缝合止血
- B.缝扎止血
- C.温热盐水纱布压迫止血
- D.邻近组织覆盖压迫止血
- E.电凝止血

241.中医指的“粉瘤”和“发瘤”分别是

- A.皮脂腺囊肿和皮样囊肿
- B.皮脂腺囊肿和表皮样囊肿
- C.表皮样囊肿和皮样囊肿结构
- D.皮脂腺囊肿和甲状舌管囊肿
- E.皮样囊肿和甲状舌管囊肿

242.牙种植手术的禁忌证包括