

- A. 颌骨肿瘤
- B. 严重习惯性磨牙症
- C. 精神病患者
- D. 糖尿病
- E. 以上都是

243. 关于下颌升支边缘性骨髓炎 X 线表现下哪项是错误的

- A. 病灶区大量死骨形成
- B. 升支部位弥漫性密度增高
- C. 病灶区可见局限性骨质破坏灶
- D. 骨质增生为主
- E. CT 横断面图像可显示骨膜下成骨

244. 口腔颌面部感染途径不包括

- A. 损伤性感染
- B. 药物性感染
- C. 腺源性感染
- D. 医源性感染
- E. 牙源性感染

245. 某患者因左下第一磨牙急性根尖脓肿造成左下颌骨急性中央性骨髓炎, 疼痛剧烈, 左侧前磨牙及磨牙松动, 牙龈红肿, 龈袋溢脓, 以下治疗措施中, 不正确的是

- A. 给予足量、有效的抗生素
- B. 局部超短波理疗
- C. 拔除左下第一磨牙, 其余松动牙尽量保留
- D. 若引流不畅, 可考虑凿去部分骨外板
- E. 形成骨膜下脓肿时应尽早切开引流

246. 患者男性, 28 岁。右颈部淋巴结结核, 下列哪种药物对治疗无效

- A. 青霉素
- B. 链霉素
- C. 异烟肼
- D. 利福平
- E. 乙胺丁醇

247. 女性, 25 岁, 左上唇鼻翼旁毛囊炎致形成疖肿, 已有脓头形成, 自行挤压排脓后 2 日, 开始出现头痛、高热, 初步判断感染向颅

内扩散, 并发海绵窦血栓性静脉炎, 其扩散途径通常是

- A. 面前静脉、颈内静脉
- B. 颞浅静脉、内眦静脉
- C. 面前静脉、内眦静脉、眼静脉
- D. 内眦静脉、眼静脉
- E. 眶内静脉、面前静脉

248. 男性, 50 岁, 左耳垂后下肿胀、破溃后有脓液流出, 其中可见针尖大小淡黑色颗粒, 经化验为硫黄颗粒。对于该病最有效的药物是

- A. 大环内酯类(红霉素等)
- B. 青霉素族
- C. 喹诺酮类(诺氟沙星等)
- D. 氨基糖苷类(链霉素等)
- E. 硝基咪唑类抗生素(甲硝唑等)

249. 绷带包扎的作用包括

- A. 保护术区和创部, 防止继发感染, 避免再度受损
- B. 保温, 固定敷料
- C. 止血并防止水肿
- D. 防止或减轻骨折错位
- E. 以上都是

250. 腮腺区包块通常不作术前病理检查, 而采取手术时作冰冻检查的主要原因是

- A. 重复切口影响美观
- B. 患者免受两次手术痛苦
- C. 增加解剖面神经的困难, 并且不符合肿瘤治疗原则
- D. 有面神经不易取标本
- E. 增加刀口感染机会

251. 颞部外伤出血进行压迫止血的有效部位是

- A. 耳屏前区
- B. 颈动脉三角区
- C. 颌外动脉走行区
- D. 下颌角区
- E. 咬肌前缘

252. 细菌进入创口几小时内尚未大量繁殖而易于清除

- A. 6~12 小时内
- B. 14 小时内
- C. 20 小时内
- D. 24 小时内
- E. 32 小时内

253. 男性, 65 岁, 左舌缘溃疡 2 个月余不愈合, 为明确诊断需先进行活检, 此时切取活检组织的部位最好是

- A. 表面渗出物
- B. 边缘与正常组织交界处
- C. 边缘处
- D. 深层组织
- E. 表面组织

254. 左侧颞下间隙感染患者, 已经行颞部及下颌下区切口的上、下贯通式切开引流术, 流出大量脓性分泌物, 应选择的引流方式是

- A. 片状引流
- B. 负压引流
- C. 管状引流
- D. 细纱条引流
- E. 碘仿纱条引流

255. 患者女性, 45 岁, 因左侧腮腺肿物局麻下行左侧腮腺浅叶及肿物切除术, 术后局部应用绷带加压包扎, 最好选用

- A. 三角带
- B. 四头带
- C. 头颅弹性绷带
- D. 交叉十字绷带
- E. 单眼交叉绷带

256. 男, 28 岁, 拔牙前 2% 利多卡因局麻后, 患者出现心悸、头晕、胸闷、面色苍白、全身冷汗、四肢厥冷无力、脉搏快而弱、血压下降。该患者情况属于

- A. 中毒
- B. 晕厥

C. 过敏反应

- D. 癔病
- E. 肾上腺素反应

257. 牙拔除后需要多长时间, X 线片上拔牙创出现正常的骨结构

- A. 半个月后
- B. 1~2 个月
- C. 2~3 个月
- D. 3~6 个月
- E. 6~12 个月

258. 影响种植体骨结合的因素中, 可除外的是

- A. 种植体材料的生物相容性
- B. 病人自身条件
- C. 手术创伤
- D. 种植体应力分布的合理性
- E. 术前是否应用抗生素

259. 在牙种植术中, 种植体与骨组织间的结合方式最理想的是

- A. 纤维-骨性结合
- B. 肉芽-骨性结合
- C. 骨结合
- D. 种植体-人工膜-骨性结合
- E. 拟牙周膜性结合

260. 关于下颌升支边缘性骨髓炎影像学表现下述哪项是错误

- A. 病灶区大量死骨形成
- B. 升支部位弥漫性密度增高
- C. 病灶区可见局限性骨质破坏灶
- D. 骨质增生为主
- E. CT 横断面图像可显示骨膜下成骨

261. 口腔颌面部感染的主要途径是

- A. 牙源性
- B. 腺源性
- C. 损伤性
- D. 血源性
- E. 医源性

262. 最易并发颅底骨折的颌骨骨折是

- A. 上颌骨 LeFort I 型骨折
- B. 上颌骨 LeFort II 型骨折
- C. 上颌骨 LeFort III 型骨折
- D. 下颌骨髁状突骨折
- E. 下颌骨正中骨折

263. 颌骨骨折的复位标准是

- A. 骨性愈合
- B. 纤维性愈合
- C. 骨折线上的牙齿不松动
- D. 恢复原有咬合关系
- E. 无感染发生

264. 下列关于局部麻醉药物的描述哪个是正确的

- A. 心律失常患者常用的局麻药为酯类
- B. 普鲁卡因的效能强度高于酰胺类局麻

药物

- C. 阿替卡因适用于所有患者
- D. 丁卡因常用于浸润麻醉
- E. 利多卡因的常用阻滞麻醉浓度为

1%~2%

265. LeFort III 型骨折是指

- A. 锥形骨折
- B. 下颌骨骨折
- C. 上颌骨低位骨折
- D. 上颌骨中位骨折
- E. 上颌骨高位骨折

266. LeFort II 型骨折是指

- A. 颧弓上骨折
- B. 锥形骨折
- C. 水平骨折
- D. 纵形骨折
- E. 矢状骨折

267. 髁状突颈部骨折后髁状突常被拉向

前内方是由于患侧

- A. 颞肌的作用
- B. 咬肌的作用
- C. 翼内肌的作用
- D. 翼外肌的作用

E. 关节韧带的作

268. 诊断牙槽突骨折最有力的证据是

- A. 牙龈撕裂
- B. 牙齿松动
- C. 牙齿移位, 咬合关系紊乱
- D. 摇动损伤区的牙时, 可见临近数牙随

之移动

E. 局部疼痛, 不敢咬合

269. 一般骨折多长时间后, X 线片可见骨

性愈合的迹象

- A. 1~2 个月
- B. 5~6 个月
- C. 7~9 个月
- D. 10~12 个月
- E. 12 个月以上

270. 哪些不是颧弓骨折的临床表现

- A. 张口受限
- B. 颧面部塌陷
- C. 局部压痛
- D. 咬合紊乱
- E. 复视

271. 髁状突颈部骨折常伴有

- A. 上颌骨骨折
- B. 下颌角区骨折
- C. 下颌升支部骨折
- D. 颧弓骨折
- E. 对侧颞孔区或颞部骨折

272. 颌面骨中容易发生骨折的为

- A. 颧骨
- B. 颧弓
- C. 腭骨
- D. 下颌骨
- E. 上颌骨

273. 颧弓骨折需要复位的指征是

- A. 鼻孔出血
- B. 咀嚼无力
- C. 骨折区疼痛
- D. 张口受限

E.患者要求治疗

274.患者不慎摔倒,额部着地,无明显开放性损伤,但伤后出现两侧**后牙早接触**,前牙开殆,**两侧颞下颌关节区疼痛**,最可能的诊断是

- A.双侧翼外肌痉挛
- B.双侧咬肌痉挛
- C.双侧髁状突颈部骨折
- D.双侧颞下颌关节前脱位
- E.下颌骨颞部骨折

275.患者男性,26岁。因车祸造成面部外伤,X线片显示右侧上颌骨骨折,骨折线横过**鼻背、眶部,经颧骨上方到达翼突**,正确的诊断是

- A.LeFort I型骨折
- B.LeFort II型骨折
- C.鼻骨骨折
- D.LeFort III型骨折
- E.颧弓骨折

276.某患者右侧舌背**小圆形血管瘤**,边界清约1.0 cm×1.0 cm大小,拟行手术切除,手术时应注意

- A.采用细针细线,以减小瘢痕
- B.进针点距创缘近些,缝得浅些
- C.最好不用褥式缝合
- D.尽量保持舌的长度
- E.尽量保持舌的宽度

277.某患者面部遭受外力打击后,未形成开放性创口,局部肿胀、疼痛和皮下淤血,X线检查未见颌骨骨折。临床诊断为

- A.撕裂伤
- B.挫裂伤
- C.挫伤
- D.擦伤
- E.撕脱伤

278.关于牙龈瘤的叙述,哪项是**错误的**

- A.女性多见,与内分泌有关
- B.可以破坏牙槽骨壁

C.一般应将病变波及的牙齿拔除

D.病变波及的骨膜及邻近骨组织需要去除

E.因非真性肿瘤,切除后不易复发

279.痣样基底细胞癌综合征的临床表现

不包括

- A.多发性角化囊性瘤
- B.皮肤基底细胞癌(癌)
- C.分叉肋,颅骨异常
- D.小脑镰钙化
- E.眶距缩窄

280.牙源性角化囊性瘤的**好发部位是**

- A.上颌前牙区
- B.上颌磨牙区
- C.上颌尖牙区
- D.下颌升支及磨牙区
- E.下颌前牙区

281.哪种囊肿属于牙源性囊肿

- A.球上颌囊肿
- B.鼻腭囊肿
- C.鼻唇囊肿
- D.正中囊肿
- E.始基囊肿

282.口腔颌面部因炎症而引起的牙源性囊肿**主要是**

- A.根尖囊肿
- B.鼻腭囊肿
- C.鼻唇囊肿
- D.始基囊肿
- E.含牙囊肿

283.囊壁中含有皮肤附件结构的囊肿是

- A.皮脂腺囊肿
- B.皮样囊肿
- C.表皮样囊肿
- D.鳃裂囊肿
- E.甲状舌管囊肿

284.口腔颌面部常见的癌前状态**不包括**

- A.口腔扁平苔藓



- B. 口腔黏膜下纤维性变  
C. 红斑  
D. 上皮过角化  
E. 梅毒
285. 口腔颌面部**不易早期发现**的肿瘤是  
A. 腮腺浅叶肿瘤  
B. 颌下腺肿瘤  
C. 硬腭肿瘤  
D. 舌体部肿瘤  
E. 舌下腺肿瘤
286. 肿瘤化疗最严重的**副反应**是  
A. 口腔溃疡  
B. 胃肠道反应  
C. 骨髓抑制  
D. 脱发  
E. 肝损害
287. 口腔内肿瘤的患者放射治疗前的准备**不包括**  
A. 拔除口内的病灶牙  
B. 治疗患龋的牙齿  
C. 保留金属套冠及冠桥  
D. 注意口腔卫生  
E. 用氟剂涂布牙冠
288. 以下关于上颌窦癌的叙述, 哪项是**错误的**  
A. 以鳞癌为最常见  
B. 早期无症状而不易发觉  
C. 肿瘤发生部位不同可出现不同临床症状(如鼻塞、复视、张口受限等)  
D. 早期即有明显的骨质破坏  
E. 远处转移较少见
289. 属于口腔癌**一级预防措施**的是  
A. 早发现  
B. 早诊断  
C. 早治疗  
D. 病因预防  
E. 防止复发
290. 关于肿瘤的治疗哪项**不正确**  
A. 良性肿瘤一般以外科治疗为主  
B. 细胞分化程度较好的恶性肿瘤常采用手术治疗  
C. 位于颌面深部或近颅底的肿瘤, 首先考虑放疗或化疗  
D. 临床上对于骨肉瘤或者恶性黑色素瘤可以进行放射治疗  
E. 颌骨肿瘤一般以手术治疗为主
291. 关于牙龈癌的叙述, 哪项是**错误的**  
A. 多为鳞癌  
B. 男性多于女性, 以溃疡型最多见  
C. 早期向牙槽突及颌骨浸润  
D. 下牙龈发病率高于上牙龈  
E. 上牙龈癌比下牙龈癌转移早
292. 关于舌癌的叙述, 哪项是**错误的**  
A. 以鳞癌多见  
B. 多发生于舌缘, 恶性度高  
C. 常发生早期颈部淋巴结转移  
D. 舌尖部癌可以转移至颌下或直接至颈深中群淋巴结  
E. 转移途径多为直接浸润和种植转移
293. 舌癌区域性淋巴结**转移早**的原因  
A. 生长快  
B. 舌淋巴丰富  
C. 距区域淋巴结近  
D. 舌机械活动频繁  
E. 舌淋巴及血运丰富, 舌活动频繁
294. 最多发生双侧颈淋巴结转移的肿瘤是  
A. 舌癌  
B. 口底癌  
C. 颊癌  
D. 腭癌  
E. 上颌窦癌
295. **最少**发生区域性淋巴结转移的恶性肿瘤是  
A. 鳞状细胞癌  
B. 基底细胞癌

- C. 淋巴上皮癌  
D. 腺上皮癌  
E. 未分化癌
296. 对放射线中等敏感的肿瘤是  
A. 恶性黑色素瘤  
B. 脂肪肉瘤  
C. 基底细胞癌  
D. 浆细胞肉瘤  
E. 恶性淋巴瘤
297. 色素痣好发于  
A. 口腔黏膜  
B. 颌骨组织  
C. 腮腺组织  
D. 颌下腺组织  
E. 面部皮肤
298. 易复发可恶变的颌骨病变是  
A. 根端囊肿  
B. 始基囊肿  
C. 含牙囊肿  
D. 角化性囊肿  
E. 外渗性囊肿
299. 女性, 13岁, 左面部肿大、畸形, 随年龄而增长。查: 左鼻及唇颊增大、下坠、质软, 面部及躯干皮肤有多处棕色斑。最可能的临床诊断是  
A. 嗜酸性粒细胞增生性淋巴肉芽肿  
B. 囊性淋巴管瘤  
C. 神经纤维瘤病  
D. 放线菌病  
E. 海绵状血管瘤
300. 患儿男, 5个月, 出生时即被家属发现, 右颊部稍红斑片, 哭闹时颜色加重, 逐渐增大, 大小约 2.0 cm×1.5 cm, 稍高于皮肤, 目前的治疗方法首选  
A. 硬化剂治疗  
B. 手术切除  
C. 冷冻治疗  
D. 激光治疗  
E. 应先观察, 如发展迅速, 给予一定的干预治疗
301. 腺样囊性癌常发生远处转移的脏器是  
A. 脑  
B. 骨  
C. 肝  
D. 肾  
E. 肺
302. 发生于舌下腺的肿瘤其恶性肿瘤所占比例大约占  
A. 30%  
B. 10%  
C. 50%  
D. 70%  
E. 90%
303. 腮腺多形性腺瘤切除术应采取  
A. 沿包膜摘除肿瘤, 保留面神经。  
B. 包膜外正常组织处切除肿瘤, 不保留面神经  
C. 深叶肿瘤应切除肿瘤及全腮腺, 均保留面神经  
D. 肿瘤包膜外正常组织处切除  
E. 肿瘤及周围部分腮腺组织切除不保留面神经
304. 涎腺炎的主要感染途径是  
A. 血源性感染  
B. 淋巴源性感染  
C. 逆行性感染  
D. 损伤性感染  
E. 医源性感染
305. 根治舌下腺囊肿的方法是  
A. 抽出囊液  
B. 抽出囊液, 注入 2% 碘酊  
C. 摘除囊肿  
D. 切除舌下腺  
E. 行袋形缝合术
306. 关于下颌下腺炎的叙述, 哪项是错

误的

A. 多为涎石造成唾液排出受阻继发感染所致

B. 反复发作下颌下腺可呈硬结性肿块

C. 双手触诊应从导管前部向后进行

D. 少数涎石 X 线片可能不显影

E. 腺内涎石需作下颌下腺摘除术

307. 关于急性化脓性腮腺炎病因的说法不包括

A. 主要致病菌是链球菌

B. 常见于腹部大手术后

C. 常见于高热或禁食的病员

D. 常见于体质虚弱、长期卧床的病员

E. 常见于急性传染病或脓毒血症的病员

308. 哪项描述与混合瘤的临床表现不符

A. 可发生于任何年龄, 以 30~50 岁多见

B. 一般呈圆形或椭圆形肿块

C. 肿瘤质地硬, 呈结节状

D. 肿瘤生长缓慢, 可伴有明显疼痛

E. 混合瘤常发生于腮腺

309. 临床上怀疑下颌下腺导管阳性结石时, 首选以下哪种检查

A. 下颌曲面断层

B. 下颌下腺造影

C. 下颌骨侧位片

D. 下颌骨后前位片

E. 下颌横断矽片+颌下腺侧位片

310. 以下哪项不是腺样囊性癌的特征

A. 好发于下颌下腺

B. 肿瘤沿神经血管束生长

C. 浸润性极强

D. 区域淋巴结转移率低

E. 肿瘤易侵入血管

311. 通常所说的颞下颌"关节强直"指的不是

A. 真性关节强直

B. 关节内强直

C. 关节内纤维性粘连

D. 关节内骨性粘连

E. 颌间挛缩

312. 由器质性病变导致开口度逐渐变小, 以致完全不能开口, 称为

A. 关节盘移位

B. 咀嚼肌群痉挛

C. 颞下颌关节强直

D. 瘰病性牙关紧闭

E. 破伤风后牙关紧闭

313. 双侧颞下颌关节强直最好一次手术, 如需分两次手术, 相隔时间不宜超过

A. 3 天

B. 1 周

C. 2 周

D. 1 个月

E. 3 个月

314. 以下关于颞下颌关节紊乱病的叙述, 哪项是错误的

A. 本病有自限性

B. 治疗不及时会发生关节强直

C. 并非指单一疾病, 而是一组疾病的总称

D. 三个主要临床症状是下颌运动异常疼痛及关节弹响和杂音

E. 是多因素所致疾病, 关节内微小创伤与精神心理因素是本病的两个主要致病因素

315. 关于不可复性关节盘前移位临床特点的叙述, 哪项是错误的

A. 开口时下颌偏向健侧

B. 典型的关节弹响病史

C. X 线片显示关节前间隙增宽

D. 测被动开口度时, 开口度不能增大

E. 间断性关节绞锁史

316. 关于双侧颞下颌关节急性前脱位的叙述, 哪项是错误的

A. 前牙开颌, 不能闭口

B. 下颌前伸, 额部前突



配套名师精讲课程

- C. 耳屏前肿胀,后牙接触  
D. 必要时作 X 线检查除外髁状突骨折  
E. 复位后应限制下颌运动,2~3 周
317. 某患者曾有颞部受力外伤史,后出现进行性开口困难,逐渐发展到**完全不能张口**,下颌发育不足,左侧髁状突无动度,可能出现的其他表现应该是
- A. 左侧下颌体、下颌支长,外观丰满  
B. 左侧下颌体、下颌支短小,外观丰满  
C. 颞部偏向右侧,右侧面都扁平、狭长  
D. 颞部偏向左侧,左侧面部扁平、狭长  
E. 颞部偏向右侧,右侧面部外观丰满
318. 颞下颌关节紊乱病是口腔颌面部常见病之一,以下列哪一年龄组患病率、就诊率**最高**
- A. 50 岁以上  
B. 20 岁以内  
C. 20~30 岁  
D. 40~50 岁  
E. 50 岁以上
319. 三叉神经痛患者在疼痛发作时上颌的痛性抽搐**不包括**
- A. 痛区潮红  
B. 眼结膜充血  
C. 出汗流涎  
D. 流泪  
E. 患侧鼻腔黏液减少
320. 贝尔面瘫与中枢性面瘫相鉴别的重要**临床表现**是
- A. 眼睑闭合不全  
B. 额纹消失,不能皱眉  
C. 口角偏斜  
D. 鼓腮不能  
E. 鼻唇沟消失
321. 关于面神经麻痹的叙述,哪项是**错误**的
- A. 分为原发性和继发性两种  
B. 贝尔麻痹指临床上不能肯定病因的、

- 不伴有其他症状或体征的单纯型周围面神经麻痹
- C. 而神经损害如发生在茎乳孔外,一般不发生味觉、泪液、唾液等方面的变化  
D. 贝尔麻痹急性期不宜应用强的刺激疗法  
E. 预后主要取决于病情严重程度和治疗是否及时
322. 关于**三叉神经痛**的治疗方法中,哪种复发率高,且可重复应用
- A. 药物治疗  
B. 封闭疗法  
C. 无水酒精注射疗法  
D. 三叉神经撕脱术  
E. 半月神经节射频温控热凝术
323. 腭裂术后穿孔或部分裂开,术后至少多长时间可行**二期手术**
- A. 1~2 个月  
B. 3~4 个月  
C. 5~7 个月  
D. 6~12 个月  
E. 以上都不对
324. 婴儿**唇裂术后**饮食方法为
- A. 小汤匙喂饲流食  
B. 吮吸母乳  
C. 普通奶瓶喂流食  
D. 半流食  
E. 术后 24 h 禁食
325. 腭裂术后的饮食**要求**为
- A. 术后半流  
B. 术后流食,1 周后改半流  
C. 流质饮食维持术后 1~2 周  
D. 术后 2 周可进普食  
E. 术后 1 周禁食,静脉补给能量
326. 腭裂手术时在腭部黏骨膜下注射含肾上腺素的麻药或生理盐水的主要目的是
- A. 减少疼痛  
B. 减少出血、便于剥离

- C.减少肿胀  
D.防止血管损伤  
E.以上都不是
- 327.下列哪一项不是牙颌面畸形临床分类
- A.颌骨发育过度所致牙颌面畸形  
B.颌骨发育不足所致牙颌面畸形  
C.牙源性错颌畸形  
D.对称性牙颌面畸形  
E.复合性牙颌面畸形
- 328.牙颌面畸形的治疗包括
- A.术前正畸治疗  
B.确认手术计划  
C.正确施术  
D.完成术前准备  
E.以上都是
- 329.患者,女,6岁。下乳切牙Ⅰ度松动。拔除乳切牙进行表面麻醉的首选药物是
- A.4%丁卡因  
B.2%丁卡因  
C.2%普鲁卡因  
D.2%利多卡因  
E.0.5%布比卡因
- 330.患者,女,61岁。右上尖牙残根,拟拔除后修复,局部麻醉最好选择
- A.眶下孔阻滞麻醉  
B.切牙孔阻滞麻醉  
C.腭前神经阻滞麻醉  
D.翼腭管传导阻滞麻醉  
E.唇、腭侧局部浸润麻醉
- 331.患者,男,34岁。右上6死髓牙、劈裂,要求拔除。拔除时应采用的麻醉包括
- A.上颌结节麻醉+腭大孔麻醉  
B.上颌结节麻醉+腭大孔麻醉+右上6腭侧近中局部浸润麻醉  
C.上颌结节麻醉+腭大孔麻醉+右上6颊侧近中局部浸润麻醉  
D.腭大孔麻醉+右上6颊侧局部浸润

麻醉

- E.右上6颊、腭侧局部浸润麻醉
- 332.拔牙创的检查与处理哪项是错误的
- A.应检查拔除的牙是否完整  
B.应检查拔除的牙根数目是否符合  
C.刮除拔牙创内肉芽组织  
D.复位扩大的牙槽窝  
E.将消毒纱布填入牙槽窝
- 333.拔牙造成口腔与上颌窦交通时,错误的处理方法是
- A.穿孔<2 mm,按常规拔牙后处理,待其自然愈合  
B.术后嘱患者勿用鼻腔鼓气  
C.避免强力打喷嚏  
D.穿孔>7 mm,不需要骨膜瓣关闭创口  
E.术后给予抗感染治疗
- 334.位于放射治疗范围内的牙齿拔除时间是
- A.放疗前  
B.放疗后1周  
C.放疗后1个月  
D.放疗后2周  
E.放疗后3个月
- 335.牙拔除后至少多长时间,拔牙创内形成凝血块而将创口封闭
- A.5分钟  
B.10分钟  
C.15分钟  
D.30分钟  
E.45分钟
- 336.对阻生智齿的命名中哪项是错误的
- A.低位水平阻生  
B.近中垂直阻生  
C.高位远中阻生  
D.倒置阻生  
E.舌向阻生
- 337.造血系统疾病患者,拔牙时下列哪项是错误的



配套名师精讲课程

A. 贫血患者, 血红蛋白在 60 g/L 以上, 可考虑拔牙

B. 急性白血病为拔牙禁忌证

C. 血友病拔牙, 应补充凝血因子

D. 原发性血小板减少性紫癜急性型不可拔牙

E. 慢性白血病拔牙时应与专科医生合作

338. 拔除上颌第一磨牙时需要麻醉的神经为

A. 上牙槽中神经

B. 上牙槽中神经、上牙槽后神经

C. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经

D. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经

E. 上牙槽中神经、上牙槽后神经、腭前神经、鼻腭神经、腭后神经

339. 行牙齿拔除术时, 对患者体位描述错误的是

A. 多采用坐位

B. 头后仰, 使张口时上颌牙的殆平面与地平面成 45° 角

C. 拔除上颌牙时, 手术椅的高度大约为上颌与术者的肩部在同一水平

D. 拔除下颌牙时, 应使患者在张口时, 上颌的颌平面与地平面平行, 下颌与术者的肘关节在同一高度或更低

E. 术者一般应位于患者的右前方, 拔下前牙时应立于患者的右后方

340. 拔上颌前牙, 脱位时用力的方向是

A. 近中

B. 唇侧

C. 腭侧

D. 远中

E. 前下

341. 牙挺使用的原则中不包括

A. 不可以邻牙作支点, 除非邻牙一并拔除

B. 颌水平的颊舌侧均不能作支点, 除非拔除智牙或颊舌侧需去骨者

C. 必须以手指作保护, 以防牙挺滑脱

D. 用力必须有控制, 用力方向必须正确

E. 可兼作骨凿, 用于增隙和去骨

342. 应暂缓拔牙的情况是

A. 妊娠 4.5.6 个月

B. 糖尿病的血糖 150 mg/dl, 尿糖 (+), 无酸中毒

C. 急性智齿冠周炎伴咬肌间隙感染

D. 甲状腺功能亢进治疗后心率低于 100 次/分

E. 高血压患者血压控制在 160/100 mmHg 以内

(343~345 题共用题干)

患者, 男, 35 岁。右下 8 近中阻生, 右下 7 远中龋坏。施行拔除术后 3 日, 拔牙窝出现持续性疼痛并向耳颞部放射, 检查见拔牙窝内空虚, 有异味。

343. 此时最可能的诊断为

A. 急性根尖周炎

B. 干槽症

C. 术后反应

D. 术后疼痛

E. 牙槽突骨折

344. 要了解右下 7 的龋坏程度, 最佳的检查方法为

A. 冷诊

B. 热诊

C. X 线片

D. 患者主诉

E. 电话力测试

345. 此患者右下 8 相应的治疗应为

A. 根管治疗

B. 保持口腔卫生

C. 口服抗生素即可

D. 用生理盐水冲洗拔牙窝即可

E. 对拔牙窝彻底清创后, 以碘仿纱条填

塞,隔离外界刺激

(346~348 题共用题干)

患者,男,50岁。左下颌第二磨牙残冠,局部无炎症,拟进行拔除。

346.下牙槽神经阻滞麻醉口内法的进针点应在

- A.颊黏膜下颌牙骀面上方 1.0 cm
- B.磨牙后垫上方 1.0 cm 处
- C.下颌韧带中央稍内侧
- D.磨牙后窝最深处
- E.颊脂垫尖

347.如拔牙时发生断根,位置较低,根挺应置于

- A.从根断面较低的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- B.从根断面较高的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- C.从牙槽骨较厚的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- D.从牙槽骨较薄的一侧插入牙槽骨与牙根之间
- E.从牙槽窝近颊侧插入牙槽骨与牙根之间

348.拔牙后向患者交代注意事项时,错误的是

- A.咬住创口上的棉卷,30分钟后取出
- B.术后1天内唾液中可混有少量血丝
- C.拔牙后2小时漱口,保持口腔清洁
- D.宜吃偏冷、偏软的食物
- E.拔牙7天后拆线

(349~352 题共用题干)

患者,女,13岁。正畸需要减数拔牙,术中误将左下尖牙认为第一前磨牙拔除。

349.立即将误拔牙放入原牙窝内并做适当固定称为

- A.即刻再植
- B.延期再植
- C.自体移位

D.异体移植

E.牙种植术

350.进行上述处理,应满足的条件中不包括

- A.根尖无病变
- B.牙周无病变
- C.牙根尚未发育完全
- D.唇面釉质在拔除中脱落
- E.患者年龄小

351.该种处理术后愈合方式中不包括

- A.骨结合
- B.牙周膜愈合
- C.骨性愈合
- D.纤维性愈合
- E.骨性粘连

352.该种治疗方法的成功标准中不包括

- A.疼痛消失,无感染
- B.不松动,咀嚼功能正常
- C.牙龈附着正常
- D.X线片示牙根无异常透射影
- E.行使功能达3年以上

(353~354 题共用题干)

患者,18岁。右下颌下区肿痛7天,加剧3天,查体:T 39℃,一般情况差,右下颌下皮肤红,皮温高,压痛明显,触有波动感,肿胀无明显界限。舌下肉阜无红肿,导管口无溢脓,右下第一磨牙残根,叩痛(++)。X线片见右下6根尖周X线透射区。

353.穿刺下颌下区最可能抽出的液体是

- A.黄色黏稠脓液
- B.暗灰色稀薄脓液
- C.陈旧性血性液体
- D.黄色蛋清样液体
- E.淡黄色清亮液体

354.最可能的诊断为

- A.化脓性颌骨髓炎
- B.结核性淋巴结炎
- C.化脓性颌下腺炎



- D. 恶性淋巴瘤  
E. 右下颌下间隙感染  
(355~357 题共用题干)

男, 36 岁。进食时出现右下颌下区肿胀疼痛, 进食后 1 小时左右肿胀消退。检查见下颌下腺导管口红肿, 轻压腺体导管口溢脓。

355. 首选的检查方法是  
A. 下颌横断殆片  
B. 下颌前部殆片  
C. 曲面体层片  
D. 下颌骨后前位片  
E. 下颌下腺造影
356. 若需进行触诊检查, 则应该  
A. 从导管后部向前单手触诊  
B. 从导管前部向后单手触诊  
C. 从导管前部向后双手触诊  
D. 从导管后部向前双手触诊  
E. 禁忌触诊检查
357. 可能的诊断是  
A. 化脓性舌下腺炎  
B. 下颌下间隙感染  
C. 下颌下腺涎石并发下颌下腺炎  
D. 舌下腺涎石  
E. 急性舌下腺炎及下颌下腺炎  
(358~360 题共用题干)

女, 16 岁。因儿童期颞部外伤所致单侧颞下颌关节强直。

358. 在可能伴有的严重面下部发育障碍中, 错误的是  
A. 患侧下颌体及升支短小  
B. 患侧面部扁平  
C. 患侧角前切迹加深  
D. 健侧下颌相对较长  
E. 颞点偏向患侧
359. 若 X 线证实, 其患侧乙状切迹尚存在, 最适宜的手术方法是  
A. 在相当于髁突顶处, 切除 0.5 cm 宽

- 骨质  
B. 在相当于髁突颈以上平面, 切除 1~1.5 cm 宽骨质  
C. 在下颌孔平面以上切除 1~1.5 cm 骨质  
D. 在下颌孔平面以下截去 1~1.5 cm 骨质  
E. 在下颌角处截去 1~1.5 cm 骨质
360. 若双侧颞下颌关节都已受累, 患者又无法耐受双侧同期手术, 两次手术之间的间隔不应超过  
A. 3 天  
B. 1 周  
C. 2 周  
D. 1 个月  
E. 3 个月  
(361~362 题共用题干)

患者, 女, 37 岁。左侧面部发作性电击样疼痛 3 个月, 临床拟诊为三叉神经痛。

361. 在检查时寻找“扳机点”的方法不包括  
A. 叩诊  
B. 拂诊  
C. 触诊  
D. 压诊  
E. 揉诊
362. 三叉神经痛功能检查不包括  
A. 感觉功能  
B. 味觉功能  
C. 角膜反射  
D. 腭反射  
E. 运动功能  
(363~365 题共用题干)

患儿, 男, 5 岁。进食时不慎跌倒, 筷子戳破腭部 2 小时。急诊检查见软腭有一约 15 mm 长创口, 为贯穿伤。患儿清醒, 检查合作。

363. 该患儿的处理应是  
A. 不需特殊处理

B. 患儿合作时应予缝合

C. 局麻下缝合

D. 表面麻醉下缝合

E. 全麻下缝合

364. 如同时存在**硬腭组织缺损, 创口较大**, 此时的局部处理为

A. 应拉拢缝合, 尽量缩小创面

B. 在硬腭两侧做松弛切口, 然后缝合创面

C. 因患儿年龄小, 组织再生能力强, 可任其自行愈合

D. 由患儿家属决定是否手术缝合

E. 堵塞碘纱保护创面即可

365. 如进行缝合, 应缝合

A. 鼻侧黏膜、肌层、口腔侧黏膜

B. 肌层、口腔侧黏膜

C. 口腔侧黏膜

D. 鼻侧黏膜、口腔侧黏膜

E. 全层贯穿缝合

(366~367 题共用题干)

患者, 男, 58 岁。晨起喝水时左侧口角漏水, 照镜子发现左口角下垂, 遂来我院就诊。门诊除以上症状外, 还发现**左侧舌、颊及口底黏膜较对侧显无光泽、干燥, 同侧舌前 2/3 味觉迟钝, 听力检查明显较右侧差。**

366. 患者损伤的部位是

A. 茎乳孔以外

B. 鼓索与镫骨肌神经节之间

C. 镫骨肌与膝状神经节之间

D. 膝状神经节

E. 脑桥与膝状神经节之间

367. 对于该患者目前最恰当的治疗应选择

A. 立即行面神经管减压术

B. 大剂量激素+抗病毒药+神经营养药

C. 尽快给予强电流刺激以促进肌肉运动

D. 大剂量激素+神经营养药

E. 阿司匹林+神经营养药

(368~370 题共用备选答案)

A. 暂时性面瘫

B. 翼静脉丛血肿

C. 恶心、干呕

D. 瞳孔缩小

E. 颌后区血肿

以下麻醉最易引起的相应**并发症**是

368. 腭大孔麻醉

369. 下牙槽神经阻滞麻醉

370. 上颌结节麻醉

(371~373 题共用备选答案)

A. 0.5%~1% 普鲁卡因

B. 1%~2% 利多卡因

C. 1%~2% 丁卡因

D. 0.5% 布比卡因和 1:200 000 肾上腺素

E. 4% 利多卡因

371. 费时较长的手术选用

372. 口腔颌面部软组织范围较大的手术选用

373. 心律失常患者首选

(374~376 题共用题干)

患者女性, 43 岁, 风湿性心脏病史 10 余年, 二尖瓣狭窄, 心功能 I 级。口内有右下侧切牙、第一磨牙, 左下侧切牙残根, I° 松动需要拔除。

374. 该患者拔牙, 在有菌血症发生时, 有可能导致以下哪种严重并发症的风险

A. 干槽症

B. 颊间隙感染

C. 口腔上颌窦瘘

D. 颊下间隙感染

E. 亚急性细菌性心内膜炎

375. 预防亚急性细菌性心内膜炎, 以下哪种抗生素高度敏感

A. 甲硝唑

B. 青霉素

C. 链霉素

D. 头孢菌素

- E.庆大霉素
- 376.对于该患者最佳的治疗方案是
- A.分次拔除患牙,术前预防性使用抗生素
- B.分次拔除患牙,术后预防性使用抗生素
- C.分次拔除患牙,术前术后预防性使用抗生素
- D.一次拔除全部患牙,术前预防性使用抗生素
- E.一次拔除全部患牙,术前术后预防性使用抗生素
- (377~380题共用备选答案)
- A.牵引力
- B.轮轴力
- C.扭转力
- D.摇动力
- E.楔力
- 377.拔牙时首先应用
- 378.使牙齿脱位的力是
- 379.拔除扁根牙或多根牙时不宜使用
- 380.三角挺主要提供的是
- (381~384题共用备选答案)
- A.第Ⅱ类阻生
- B.第Ⅲ类阻生
- C.颊侧移位
- D.低位阻生
- E.倒置阻生
- 381.根据牙与下颌升支及第二磨牙的关系,阻生智齿全部位于下颌支内时称为
- 382.根据牙在骨内的深度,骨埋伏阻生属于
- 383.以上哪种类型是根据阻生智齿的长轴与第二磨牙长轴的关系而进行的分类
- 384.以上哪种类型是根据在牙列中的位置而进行的分类
- (385~390题共用备选答案)
- A.0.1%

- B.0.5%
- C.1%
- D.2%
- E.3%
- 385.用于消毒颌面、颈部的碘酊浓度为
- 386.用于消毒口腔黏膜的碘酊浓度为
- 387.用于消毒口腔及创口的洗必泰液浓度为
- 388.用于消毒皮肤的洗必泰液浓度为
- 389.用于消毒口腔及皮肤的碘伏含有效碘的浓度为
- 390.用于消毒头皮部的碘酊浓度为
- (391~396题共用备选答案)
- A.现病史
- B.既往史
- C.个人史
- D.月经及婚育史
- E.家族史
- 391.起病日期、发病情况及有关发病因素等应记入
- 392.病情演变以及与该病有鉴别诊断的症状表现应记入
- 393.预防接种史及具体日期应记入
- 394.双亲与兄弟、姐妹及子女的健康与疾病情况应记入
- 395.社会经历及习惯、嗜好应记入
- 396.药物不良反应及过敏史应记入
- (397~398题共用备选答案)
- A.钳夹、结扎止血法
- B.区域阻断止血法
- C.填塞止血法
- D.低温、降压止血法
- E.电灼止血法
- 下列出血情况应选用的正确止血方法是
- 397.外伤致上颌骨骨折,鼻腔发生明显出血
- 398.颌面部挫裂伤而出现活动性出血
- (399~402题共用备选答案)

- A. 黄色黏稠脓液  
B. 淡黄色稀薄脓液  
C. 翠绿色、稍黏稠、有酸臭味的脓液  
D. 灰白或灰褐色、有明显腐败坏死臭味的脓液

E. 稀薄污浊、暗灰色米汤样、夹杂干酪样坏死物的脓液

399. 结核性冷脓肿的脓液为  
400. 链球菌感染形成的脓液一般为  
401. 混合细菌感染的脓液为  
402. 金黄色葡萄球菌感染形成的脓液为  
(403~405 题共用题干)

患者女性, 60 岁舌左侧缘中部溃烂 5 个月, 约 2.3cm×1.5cm×0.5cm 大小, 活检报告为“鳞癌”, 左下 6 残根, 边缘锐利。

403. 关于舌癌下列哪种说法是错误的  
A. 舌癌是最常见的口腔癌  
B. 男性多于女性  
C. 近年来女性增多及年龄更年轻化  
D. 常为外生型  
E. 晚期可蔓延至口底或下颌角

404. 舌癌转移的特点下列哪种说法是错误的

- A. 舌癌常发生早期颈淋巴结转移, 且转移率较高  
B. 舌癌的颈淋巴结转移常在一侧  
C. 发生于舌背或越过舌体中线的舌癌, 可以向对侧颈淋巴结转移  
D. 舌前部的癌多向下颌下及颈深淋巴结上、中群转移

E. 舌癌可发生远处转移, 一般多为脑

405. 舌癌的好发部位

- A. 舌尖  
B. 舌缘  
C. 舌根  
D. 舌背  
E. 以上都不是

(406~408 题共用备选答案)

- A. 氮芥  
B. 平阳霉素  
C. 甲氨蝶呤  
D. 长春新碱  
E. 顺铂

406. 属植物类抗癌药物是

407. 属代谢类抗癌药物是

408. 属细胞毒素类抗癌药物是

(409~412 题共用备选答案)

- A. 红褐色血样液体, 经久不凝  
B. 微混浊的黄色黏稠性液体  
C. 淡黄色清亮液体, 含淋巴细胞  
D. 黄色或棕色清亮液体, 含胆固醇结晶  
E. 乳白色豆渣样分泌物

409. 鳃裂囊肿穿刺液多为

410. 囊性水瘤穿刺液多为

411. 神经鞘瘤穿刺液多为

412. 甲状舌管囊肿穿刺液可为

(413~416 题共用题干)

患者男性, 发现右颌下区肿物 3 个月, 临床检查见右颌下区表面皮肤正常, 可触及肿物质软, 无压痛, 口内检查亦未见异常。手术中见囊腔内流出黏稠而略带黄色蛋清样液体。

413. 该病最可能的诊断是

- A. 右侧颌下区软组织囊肿  
B. 右侧舌下腺囊肿  
C. 右侧颌下腺囊肿  
D. 右侧鳃裂囊肿  
E. 右侧颌下区囊性水瘤

414. 术前对诊断最有帮助的检查是

- A. 颌下腺造影  
B. 舌下腺造影  
C. CT 检查  
D. 囊肿穿刺检查  
E. B 超检查

415. 该病最适合的治疗方法是

A. 穿刺抽出囊液, 加压包扎

- B. 切除颌下腺, 吸尽囊液, 加压包扎  
C. 完整摘除囊壁, 加压包扎  
D. 切除舌下腺及摘除囊壁  
E. 切除舌下腺, 吸尽囊液, 加压包扎
416. 如术后出现颌下区胀痛, 进食时症状力口重, 最可能的原因是
- A. 右侧急性颌下腺炎  
B. 右侧急性颌下淋巴结炎  
C. 右侧颌下腺导管结石  
D. 舌下腺切除术中误扎右颌下腺导管  
E. 过敏反应

(417~421 题共用备选答案)

- A. 3~6 个月  
B. 2 岁  
C. 4~6 岁  
D. 9~11 岁  
E. 18 岁以后
417. 单侧唇裂修复手术的最佳时期是在  
418. 完全性腭裂修复手术的最佳时机是在  
419. 牙槽突裂植骨术的理想年龄是  
420. 语音评价及语音治疗的年龄在  
421. 正颌外科治疗的年龄通常在