

2022年执业/助理医师资格考试

笔试高频精选冲刺题

临床执业医师精选600题

套卷三【301-450题】

金英杰医学教育

301.(A1型题)在下列原有疾病基础上遭受急性损害更易发生MODS, 不包括

- A.慢性肾病
- B.风湿性关节炎
- C.糖尿病
- D.肝硬化
- E.冠心病

答案:B

解析:MODS常发生在各个脏器功能较差, 容易发生连锁打击;基础病容易引起大量炎性因子释放的情况下。如慢性肾病、糖尿病、肝硬化、冠心病多表现为多系统同时受累;而风湿性关节炎的主要病变在关节滑膜, 其他脏器虽然也可受累, 但直至后期其他脏器的病变不严重。故风湿性关节炎的基础上遭受急性损害后不易发生MODS。

302.(A2型题)男, 16岁。溺水, 经急救后来急诊。查体:P120次/分, R32次/分, BP95/65mmHg, 神志清楚, 口唇发绀, 双肺可闻及湿啰音。面罩吸氧后氧饱和度监测显示为85%。该患者应立即采取的治疗措施是

- A.静脉注射地塞米松
- B.无创通气
- C.静脉注射呋塞米
- D.静脉注射毛花苷丙
- E.皮下注射吗啡

答案:B

解析:此题暂无解析

303.(A2型题)男, 40岁。因创伤致心跳呼吸停止, 经复苏后恢复, 继而出现体温升高、抽搐、惊厥, 患者可能并发

- A.肺水肿
- B.心力衰竭
- C.肾衰竭
- D.脑水肿
- E.脑死亡

答案:D

解析:脑复苏是心肺复苏成功的关键, 体温升高及抽搐乃至惊厥都是脑缺氧性损伤的体征, 此时因为脑血管自动调节功能丧失, 循环恢复后, 脑血管被动扩张, 微循环瘀血, 微血管壁通透性增高, 水渗出致脑间质水肿。

304.(A1型题)下列哪项是渗出液产生机制

- A.胸膜毛细血管通透性增加
- B.血浆胶体渗透压降低
- C.胸膜毛细血管静水压增高
- D.毛细血管胶体渗透压降低
- E.胸膜毛细血管静水压降低

答案:A

解析:此题暂无解析

305.(A2型题)女性, 58岁患者。因发热、咳嗽、胸闷、气短1周收入住院。查体:T37.5°C, R24次/分, 口唇发绀。双下肺叩诊呈浊音、语颤明显减弱、呼吸音消失。腹部隆起, 叩诊移动性浊音(+). 双侧胸液、腹水呈乳糜样, 苏丹染色阴性。胸液、腹液常规均示渗出液, 淋巴细胞为主, LDH1200U/L, CEA明显增高。PPD(+). 最可能的诊断是

- A.化脓性胸膜炎
- B.结核性胸膜炎
- C.恶性胸腔积液
- D.乳糜样胸腔积液
- E.结缔组织疾病

答案:C

解析:患者胸液、腹水呈乳糜样, 苏丹染色阴性, 胸液、腹液常规均示渗出液, 淋巴细胞为主, LDH1200U/L, CEA明显增高提示为淋巴瘤恶性胸腔积液, 故选C。

306.(A2型题)患者男, 35岁。2周前发热、咳嗽、咳黄痰, 经抗炎治疗后好转。现再次高热、咳嗽、胸闷。查体:T39.5°C, P115次/分, R24次/分, 气管右移, 左侧语颤减弱, 叩诊肺实音, 呼吸音消失。血常规WBC 23×10^9 /L。最有效的治疗措施是

- A.胸腔闭式引流
- B.胸腔成型术
- C.胸膜剥脱术
- D.静脉点滴光谱抗生素
- E.胸腔内注入抗生素

答案:A

解析:气管右移, 左侧语颤减弱, 叩诊肺实音, 呼吸音消失, 并且白细胞增多, 可以诊断为急性脓胸, 治疗原则为选用敏感抗生素, 彻底排脓。最有效的为胸腔闭式引流, 可以向胸腔内注入抗生素但是作用不大。故选A。

307.(A2型题)男, 65岁。间断咳嗽20年, 活动后气短3年。今晨突感左胸部疼痛, 继而出现憋气。查体:左侧胸廓略饱满, 左肺呼吸音明显减弱, HR110次/分, 可闻早搏4次/分。该患者最可能的诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.COPD急性加重
- C.自发性气胸
- D.肺血栓栓塞症
- E.胸腔积液

答案:C

解析:此题暂无解析

308.(A1型题)老年人肋骨骨折, 咳嗽时引起胸部剧痛, 最好采用

- A.胸壁胶布固定
- B.吗啡皮下注射
- C.口服可待因

D.肋间神经阻滞

E.肋骨牵引固定

答案:D

解析:此题暂无解析

309.(A2型题)一位被拖拉机压伤男性, 双侧多发性肋骨骨折, 呼吸困难, 烦躁不安, 发绀, 咳嗽无力, 双肺有较多痰鸣音, 测血压107/80kPa(80/60mmHg)。首选的急救措施是

A.高流量给氧

B.加快输血、输液

C.肋间神经阻滞+包扎固定

D.气管插管或气管切开

E.应用升压药、镇静止痛

答案:D

解析:多根多处肋骨骨折使局部胸壁失去完整的肋骨支撑而软化, 出现反常呼吸, 肋骨骨折端可刺激肋间神经产生疼痛, 胸痛使呼吸道分泌物增多(痰鸣音), 对于呼吸困难、咳嗽无力、不能有效排痰或呼吸衰竭者, 需做气管插管或气管切开, 以利于吸痰、给氧和施行辅助呼吸。故选D。

310.(A1型题)常见前纵隔肿瘤是

A.胸腺瘤

B.神经源性肿瘤

C.肉瘤

D.平滑肌瘤

E.支气管囊肿

答案:A

解析:胸腺瘤、胸骨后甲状腺肿发生在前纵隔上部;畸胎瘤和皮炎囊肿发生在前纵隔;神经源性肿瘤发生在后纵隔肋脊区内;淋巴源性肿瘤发生在中纵隔上部;气管和支气管囊肿发生在后纵隔中部;心包囊肿发生在中纵隔。肉瘤、平滑肌瘤等间叶组织来源的肿瘤少见。故选A。

311.(A1型题)多位于前纵隔接近心底部心脏大血管前方的肿瘤是

A.胸骨后甲状腺肿

B.胸腺瘤

C.畸胎瘤

D.心包囊肿

E.脂肪瘤

答案:C

解析:此题暂无解析

312.(A2型题)女, 38岁。健康查体发现右前上纵隔椭圆形阴影, 边界清晰, 密度均匀, 与周围组织界线明显, 首先考虑诊断可能是

A.胸腺瘤

B.淋巴瘤

- C.神经源性肿瘤
- D.心包囊肿
- E.支气管囊肿

答案:A

解析:根据前上纵隔肿瘤,首先考虑为胸腺瘤或胸骨后甲状腺肿,椭圆形阴影,边界清晰,密度均匀,与周围组织界线明显,包囊完整,进一步考虑为胸腺瘤。

313.(A1型题)心尖搏动点向左下移位常见于

- A.右心房增大
- B.心包积液
- C.右心室增大
- D.左心室增大
- E.左心房增大

答案:D

解析:左心室增大时心尖搏动向左下移位。右心室扩大时心尖搏动向左侧移位。故本题答案为D。

314.(A1型题)判定心力衰竭代偿期的主要指标是

- A.心脏扩大
- B.心肌肥厚
- C.心率加快
- D.心排量增加甚至接近正常
- E.回心血量增加

答案:D

解析:此题暂无解析

315.(A1型题)提示左心功能不全的脉搏是

- A.奇脉
- B.迟脉
- C.交替脉
- D.水冲脉
- E.重搏脉

答案:C

解析:此题暂无解析

316.(A1型题)心电图示:提前发生的P波,形态与窦性P波略不同,PR间期0.14秒,QRS波群形态和时限正常。该心律失常最可能是

- A.房性期前收缩
- B.阵发性室性心动过速
- C.心房颤动
- D.室性期前收缩
- E.阵发性室上性心动过速

答案:A

解析:此题暂无解析

317.(A1型题)急性心肌梗死出现室性期前收缩首选

- A.洋地黄
- B.心得安
- C.利多卡因
- D.奎尼丁
- E.普鲁卡因酰胺

答案:C

解析:此题暂无解析

318.(A2型题)患者女, 64岁, 持续胸痛4小时, 突然出现头晕。查体:BP:95/65mmHg, 心率32次/分, 心率齐, 心电图:II、III、aVF导联ST段弓背向上抬高0.3mV, V1~V5导联ST段压低0.2mV, QRS波群时限0.14秒。该患者最可能出现的心律失常是

- A.二度窦房传导阻滞
- B.完全性右束支传导阻滞
- C.三度房室传导阻滞
- D.心房扑动
- E.窦性心动过缓

答案:C

解析:房室传导阻滞的分级1.一度房室传导阻滞是指从心房到心室的电激动传导速度减慢, 心电图表现为PR间期延长超过0.20s, 但是每个心房激动都能传导至心室。2.二度房室传导阻滞又分为I型和II型。二度I型房室传导阻滞是指从心房到心室的传导时间逐渐延长, 直到有一个心房的激动不能传递到心室。二度II型房室传导阻滞是指心房的激动突然阻滞不能下传至心室, 心电图表现为QRS波群有间期性脱漏。3.三度房室传导阻滞又称完全性房室传导阻滞, 是指全部的心房激动都不能传导至心室, 其特征为心房与心室的活动各自独立、互不相干;且心房率快于心室率。根据患者心电图表现可以判定患者是心脏下壁心肌梗死。并且患者出现心律32次/分, 头晕, 可以判定患者是三度房室传导阻滞。故选C。

319.(A1型题)下列因素最易导致心脏骤停的是

- A.高血压伴左室肥厚
- B.急性心肌梗死后左室射血分数降低
- C.甲状腺功能亢进症伴心房颤动
- D.纤维蛋白性心包炎伴心包摩擦音
- E.慢性支气管炎伴房性期前收缩

答案:B

解析:此题暂无解析

320.(A2型题)男, 47岁。突然神志丧失, 呼吸不规则, 即刻进行心脏按压, 判断其是否有效的主要方法是

- A.测血压
- B.呼喊病人看其是否清醒
- C.摸桡动脉搏动
- D.摸股动脉搏动

E.观察末梢循环状况

答案:D

解析:心肺复苏术判断是否有效的方法:施术者耳朵贴近患者鼻孔感觉气流,同时观察有无自主胸廓起伏,用时10秒,以判断呼吸功能恢复与否;施术者用示、中、环三指压于患者颈总动脉(甲状软骨上缘旁开两指处)或股动脉感受搏动,以判断循环功能恢复与否。故答案选D。其他各项都不是敏感方法。

321.(A1型题)恶性高血压与急进型高血压的区别要点是

A.眼底有无视乳头水肿

B.舒张压的高低程度

C.有无肾功能不全

D.有无心功能不全

E.有无脑功能障碍

答案:A

解析:高血压按起病的缓急和病程进展分为缓进型和急进型两类。急进型高血压是血压突然升高,并伴有视网膜病变(Ⅲ级眼底)。如呈Ⅳ级眼底,有视乳头水肿,则称为恶性高血压。急进型高血压(早期)和恶性高血压(晚期)是同一个发病过程的不同阶段。

322.(A1型题)治疗嗜铬细胞瘤所致的血压升高,首选哪种降压药

A.哌唑嗪

B.酚妥拉明

C.硝苯地平

D.β-受体阻滞剂

E.氨苯蝶啶

答案:B

解析:此题暂无解析

323.(A2型题)患者男,35岁。发现高血压7个月,未服药,改善生活行为后血压为140~150/90~95mmHg,心率56次/分。该患者治疗首选的药物是

A.维拉帕米

B.哌唑嗪

C.利血平

D.培哌普利

E.比索洛尔

答案:D

解析:降压药物归纳为五大类:①利尿剂;②β受体阻滞剂,心动过缓者不能用;③钙通道阻滞剂,维拉帕米抑制心肌收缩和自律性,本例不能用;④ACEI;⑤ARB。哌唑嗪和利血平是治疗高血压的二线药物,不作为首选。培哌普利是ACEI类药物,可以作为患者首选,故选D。

324.(A1型题)有关急性心肌梗死心肌损伤标志物的描述不正确的是

A.肌红蛋白起病后2小时内升高,12小时内达到高峰,24~48小时恢复正常

B.肌钙蛋白起病后6小时内升高,5~6天恢复正常

C.CK-MB起病后4小时内增高, 16~24小时达高峰, 3~4天恢复正常

D.AST在起病6~10小时开始升高, 3~6天恢复正常

E.LDH在起病6~10小时后升高, 1~2周内恢复正常

答案:B

解析:标志物包括肌红蛋白(Mb)、心肌肌钙蛋白(cTnI)和肌酸激酶同工酶(CK-MB)。急性心肌梗死时, 心肌肌钙蛋白cTnT和cTnI, 在心肌梗死后(3~6小时)血中浓度很快升高, cTnI于11~14小时达到高峰, 7~10天降至正常, cTnT于24~28小时达到高峰, 10~14天恢复正常, 故B是错的, 其余选项都是对的。故选B。

325.(A1型题)慢性冠脉病变不包括的是

A.稳定型心绞痛

B.冠脉正常的心绞痛

C.无症状心肌缺血

D.不稳定型心绞痛

E.缺血性心肌病

答案:D

解析:此题暂无解析

326.(A1型题)与急性心包炎相鉴别, 诊断急性心肌梗死的依据是

A.心电图ST段弓背向下压低

B.心电图ST段弓背向上抬高

C.无异常Q波

D.有心包摩擦音

E.持久的心前区疼痛

答案:B

解析:此题暂无解析

327.(A1型题)二尖瓣关闭不全与二尖瓣脱垂鉴别主要之点是

A.前者心尖部有全收缩期杂音

B.前者第一心音减弱

C.前者第一心音增强

D.后者少见

E.后者除收缩期杂音外, 心尖区常有收缩中期喀喇音

答案:E

解析:此题暂无解析

328.(A1型题)主动脉瓣狭窄引起心功能代偿反应最主要的是

A.心率加快

B.左心室肥厚

C.回心血量增加

D.左室腔扩大

E.肾滤过功能减低

答案:B

解析:此题暂无解析

329.(A1型题)风湿性主动脉瓣关闭不全最重要的体征是

- A.周围血管征
- B.抬举性心尖搏动
- C.主动脉瓣区第二心音减弱
- D.主动脉瓣区舒张期叹气样杂音
- E.主动脉瓣区收缩期吹风样杂音

答案:D

解析:此题暂无解析

330.(A1型题)亚急性感染性心内膜炎最常见的并发症是

- A.心力衰竭
- B.肾小球肾炎
- C.迁移性脓肿
- D.细菌性动脉瘤
- E.脑栓塞与脑脓肿

答案:A

解析:此题暂无解析

331.(A2型题)女, 28岁。发热半月, 弛张热型, 伴恶寒、关节痛。体检:皮肤瘀点、Osler结节, 心脏有杂音, 考虑为感染性心内膜炎。确诊的直接证据来自

- A.血液学检查
- B.心电图检查
- C.超声心动图
- D.免疫学检查
- E.细菌学检查

答案:E

解析:组织学可以直接取得病理标本, 病理学为绝大多说疾病诊断的金标准。血培养是诊断菌血症和感染性心内膜炎, 明确致病原的最重要方法。采血的时间并不一定限于高热时, 一般需分别采血3~5次。血标本应被置入特殊准备的培养基, 培养时间要一周以上。采血前已应用抗菌素的病人, 血培养阳性检出率下降40%左右。故选E。

332.(A2型题)女性, 24岁, 患风心病6年, 因不明原因发热2周, 拟诊合并感染性心内膜炎, 关于感染性心内膜炎, 下列哪项概念是错误的

- A.多见于瓣膜关闭不全者
- B.可发生于先天性动脉导管未闭者
- C.也可发生于原无器质性心脏病者
- D.可发生于二尖瓣脱垂者
- E.多见于瓣膜狭窄者

答案:E

解析:此题暂无解析

333.(A1型题)肥厚型梗阻性心肌病胸骨左缘的收缩期杂音变化下列哪项是正确的

- A.左室流出道狭窄加重时减轻
- B.屏气时减轻
- C.左室容积减少时增强
- D.增加心肌收缩力时减轻
- E.下蹲时增强

答案:C

解析:此题暂无解析

334.(A2型题)女性, 10岁, 诊断为重症心肌炎, 心脏听诊可能出现的特征性体征是

- A.开瓣音
- B.S2固定分裂
- C.钟摆律
- D.S1增强
- E.P2增强

答案:C

解析:钟摆律为心尖部第一心音性质改变, 音调类似第二心音, 心率快, 心室收缩与舒张时间几乎相等, 两个心音强弱相等, 间隔均匀, 有如钟摆的嗒声音, 故称钟摆律。若同时有心动过速, 心率120次/min以上, 酷似胎儿心音称为胎心律。主要由于心肌有严重病变, 心肌收缩无力, 第一心音的低钝性音调改变而似第二心音, 常见于心肌炎, 急性心肌梗塞等。所以本题选C。

335.(A2型题)患者男, 38岁。1年来活动后气促, 伴腹胀及双下肢水肿。自述既往无不适, 生活工作正常。查体:BP100/60mmHg, 颈静脉怒张, 双肺底可闻及湿性啰音, 心界向两侧扩大, S1减弱, 心尖部可闻及3/6级收缩期杂音, 肝肋下3cm, 双下肢凹陷性水肿。该患者最可能的诊断是

- A.扩张性心肌病
- B.风湿性心脏病
- C.缩窄性心包炎
- D.冠心病
- E.肥厚型心肌病

答案:A

解析:患者表现为全心衰, 并且心界往两侧扩大, 心尖部闻及3/6级收缩期杂音, 说明患者心腔扩大导致二尖瓣关闭不全, 故患者可能是扩张型心肌病或者是全心衰竭, 因为答案中没有全心衰竭, 故选A。

336.(A2型题)男, 20岁。低热、气促、腹胀14天。查体:心界向两侧扩大, 心尖搏动点位于左侧心界内侧, 心音低钝, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。肝肋下3cm。胸部X线片示:肺野清晰, 心影增大。心电图:窦性心动过速, QRS波群低电压, 广泛性T波低平。该患者最可能的诊断是

- A.缩窄性心包炎
- B.肥厚性心肌病

- C.急性心肌梗死
- D.风湿性心脏病
- E.急性心包炎

答案:E

解析:此题暂无解析

337.(A2型题)45岁男性,心前区持续性疼痛1周,查体:重病容。体温38.8°C,血压100/70mmHg,颈静脉怒张,心界向两侧扩大,心率120次/分,心音弱,心律整,无杂音,心电图I、II、III、avF、avL、V1至V5导联,ST段弓背向下抬高, T波倒置,最可能的诊断

- A.变异型心绞痛
- B.急性下壁广泛前壁心肌梗死
- C.中间综合征
- D.急性肺动脉栓塞
- E.急性心包炎

答案:E

解析:此题暂无解析

338.(A2型题)男,45岁休克病人,中心静脉压4cmH₂O,血压60/40mmHg,该病人可能

- A.血容量严重不足
- B.肾功能不全
- C.心功能不全
- D.肺功能不全
- E.容量血管过度舒张

答案:A

解析:中心静脉压(CVP)<5cmH₂O,说明血容量不足;5~10cmH₂O为正常;CVP>15cmH₂O提示心功能不全、静脉血管床过度收缩或肺循环阻力增高;CVP>20

339.(B型题)说明抗休克治疗时血容量仍不足的是

- A.尿量少, CVP很高
- B.尿量少, CVP较低
- C.尿量多, CVP很低
- D.尿量多, CVP正常
- E.尿量多, CVP偏高

答案:B

解析:此题暂无解析

340.(B型题)说明液体量已补充足

- A.中心静脉压很低,尿量多
- B.中心静脉压偏低,尿量多
- C.中心静脉压偏低,尿量多
- D.中心静脉压偏高,尿量多

E.中心静脉压很高,尿量少

答案:D

解析:此题暂无解析

341.(A2型题)男,35岁。右下肢疼痛1年。让其抬高右下肢80度,1分钟后下肢皮肤苍白,再让其下肢垂于床沿,大约1分钟后下肢皮肤颜色方恢复正常。该检查结果提示

A.Buerger试验阳性

B.下肢静脉通畅度(Trendelenburg)试验阳性

C.大隐静脉瓣膜和小腿交通支静脉瓣膜功能(Perthes)试验阳性

D.Prant试验阳性

E.Lasegue试验阳性

答案:A

解析:此题暂无解析

342.(A2型题)患者男,50岁。右腹股沟疝修补术后第5天,卧床,既往有脑血栓病史,体温38°C,右下肢皮温升高,自股部以下较左下肢明显增粗,无明显触痛。最可能的诊断是

A.切口感染

B.右下肢深静脉血栓形成

C.右下肢蜂窝织炎

D.右下肢丹毒

E.右股动脉栓塞

答案:B

解析:深静脉血栓形成是指血液在深静脉腔内不正常凝结,阻塞静脉腔,致静脉回流障碍。静脉损伤,血流缓慢和血液高凝状态是造成深静脉血栓形成的三大因素。本患者有手术史,血液处于高凝状态,术后长期卧床,静脉血流缓慢,且有脑血栓病史,在瓣窦内形成涡流,使瓣膜局部缺氧,引起白细胞黏附分子黏附,促使血栓形成,故选B。

343.(B型题)可出现Homans征阳性的疾病是

A.动脉硬化性闭塞症

B.雷诺综合征

C.下肢深静脉血栓形成

D.血栓闭塞性脉管炎

E.单纯性下肢静脉曲张

答案:C

解析:单纯性下肢静脉曲张可以通过高位结扎及剥脱术治疗,故题选E。Homans征即直腿伸踝试验。检查时嘱患者下肢伸直,将踝关节背屈时,由于腓肠肌和比目鱼肌被动拉长而刺激小腿肌肉内病变的静脉,引起小腿肌肉深部疼痛,为阳性,提示小腿深静脉血栓形成。故题选C。

344.(A1型题)关于细菌性肝脓肿的临床表现错误的是

A.肝肿大并有触压痛

- B.寒战、高热
- C.肝区胀痛
- D.胆囊肿大
- E.起病急

答案:D

解析:细菌性肝脓肿由化脓性细菌引起,经胆道感染最常见,临床表现为起病急、寒战高热、肝区肿大、胀痛,并有触压痛。最常见致病菌:大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。故本题答案为D。

345.(A1型题)关于肝硬化自发性腹膜炎,正确的描述是

- A.一般起病急,伴高热、寒战,剧烈腹痛,出现板状腹、反跳痛
- B.致病菌多为金黄色葡萄球菌
- C.易出现顽固性腹水
- D.治疗时应加强利尿治疗
- E.应进行腹水培养,待培养结果出来后有针对性应用抗生素治疗

答案:C

解析:自发性腹膜炎是肝硬化的严重并发症之一,由于门脉高压,导致内脏静脉充血和淋巴管扩张,产生腹水,多有顽固性腹水表现。肝硬化并发自发性腹膜炎起病不典型,可为隐匿起病,腹水中至大量,致病菌多为革兰阴性肠道菌群如大肠杆菌及部分革兰阳性肠道菌如粪球菌等。腹水细胞计数和细菌培养是自发性腹膜炎(SBP)的诊断依据。因肝硬化患者全身状况较差,自发性腹膜炎病死率较高,故在腹水培养结果之前就应经验性应用抗生素。所以本题选C。

346.(A1型题)原发性肝癌早期转移途径为

- A.肺内转移
- B.淋巴转移
- C.直接浸润转移
- D.肝内进行转移
- E.骨转移

答案:D

解析:此题暂无解析

347.(A1型题)目前肝癌早期宜采用哪一种治疗为主

- A.放射疗法
- B.化学疗法
- C.手术切除
- D.中医中药
- E.免疫疗法

答案:C

解析:此题暂无解析

348.(A2型题)45岁,女性。反复腹痛、发热、黄疸1年,近3天上述症状加重,高热黄疸不退。入院体温40°C,脉搏120次/分,血压70/50mmHg,该病人首选的治疗为

- A.大剂量抗生素治疗感染后择期手术

- B.全胃肠外营养后手术
- C.立即手术
- D.积极抗休克同时及早手术
- E.应用血管收缩剂, 血压升至正常后及早手术

答案:D

解析:患者中年女性,胆道疾病发作史一年,腹痛、高热、黄疸、休克征象(脉搏120次/分,血压70/50mmHg)首先考虑诊断急性梗阻性化脓性胆管炎。治疗原则为紧急手术解除胆道梗阻并引流,及早而有效地降低胆管内压力。通常采取的措施是联合适用足量有效的抗生素,纠正水电解质紊乱,恢复血容量,对症治疗,抗休克的同时及时行手术治疗(通常用胆总管切开减压、T管引流)。故选D。

349.(A2型题)女,31岁。腹痛、寒战、高热、黄疸反复发作3年。1天来上腹部持续性疼痛,伴阵发性绞痛,恶心,无呕吐。查体:T38.6°C,巩膜黄染,右上腹压痛(+),无反跳痛,胆囊大,Murphy征(+)。最佳处理措施是

- A.胆总管奥狄氏括约肌切开术
- B.胆囊造瘘术
- C.单纯胆囊切除术
- D.胆囊切除+胆总管探查T管引流术
- E.胆囊切除+胆总管十二指肠吻合术

答案:D

解析:病史及查体提示急性梗阻性化脓性胆管炎,泛指由阻塞引起的急性化脓性胆道感染,是胆道外科患者死亡最重要、最直接的原因,多数继发于胆管结石和胆道蛔虫病。最佳的方法为胆囊切除+胆总管探查T管引流术。故本题答案为D。

350.(A2型题)男,62岁。皮肤黄染进行性加重1个月。伴上腹胀、隐痛,食欲差、乏力,10天前感皮肤瘙痒,大便呈白陶土样。查体:消瘦,巩膜黄染,腹部稍胀,无明显压痛,未触及包块,胆囊无肿大。血AFP5 μ g/L。最可能的诊断是

- A.肝门部胆管癌
- B.胆囊癌
- C.胆总管下段癌
- D.肝癌
- E.胰头癌

答案:A

解析:胆管癌的主要临床表现为进行性加重的黄疸,大便呈陶土色,可伴有厌食、乏力、贫血皮肤瘙痒和体重减轻。该患者胆囊无重大证明胆囊空虚,胆总管不扩张,在肝门胆管区见到较小的软组织肿块,则肿瘤位于肝门部胆管,综上可知最可能的诊断是A。

351.(A1型题)患严重急性胰腺炎的病人不需要

- A.抗生素
- B.哌替啶
- C.液体治疗
- D.氯化钠
- E.钙

答案:B

解析:此题暂无解析

352.(A1型题)鉴别轻症和重症急性胰腺炎,下列哪项意义不大

- A.血清淀粉酶增高
- B.血钙降低
- C.血清正铁血蛋白阳性
- D.肋腹部及脐周皮肤出现紫色瘀斑
- E.发病后很快出现休克

答案:A

解析:血尿淀粉酶的高低与病变轻重不一定成正比。严重的坏死胰腺炎,腺泡破坏严重,淀粉酶值反而不高。

353.(A1型题)下述哪一项不是急性出血坏死性胰腺炎的特征性表现

- A.急性肾功能衰竭
- B.乳糜样腹水及胸水
- C.弥散性血管内凝血
- D.成人呼吸窘迫综合征
- E.血清正铁血白蛋白阳性

答案:B

解析:此题暂无解析

354.(A1型题)诊断低位肠梗阻最可靠的依据是

- A.腹部平片示小肠多个阶梯状气液平
- B.脐周可闻气过水音
- C.阵发性腹痛伴腹胀
- D.置胃管行胃肠减压后梗阻症状明显减轻
- E.频繁呕吐、呕吐量大

答案:A

解析:低位肠梗阻首选立位腹平片,有液气平面应考虑肠梗阻。故选A。

355.(A1型题)轮状病毒肠炎容易出现

- A.败血症
- B.脱水、酸中毒
- C.中毒性脑病
- D.肠穿孔
- E.高钠血症

答案:B

解析:轮状病毒是秋冬季婴儿腹泻常见的病原体,常为秋季腹泻。起病急,长伴发热和生呼吸道感染症状,无明显感染中毒症状。并发生呕吐,随后出现腹泻。常发生脱水、酸中毒及电解质紊乱。故选B。

356.(A1型题)克罗恩病的最常见并发症是

- A.中毒性休克

- B.结肠大出血
- C.肠梗阻
- D.急性肠穿孔
- E.癌变

答案:C

解析:克罗恩病的常见并发症有:①肠梗阻,最常见;②腹腔内脓肿,为其次常见;③吸收不良综合征;④偶可并发急性穿孔或大量便血;⑤直肠或结肠黏膜受累者可并发癌变。肠外并发症有胆结石、尿路结石及脂肪肝等。故选C。

357.(A1型题)诊断急性阑尾炎最有意义的体征是

- A.结肠充气试验阳性
- B.闭孔肌试验阳性
- C.右下腹固定压痛点
- D.直肠指诊右前方有触痛
- E.阑尾穴压痛阳性

答案:C

解析:右下腹压痛是急性阑尾炎最常见的重要体征。压痛点通常在麦氏点,可随阑尾位置的变异而改变。故选A。腰大肌试验阳性说明阑尾位于腰大肌前方,盲肠后位,或腹膜后位。闭孔内肌试验阳性提示阑尾靠近闭孔内肌。肛门指检,结肠充气试验可作为辅助诊断。

358.(A2型题)女性,54岁。诊断为急性坏疽性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎入院,行阑尾切除术。术后第5天腹胀、腹痛、发热,体温39°,大便4~6次/日,呈水样。肛门有下坠感,腹部有轻压痛,未触及肿块。首先应考虑并发症是

- A.急性肠炎
- B.阑尾残株炎
- C.门静脉炎
- D.肠间隙脓肿
- E.盆腔脓肿

答案:E

解析:阑尾切除术后并发症有:1、出血:阑尾系膜的结扎线松脱引起系膜血管出血,表现为腹痛、腹胀和失血性休克等症状;2、切口感染:是最常见的术后并发症,临床表现为术后2-3天发热,切口胀痛,局部红肿,压痛;3、粘连性肠梗阻:与局部炎症重、手术损伤、切口异物、术后卧床等多种因素有关;4、阑尾残株炎:表现为阑尾炎的症状;5、粪瘘:很少见。此患者术后腹胀、腹痛、发热,肛门有下坠感,腹部有轻压痛,未触及肿块,可以考虑是术后残株炎,炎症复发引起盆腔脓肿。故选E。

359.(A2型题)男,33岁。急性坏疽样阑尾炎手术后4天,出现尿频、尿急、大便次数增多、里急后重、发热。其最可能的并发症是

- A.急性肾盂肾炎
- B.盆腔脓肿
- C.肛周脓肿
- D.阑尾残株炎

E.急性膀胱炎

答案:B

解析:此题暂无解析

360.(A2型题)男性, 60岁, 2天前上腹持续性胀痛, 12小时后右下腹痛, 阵发加剧, 腹胀。近4年来常有饭前上腹灼痛, 常在冬春季发作。查体:38°C, 脉搏120次/分, 血压150/90mmHg。腹稍胀, 满腹有压痛, 但右下腹更明显, 有肌紧张及反跳痛, 肝浊音界存在, 肠鸣音未听到白细胞 $13 \times 10^9/L$, 中性88%。右下腹穿刺抽得黄色混浊液2ml, 镜检:脓细胞(++)高倍镜。最可能的诊断是

A.胃十二指肠溃疡穿孔

B.阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎

C.急性胰腺炎

D.绞窄性肠梗阻

E.伤寒肠穿孔

答案:B

解析:此题暂无解析

361.(A1型题)肛裂最突出的表现是

A.排便时和便后肛门剧烈疼痛

B.经常便秘

C.排便时粪便表面有血迹

D.便后鲜血滴出

E.肛门瘙痒

答案:A

解析:此题暂无解析

362.(A2型题)女性, 35岁。便血并排便不尽感半月就诊, 既往有内痔病史, 首选的检查方法是

A.大便潜血试验

B.直肠指检

C.直肠镜检

D.结肠镜检

E.钡剂灌肠检查

答案:B

解析:患者有内痔病史, 此次便血并排便不尽感考虑仍为内痔出血, 但需要排除直肠其他病变, 首选直肠指检。故选B。

363.(A2型题)患者男, 30岁。肛门周围胀痛伴发热3天。排便时疼痛加重。查体:肛门周围皮肤发红、压痛明显。最可能的诊断是

A.直肠后间隙脓肿

B.肛管括约肌间隙脓肿

C.骨盆直肠间隙脓肿

D.肛周皮下脓肿

E.直肠粘膜下脓肿

答案:D

解析:ABCE的脓肿都较深,一般早期不表现为肛门周围皮肤发红,并且压痛表现为深压痛或直肠指诊有触痛。只有肛周皮下脓肿早期便表现为肛周皮肤发红以及压痛。故选D。

364.(A2型题)男性,30岁,3年来间断性上腹痛,多在春秋发作。近10天又有上腹痛,晨呕血400ml,排柏油便4次,自觉头晕、心悸:BP13/8kPa(98/68mmHg),心率108次/分,肝脾未触及。H

- A.肝硬化食管静脉曲张破裂出血
- B.消化性溃疡出血
- C.急性胃粘膜损伤
- D.食道贲门粘膜撕裂症
- E.胃痛出血

答案:B

解析:此题暂无解析

365.(B型题)男,44岁。进硬食后,突然呕血约1000ml,色红,呕血呈喷射状,当时P120次/分, BP90/50mmHg,既往有慢性肝病史,平时常有肝区疼痛并伴有腹胀。

- A.食管静脉曲张破裂出血
- B.急性糜烂性胃炎出血
- C.反流性食管炎出血
- D.食管贲门黏膜撕裂综合征
- E.消化性溃疡出血引起下列各例患者消化道出血的病因最可能是

答案:A

解析:1.右上腹部节律性疼痛,进食可缓解,伴有泛酸为十二指肠溃疡的临床特点,黑粪提示上消化道出血。2.有慢性肝病史,由进食硬物引发,应考虑食管静脉曲张破裂出血。3.有服用非甾体抗炎药病史,可能为急性胃炎出血。4.泛酸、烧心、胸骨后烧灼感为胃食管反流性疾病的特点,既往有食管裂孔疝更支持此病的可能。

366.(A1型题)结核性腹膜炎的最主要病理类型是

- A.渗出型
- B.粘连型
- C.干酪型
- D.渗出型+粘连型
- E.粘连型+干酪型

答案:B

解析:此题暂无解析

367.(A1型题)关于腹膜的解剖生理,错误的是

- A.成人腹膜总面积可达2m²
- B.正常腹腔可有100ml液体
- C.腹腔有强大吸收力
- D.腹膜可分泌大量渗出液

E.脏层腹膜比壁层腹膜痛觉敏感

答案:E

解析:正常情况下,腹腔内有75~100ml黄色澄清液体,起润滑作用。腹膜向腹腔内渗出少量液体,内含淋巴细胞、巨噬细胞和脱落的上皮细胞。腹膜有强大的吸收能力,能吸收腹腔内的积液、血液、空气和毒素等。壁层腹膜主要受体神经的支配,对各种刺激敏感,痛觉定位准确;脏层腹膜受自主神经支配,来自交感神经和迷走神经末梢,对牵拉,胃肠腔内压力增加或炎症,压迫等刺激较为敏感,其性质常为钝痛而定位差。

368.(A1型题)继发性腹膜炎的病原菌,其中毒症状严重的原因因为

- A.金黄色葡萄球菌感染
- B.溶血性链球菌感染
- C.大肠杆菌感染
- D.各种细菌混合感染
- E.肺炎链球菌感染

答案:D

解析:引起继发性腹膜炎的细菌主要是胃肠道内的常驻菌群,其中大肠杆菌最为多见,其次为厌氧拟杆菌、链球菌、变形杆菌等,一般都是混合性感染,故毒性很强。原发性腹膜炎的致病菌多为溶血性链球菌、肺炎双球菌或大肠杆菌。故选D。

369.(A1型题)腹股沟斜疝患者疝还纳后,使肿物不再出现的压迫部位是

- A.海氏三角
- B.腹股沟韧带中点
- C.阴囊根部
- D.斜疝外环
- E.腹股沟韧带中点上方1.5cm

答案:E

解析:腹股沟斜疝疝块脱出路径为由内环经腹股沟管到外环,可坠入阴囊,内环的解剖位置是腹股沟韧带中点上1.5cm。

370.(A2型题)男性,59岁。因右腹股沟斜疝行手术治疗。术中发现疝囊壁的一部分由盲肠组成,此时的诊断为

- A.Richter疝
- B.Littre疝
- C.滑动疝
- D.难复性疝
- E.易复性疝

答案:C

解析:Richter疝指嵌顿的内容物仅为部分肠壁,又称肠管壁疝;Littre疝指嵌顿的是小肠憩室(通常是Meckel憩室);滑动疝指内容物不断进入疝囊时产生的下坠力量将囊颈上方的腹膜、盲肠(包括阑尾)、乙状结肠或膀胱推向囊内,称为疝囊壁的一部分。依据疝内容物容易回纳否,分为难复性疝和易复性疝。

371.(A2型题)女, 52岁, 肥胖。右腹股沟韧带下方卵圆窝处可见3cm×3cm半球状突起, 局部有胀痛感。平卧时突起可变小、变软, 但有时不完全消失。查体: 卵圆窝处咳嗽冲击感不明显。最常用的手术方式是

- A.Shouldice法
- B.Halsted法
- C.Bassini法
- D.Ferguson法
- E.McVay法

答案:E

解析:此题暂无解析

372.(A1型题)终末血尿, 常见的病变部位是

- A.膀胱颈部以上尿路病变
- B.肾脏
- C.膀胱三角区、后尿道病变
- D.尿道括约肌以上
- E.输尿管

答案:C

解析:因血尿行尿三杯实验时, 仅第三杯血尿为终末血尿, 提示病变多在膀胱或后尿道。故符合的答案为C。

373.(A2型题)患者女, 70岁。蛋白尿1个月, 尿蛋白6g/L, 尿蛋白电泳显示以小分子蛋白为主峰。其蛋白尿的性质为

- A.组织性蛋白尿
- B.溢出性蛋白尿
- C.肾小管性蛋白尿
- D.分泌性蛋白尿
- E.肾小球性蛋白尿

答案:C

解析:小分子蛋白质是从肾小球滤过, 然后绝大部分被肾小管重吸收, 但是肾小管出现了缺损会导致小分子蛋白质无法被重吸收, 尿液中出现大量的小分子蛋白质, 故这种蛋白质性质为肾小管性蛋白尿。故答案为C。

374.(B型题)慢性肾功能不全尿毒症时尿中常见

- A.透明管型
- B.蜡样管型
- C.上皮细胞管型
- D.白细胞管型
- E.红细胞管型

答案:B

解析:此题暂无解析

375.(A1型题)急性肾小球肾炎与急进性肾小球肾炎临床相似之处为

- A.中度贫血

- B.预后不佳
- C.以急性肾炎综合征起病
- D.肾功能急剧恶化
- E.早期出现急性肾衰竭

答案:C

解析:急性肾小球肾炎常简称急性肾炎。广义上系指一组病因及发病机理不一,但临床上表现为急性起病,以血尿、蛋白尿、水肿、高血压和肾小球滤过率下降为特点的肾小球疾病,故也常称为急性肾炎综合征。急进性肾炎为急性快速进展性肾小球肾炎的简称。它起病急骤,可在数日、数周或数月内肾功能急剧恶化,以少尿(无尿)性急性肾功能衰竭为多见。两者临床相似之处是均以急性肾炎综合征起病。所以本题选C。

376.(A1型题)血中补体水平下降一般不见于

- A.急进性肾小球肾炎
- B.膜性肾病
- C.系膜增生性肾小球肾炎
- D.狼疮肾炎
- E.急性肾小球肾炎

答案:A

解析:急进性肾小球肾炎血清补体水平正常,常伴有冷球蛋白血症。急性肾小球肾炎病程早期血总补体及C3均明显下降,6~8周后恢复正常,此规律性变化为本病的典型表现。血补体下降程度与急性肾炎病情轻重无明显相关,但低补体血症持续8周以上,应考虑有其他类型肾炎之可能,如膜增生性肾炎、冷球蛋白血症或狼疮肾炎等。所以血中补体水平下降一般不见于急进性肾小球肾炎。所以本题选A。

377.(A1型题)不属于促进慢性肾炎恶化因素的是

- A.肾脏基础病变活动
- B.高脂血症
- C.高蛋白质饮食
- D.高血压
- E.遗传因素

答案:E

解析:促进慢性肾炎恶化因素包括自身已有的肾脏疾病(如慢性肾炎)及其危险因素(如蛋白尿、高血压)等进行及时有效的治疗,还要对可能引起肾脏继发损害的疾病(如糖尿病、痛风、高血压等)和危险因素(如吸烟、高脂血症等)。遗传因素不是促进慢性肾炎恶化因素,故选E。

378.(A1型题)对激素治疗最为敏感的是

- A.微小病变型
- B.膜性肾病
- C.局灶性、节段性肾小球硬化
- D.系膜增生性肾炎
- E.系膜毛细血管性肾炎

答案:A

解析:此题暂无解析

379.(A2型题)女, 42岁。间断发热、腰痛伴尿频2年, 每次发作应用抗生素治疗可好转, 近半年来夜尿增多, 尿常规:尿比重1.015, RBC0~2个/HP, WBC3~5个/HP, 静脉肾盂造影, 见肾盂肾盏狭窄变形, 肾小盏扩张, 首先考虑的诊断是

- A.慢性肾炎
- B.肾积水
- C.肾囊肿合并感染
- D.慢性肾盂肾炎
- E.肾结核

答案:D

解析:此题暂无解析

380.(A2型题)患者女, 突发膀胱刺激症状伴血尿, 无发热及腰痛, 应先考虑

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.泌尿系结核
- D.膀胱结石
- E.膀胱肿瘤

答案:A

解析:急性膀胱炎的临床表现:症状有明显的膀胱刺激征, 尿频、尿急、夜尿增多、排尿烧灼感或尿痛。故选A。

381.(B型题)女, 突发膀胱刺激症状伴血尿, 无发热及腰痛, 应先考虑

- A.急性膀胱炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.泌尿系结核
- D.膀胱结石
- E.膀胱肿瘤

答案:A

解析:本题患者为老年男性, 无痛性肉眼血尿, 有血块, 应首先考虑膀胱肿瘤, 因其处于好发年龄, 同时症状又基本能排除急性膀胱炎、急性肾盂肾炎、泌尿系结核、膀胱结石, 故本题选E, 可排除其它选项。

382.(A1型题)关于急性膀胱炎, 下列哪项是错误的

- A.高热
- B.膀胱刺激症状
- C.发病急
- D.血尿
- E.急迫性尿失禁

答案:A

解析:此题暂无解析

383.(A1型题)急性肾盂肾炎的疗程通常是

- A.1周
- B.2周
- C.3周
- D.4周
- E.6周

答案:B

解析:此题暂无解析

384.(A2型题)男,35岁。近6个月常感腰骶部、双侧腹股沟及尿道前端痛,会阴不适,尿频,尿不尽感,晨起尿道口外有白色分泌物,尿常规(-),肛诊前列腺不大,质中,中央沟略浅,前列腺液镜检示:卵脂小体少量,白细胞30~40个/HP,诊断应考虑

- A.前列腺结核
- B.亚急性前列腺炎
- C.精囊炎
- D.慢性附睾炎
- E.慢性前列腺炎

答案:E

解析:此题暂无解析

385.(A1型题)肾结核单纯使用抗结核药物指征是

- A.静脉肾盂造影一侧不显影
- B.静脉肾盂造影一侧广泛破坏
- C.肾盂造影显示病变轻
- D.一侧肾钙化
- E.肾结核并结核性挛缩膀胱

答案:C

解析:此题暂无解析

386.(A1型题)泌尿男性生殖器结核原发灶多在

- A.肾
- B.输尿管
- C.膀胱
- D.附睾
- E.前列腺

答案:A

解析:此题暂无解析

387.(A1型题)肾结核X线检查主要靠

- A.腹部平片
- B.肾动脉造影
- C.肾盂造影
- D.肾断层造影

E.后腹膜充气造影

答案:C

解析:此题暂无解析

388.(A1型题)肾癌淋巴结转移最先到何处

A.主动脉旁淋巴结

B.腔静脉旁淋巴结

C.肾蒂淋巴结

D.腰淋巴结

E.髂淋巴结

答案:C

解析:此题暂无解析

389.(A1型题)泌尿系男生殖系肿瘤中哪个器官最常见

A.肾脏

B.膀胱

C.输尿管

D.睾丸

E.前列腺

答案:B

解析:此题暂无解析

390.(A1型题)睾丸肿瘤病检后诊为精原细胞瘤,其治疗方法应是

A.腹股沟淋巴结清除术

B.后腹膜淋巴结清除术

C.抗肿瘤药物治疗

D.深部放射治疗

E.性激素治疗

答案:D

解析:此题暂无解析

391.(B型题)输尿管梗阻最常见的原因是

A.结石

B.结核

C.肿瘤

D.狭窄

E.先天性后尿道瓣膜

答案:A

解析:此题暂无解析

392.(A2型题)男性,42岁,被车撞伤致骨盆骨折,不能排尿1天。查:抬入病室, BP 70/50mmHg, P120次/分,该患者入院后紧急治疗最好方法

A.尿道会师术

B.膀胱造瘘术

- C.抗休克治疗后膀胱造瘘术
- D.止痛止血镇静消炎
- E.尿道缝合术

答案:C

解析:此题暂无解析

393.(A2型题)男性, 28岁, 被车撞伤在左腰部, 伤后腰部痛, 全程血尿伴血块8小时。查:BP70/50mmHg, P120次/分, 左腰部包块季肋下5指并触痛, 经输血800ml, 血压仅上升到80/60mmHg, 尿色无改变, 左腰部肿块增大, B超为肾裂伤对侧肾正常, 该患者应立即采取最佳治疗方法

- A.快速输血补液
- B.经11肋间切口肾切除术
- C.经腹行肾切除术
- D.继续输血下经腹行肾切除术
- E.继续输血下经腹先阻断肾蒂探查肾脏, 根据情况采取肾修补, 肾部分切除或肾切除术

答案:E

解析:此题暂无解析

394.(A2型题)男, 21岁。骑自行车摔在右腰部, 伤后腰部痛, 无肉眼血尿。查:尿常规:红细胞充满/HP, 血压, 脉搏正常, 右腰部无包块, 但叩击痛, 诊断哪种损伤确切

- A.重度肾损伤
- B.肾挫伤
- C.中度肾损伤
- D.肾血管损伤
- E.输尿管损伤

答案:B

解析:此题暂无解析

395.(A2型题)患儿男, 1岁。B型超声检查发现左侧辜丸位于腹股沟管内, 经内分泌治疗10周后辜丸仍未下降到阴囊内。下一步治疗的最佳方法是

- A.观察
- B.左辜丸切除术
- C.继续内分泌治疗
- D.近期行左辜丸下降固定术
- E.3岁后行左辜丸下降固定术

答案:D

解析:本题较易做出诊断, 为隐辜症, 其治疗原则为:一岁以下有自行下降的可能可不予治疗, 一岁后不降可积极的内分泌治疗, 如还未下降可行辜丸下降固定术, 两岁以上未降入阴囊, 入对侧正常可予辜丸切除术。故选D。

396.(A2型题)男, 26岁, 右侧阴囊增大不适半年。检查肿块约2.0cm×2.5cm大小, 有囊性感, 无压痛, 平卧位不消失, 透光试验阳性。双侧睾丸附睾可清楚触及, 大小位置正常。应诊断为

- A. 睾丸鞘膜积液
- B. 睾丸肿瘤
- C. 腹股沟疝
- D. 精索鞘膜积液
- E. 阴囊橡皮肿

答案:D

解析:患者肿块囊性, 无压痛, 双侧睾丸附睾可清楚触及, 可排除睾丸肿瘤, A错; 平卧位不消失, 透光试验阳性, 可排除腹股沟疝, C错; 有囊性感, 无压痛, 透光试验阳性, 双侧睾丸附睾可清楚触及, 可排除阴囊橡皮肿, E错。精索鞘膜积液时, 睾丸、附睾被积液包裹, 体检时不能触及睾丸。故该患者应诊断为精索鞘膜积液, 故选D。

397.(A1型题)慢性肾功能不全, 血钾高于6.5mmol/L时, 最佳的治疗措施是

- A. 限制钾盐的摄入
- B. 口服聚磺苯乙烯钠
- C. 静脉注射10%葡萄糖酸钙
- D. 静脉注射碳酸氢钠
- E. 血液透析或腹膜透析

答案:E

解析:透析治疗标准:①急性肺水肿;②高钾血症, 血钾 $>6.5\text{mmol/L}$;③血尿素氮 $>21.4\text{mmol/L}$ 或血肌酐 $>442\mu\text{mol/L}$;④高分解代谢状态, 血肌酐每日升高 $>176.8\mu\text{mol/L}$ 或血尿素氮每日升高 $>8.9\text{mmol/L}$;⑤无明显高分解代谢, 但无尿2天以上或少尿4天以上;⑥酸中毒, 二氧化碳结合力 $<13\text{mmol/L}$, $\text{pH}<7.25$;⑦少尿2天以上, 伴有下列情况任何一项者:体液潴留, 尿毒症症状, 高血钾。患者血钾高于 6.5mmol/L , 故符合透析治疗的指证, 应行透析治疗。故选E。

398.(A1型题)慢性肾功能不全外周神经病变中较明显症状的表现是

- A. 弛缓性瘫痪
- B. 震颤
- C. 下肢不宁综合征
- D. 肌无力
- E. 偏身瘫痪

答案:C

解析:慢性肾功能不全或尿毒症、糖尿病引起的周围神经病变, 主要受影响的为感觉纤维, 表现为感觉缺失、感觉异常、感觉过度等。慢性肾功能不全周围神经病变时, 感觉异常表现明显, 睡眠中或安静时双下肢有不适感、蚁走感、蠕动感、胀麻感等, 引起不安腿综合征。通常不会出现震颤, 更少见偏身瘫痪。故选C。

399.(A1型题)慢性肾衰竭最常并发的电解质及酸碱平衡紊乱是

- A. 高钾血症、代谢性碱中毒
- B. 高钾血症、代谢性酸中毒

- C.低钾血症、代谢性酸中毒
- D.高钾血症、呼吸性酸中毒
- E.低钾血症、呼吸性碱中毒

答案:B

解析:此题暂无解析

400.(A1型题)维持子宫正常位置是

- A.盆底肌肉及筋膜的支托作用
- B.膀胱和直肠的支托
- C.子宫韧带和盆底肌肉筋膜的支托
- D.子宫四对韧带的作用
- E.腹腔压力作用

答案:C

解析:此题暂无解析

401.(A1型题)骨盆底的组成,下列哪项不正确

- A.骨盆底分内、中、外三层,中层又称尿生殖膈
- B.盆膈由肛提肌及其筋膜组成,是支托盆内脏器的最主要成分
- C.尿生殖膈由两层筋膜及一对会阴深横肌组成
- D.骨盆底外层包括肛门外括约肌
- E.会阴体不属盆底组成部分

答案:E

解析:此题暂无解析

402.(A1型题)下列哪项不是妊娠期子宫变化

- A.妊娠之初,子宫增大以前后径为最明显
- B.早期妊娠,子宫峡部变软最显著
- C.妊娠后期,子宫大多有不同程度右旋
- D.妊娠中期引起子宫肌壁逐渐增厚直至足月
- E.足月妊娠时子宫下段可伸长至7~10cm

答案:D

解析:此题暂无解析

403.(A1型题)雌激素水平低下的最常见症状是

- A.阴道干涩
- B.潮热
- C.情绪低落
- D.失眠
- E.月经稀少

答案:B

解析:雌激素低下主要出现以下四大症状:潮热,雌激素缺乏导致血管收缩舒张运动无功能状态;心悸;精神神经症状如焦虑抑郁烦躁易怒疲劳;腰酸背痛。故选B。

404.(A1型题)关于卵巢的功能,下述哪项是错误的

- A.卵巢分泌雌孕激素和雄激素
- B.新生儿的卵巢内含有300万多个原始卵泡
- C.妇女一生中有400个左右卵泡发育成熟而被排出
- D.卵巢每月有数个卵泡发育,但只有一个卵泡发育成熟被排出
- E.青春期有排卵并有月经来潮

答案:B

解析:胎儿期的卵泡不断闭锁,出生时约剩200万个,儿童期多数卵泡退化,至青春期只剩下约30万个。故选B。

405.(A1型题)雌激素的生理作用,下列哪项是正确的

- A.使宫颈口松弛,黏液分泌增加,稀薄,拉丝度增长
- B.使子宫肌纤维对缩宫素的敏感性下降
- C.使阴道上皮细胞脱落
- D.对下丘脑只有负反馈作用
- E.可升高胆固醇,不利于冠心病预防

答案:A

解析:此题暂无解析

406.(A1型题)围绝经期的特点中下述哪项是正确的

- A.围绝经期就是绝经期
- B.围绝经期卵巢中卵泡已耗尽
- C.围绝经期是无排卵功血的好发时期
- D.围绝经期一般是在55岁以上
- E.围绝经期是恶性肿瘤的好发时期

答案:C

解析:此题暂无解析

407.(A1型题)绒毛膜促性腺激素的分泌量达高峰的时间

- A.停经11~15天
- B.妊娠8~10周
- C.妊娠16周
- D.妊娠32~34周
- E.临产时

答案:B

解析:此题暂无解析

408.(A1型题)诱发排卵的药物不包括

- A.GNRH拮抗剂
- B.激动剂
- C.达那唑
- D.枸橼酸氯米芬
- E.绒毛膜促性腺激素

答案:C

解析:诱发排卵的药物有氯米芬、绒毛膜促性腺激素、黄体生成激素释放激素、溴隐亭(属多巴胺受体激动剂)。达那唑为合成的17 α -乙炔睾酮衍生物,抑制FSH、LH峰,抑制卵巢甾体激素生成并增加雌、孕激素代谢,直接与子宫内膜、孕激素受体结合抑制内膜细胞增生,最终导致子宫内膜萎缩,出现闭经,达那唑不是诱发排卵的药物。

409.(A1型题)妊娠期不参与母体乳腺发育的激素有

- A.雌激素
- B.孕激素
- C.促性腺激素释放激素
- D.甲状腺素
- E.垂体催乳激素

答案:C

解析:此题暂无解析

410.(A1型题)下列哪项不能作为确诊中期妊娠之依据

- A.听诊胎儿音清晰可闻
- B.自觉胎动
- C.扪诊有胎头浮球感
- D.B超声示有胎心及胎动反射
- E.B超示胎儿骨骼影

答案:B

解析:此题暂无解析

411.(A2型题)女,27岁,已婚。以往月经正常,因月经过期7天,前来就诊,要求明确是否怀孕,下列哪项检查对确诊帮助最大

- A.B型超声
- B.酶联免疫法测定 β -hCG
- C.基础体温
- D.宫颈粘液涂片镜检
- E.孕酮撤退试验

答案:B

解析:此题暂无解析

412.(B型题)胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系称为

- A.胎方位
- B.胎先露
- C.胎产式
- D.骨盆轴
- E.胎体轴

答案:A

解析:此题暂无解析

413.(A1型题)有助于判断中骨盆狭窄的重要指标是

- A. 骶耻外径
- B. 髂嵴间径
- C. 髂棘间径
- D. 坐骨结节间径
- E. 坐骨切迹宽度

答案:E

解析:坐骨棘间径10cm, 临界狭窄;8.5~9.5cm,相对狭窄;≤8.0cm,绝对狭窄, 选项E正确, 而选项A、B、C、D不正确。

414.(A1型题)过期妊娠时, 需立即终止妊娠的为

- A. 12小时内胎动12次
- B. NST反应型
- C. III度羊水粪染
- D. CT阴性
- E. B型超声显示羊水平面6cm

答案:C

解析:过期妊娠剖宫产指征:①胎动减少, NST无反应型而OCT或CST异常, 或胎心异常经治疗无效。②B超示羊水平面<3cm或指数<8cm提示羊水少, 或破膜时羊水粪染II~III度, 短期不能结束分娩者。③提示胎盘功能减退胎儿缺氧者。④合并妊娠高血压综合征者。⑤预计胎大(>4000g)或胎位不正者。故选C。

415.(A1型题)关于检查胎位四步触诊法的描述, 下列哪项是错误的

- A. 用以了解子宫的大小, 胎先露, 胎方位
- B. 第一步是双手置于宫底部, 了解宫底高度, 并判断是胎头还是胎臀
- C. 第二步是双手分别置于腹部两侧, 辨别胎背方向
- D. 第四步, 双手插入骨盆入口, 进一步检查先露部, 并确定入盆程度
- E. 第三步, 双手置于耻骨联合上方, 弄清先露部为头还是臀

答案:E

解析:此题暂无解析

416.(A1型题)枕左前位胎头内旋转动作是使胎头

- A. 矢状缝与入口径一致
- B. 矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径一致
- C. 矢状缝与中骨盆及骨盆出口横径一致
- D. 前囟转向耻骨弓下
- E. 后囟转向骶骨前方

答案:B

解析:内旋转:胎头到达中骨盆为适应骨盆纵轴而旋转, 使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致。故选B。

417.(A1型题)临产后, 肥皂水灌肠可用于

- A. 胎膜早破
- B. 胎头未衔接
- C. 胎位异常

D.初产妇宫口开大3cm

E.严重心脏病

答案:D

解析:初产妇宫口扩张 $<4\text{cm}$,经产妇 $<2\text{cm}$ 可进行肥皂水灌肠,既能避免分娩时粪便污染,又能刺激宫缩加速产程进展。但胎膜早破、阴道出血、胎头未衔接、胎位异常、有剖宫产史、宫缩强估计在1h内分娩及严重心脏病者不宜灌肠。

418.(A1型题)Bishop宫颈成熟度评分得2分的是

A.宫口开大4cm

B.先露位置-2

C.宫颈管消退80%

D.宫口位置后方

E.宫颈中等硬度

答案:A

解析:解析:此题暂无解析

419.(A2型题)初产妇,25岁,会阴侧切分娩体重3400g健康男婴。其正常产褥期的临床表现是产后

A.24小时体温 38.2°C

B.第1天宫底达脐下3指

C.1周血容量恢复至未孕状态

D.2周恶露开始转为浆液性

E.4周宫颈恢复至非孕时状态

答案:E

解析:产褥临床表现:①体温在产后24小时内略升高,一般不超过 38°C 。②子宫复旧:产后第1日因宫颈外口升至坐骨棘水平,致使宫底稍上升至平脐,以后每日下降 $1\sim 2\text{cm}$,产后10日子宫降到骨盆内。③产后宫缩痛。④恶露:血性恶露持续 $3\sim 4$ 日;浆液性恶露持续10日左右;白色恶露持续3周干净。⑤褥汗。⑥循环系统:血容量于产后72小时增加 $15\%\sim 25\%$, $2\sim 3$ 周恢复至未孕状态。⑦生殖系统变化:产后4周宫颈完全恢复至正常形态。故选D。

420.(B型题)产后7天,恶露血性,量多,宫底脐下两横指

A.正常产褥

B.上呼吸道感染

C.胎盘胎膜部分残留

D.产后子宫内膜炎

E.子宫复旧不良

答案:E

解析:此题暂无解析

421.(A1型题)有关Ⅲ度胎盘早剥的描述,正确的是

A.阴道流血量与贫血程度成正比

B.易导致凝血功能障碍

C.胎盘剥离面为胎盘面积的 $1/5$

D.出现无原因无痛性阴道流血

E.一般胎儿存活

答案:B

解析:此题暂无解析

422.(A1型题)重型胎盘早剥与先兆子宫破裂共有的表现是

A.剧烈腹痛

B.合并重度子痫前期

C.跨耻征阳性

D.子宫板状硬

E.出现病理性缩复环

答案:A

解析:重型胎盘早剥有起病急,剧烈腹痛、胎心变化、内出血休克等表现,可与先兆子宫破裂相混淆,但常有妊娠期高血压疾病病史,子宫呈板状硬,胎位不清,无病理性缩复环,B型超声检查可见胎盘后血肿,故A正确。跨耻征阳性提示头盆不称,C不正确。

423.(A1型题)妊娠合并风湿性心脏病,下列哪个体征是早期心衰的可靠诊断依据

A.心界扩大

B.心尖部闻及n级收缩期杂音

C.肺底部持续性湿啰音

D.休息时心率,110次/分

E.下肢凹陷性水肿I度

答案:D

解析:此题暂无解析

424.(A2型题)女,31岁,妊娠5个月。发现尿糖+,口服葡萄糖耐量试验结果:空腹血糖6.6mmol/L,2小时血糖10.6mmol/L。既往无糖尿病史。最可能的诊断是

A.肾性糖尿

B.糖尿病合并妊娠

C.妊娠期糖尿病

D.继发性糖尿病

E.其他特殊类型糖尿病

答案:C

解析:妊娠期糖尿病是指妊娠期初次发现任何程度的葡萄糖耐量减低或糖尿病,原来已有糖尿病而现在合并妊娠者不包括在内。该患者妊娠后出现空腹血糖6.6mmol/L,为空腹血糖受损。2小时血糖10.6mmol/L,为葡萄糖耐量减低。既往无糖尿病史,考虑为妊娠期糖尿病。

425.(A1型题)下述哪项不是抢救羊水栓塞的措施

A.抗循环衰竭

B.抗呼吸衰竭

C.纠正DIC及继发纤溶

D.在第一产程者应加强催产素应用,促使其尽早分娩

E.在第二产程发生者可根据情况经阴道助产

答案:D

解析:此题暂无解析

426.(A2型题)初孕妇, 25岁, 妊娠40周, 入院前1日出现不规律子宫收缩, 入院24小时后静滴缩宫素引产, 第1产程5小时, 第2产程10分钟, 胎儿娩出后2分钟, 产妇突然出现寒战, 咳嗽, 发绀, 血压60/40mmHg, 随后阴道流血不止, 立即配血进行抢救。最可能的诊断是

A.缩宫素过敏

B.羊水栓塞

C.急性肺栓塞

D.心源性休克

E.子宫收缩乏力性出血

答案:B

解析:该产妇使用缩宫素静滴引产, 胎儿娩出2分钟, 产妇突然出现寒战, 咳嗽, 发绀, 血压60/40mmHg, 提示发生了羊水栓塞。

427.(A1型题)女性, 35岁。腹痛, 腹部肿块伴发热1周。不孕症10年(原发), 查:T38.5°C, 消瘦, 心肺(-)

), 下腹部可触及质韧肿块, 压痛(+), 活动欠佳。妇检:子宫常大, 偏右, 于子宫左可及新生儿头大肿块, 触痛(+). 曾用抗生素一周, 体温及症状无缓解, 如何处理:

A.抗生素静脉、肌肉同时给药

B.抗生素应用的同时剖腹探查行脓肿切除或切开引流术

C.立即剖腹探查

D.应用退热药(激素等)并手术治疗

E.经阴道穿刺排脓

答案:B

解析:此题暂无解析

428.(A1型题)外阴硬化苔藓型营养不良的治疗, 目前不主张采用的方法是

A.口服脱敏药物

B.手术治疗

C.禁用刺激性药物擦洗

D.激光治疗

E.局部用药

答案:B

解析:外阴硬化苔藓型营养不良治疗主要有以下几种方法。①消除诱因:对伴有糖尿病、滴虫性或真菌性阴道炎者等, 应行治疗。少食辛辣食物, 保持外阴清洁, 避免肥皂擦洗、搔抓及使用有刺激性药物。可服多种维生素及镇静、脱敏药。②局部用药:以止痒、消炎、润肤和改善局部营养为目的。③激光治疗:激光治疗硬化苔藓型营养不良, 有止痒之效, 促进溃破创面愈合及改善局部血供。而不主张手术治疗。

429.(A1型题)腹痛1天诊断为卵巢瘤蒂扭转, 错误的处理是

- A. 一经确诊即应手术
- B. 避免术中将肿瘤弄破
- C. 行肿瘤剝出术
- D. 术时应 在蒂根部下方钳夹
- E. 取下肿瘤应切开检查并送病理

答案:C

解析:蒂扭转一经确诊,应尽快行剖腹手术,术时应 在蒂根下方钳夹,将肿瘤和扭转的瘤蒂一并切除,钳夹前不可回复扭转,以防栓塞脱落,故选项C正确,选项A、B不正确。术中避免将肿瘤弄破,避免污染腹腔,选项D不正确。切除的标本送病理学检查,依据术中冰冻检查确定的病理类型,决定手术范围及术后辅以相应的化疗和放疗,选项E不正确。

430.(A1型题)绒毛膜癌与侵蚀性葡萄胎主要的鉴别依据是

- A. 尿HCG阳性
- B. 病理检查无绒毛结构
- C. 有卵巢黄素化囊肿
- D. 胸部X线片有棉团状阴影
- E. 阴道有紫蓝色转移结节

答案:B

解析:侵袭性葡萄胎镜下见侵入肌层的水泡状组织形态与葡萄胎相似,但可见绒毛结构与滋养细胞增生和分化不良。绒癌镜下特点为细胞滋养细胞和合体滋养细胞不形成绒毛或水泡状结构成片高度增生、排列紊乱,并广泛侵入子宫肌层并破坏血管造成出血坏死。依靠有无绒毛鉴别。故选B。

431.(A1型题)宫颈活组织检查的病理结果为鳞状上皮化生,提示

- A. 轻度异型性
- B. 不属于异常增生
- C. 不典型增生
- D. 原位癌
- E. 癌前病变

答案:C

解析:化生是一种分化成熟的细胞为另一种分化成熟的细胞所替代的过程。化生的组织对有害的局部环境因素抵抗力增加,但失去了原有正常组织的功能,局部的防御能力反而削弱,化生是一种异常的增生,如果刺激因素长期存在,则可发生恶变,鳞状上皮化生是一种可逆性改变,为不典型增生,选项C正确。

432.(A2型题)患者女,42岁。人工流产术后2年,阴道断续流血6月余,近日出现咳血丝痰。血 β -hCG为13000U/L,胸部X线片示肺部多个结节。首选的治疗方法是

- A. 肺叶切除+子宫切除术
- B. 放射治疗
- C. 肺叶切除术
- D. 化学治疗
- E. 子宫切除术

答案:D

解析:根据葡萄胎排空后或流产史,足月分娩、异位妊娠后出现不规则阴道流血和转移灶及相关症状体征,考虑妊娠滋养细胞肿瘤,结合hCG测定,临床诊断即可确诊。治疗原则为化疗为主手术和放疗为辅。故选D。

433.(A2型题)女,32岁。停经90天,阴道不规则流血6天,下腹隐痛。妇科检查:宫底平脐,质软,未触及胎体,未闻及胎心。尿妊娠实验阳性。应首先考虑的诊断是

- A.羊水过多
- B.先兆流产
- C.死胎
- D.葡萄胎
- E.稽留流产

答案:D

解析:此题暂无解析

434.(B型题)米非司酮作用机制

- A.高效孕激素疗法
- B.假孕疗法
- C.假绝经疗法
- D.孕激素受体水平拮抗剂
- E.药物性卵巢切除疗法

答案:D

解析:此题暂无解析

435.(B型题)II、III度子宫脱垂,年轻、宫颈较长,需保留生育功能者

- A.阴式子宫全切术及前后壁修补术
- B.Manchester手术
- C.纯阴道前后壁修补术
- D.阴道纵隔成形术
- E.腹式子宫全切术

答案:B

解析:此题暂无解析

436.(A2型题)某妇,30岁,原发不孕3年,月经5~6天/20+~50+天,量中等,无痛经,妇查未发现特殊异常。进一步检查应首选

- A.输卵管通液
- B.B型超声
- C.性交后试验
- D.X线腹部平片
- E.经前或见红12小时内诊刮

答案:E

解析:此题暂无解析

437.(B型题)绝对不孕

- A.凡婚后未避孕,有正常性生活,同居2年以上而未妊娠者

- B.婚后未避孕且从未妊娠者
- C.曾有过妊娠而后来未避孕连续2年不孕者
- D.夫妇一方在先天或后天解剖生理方面的缺陷,无法纠正而不能妊娠者
- E.夫妇一方因某种原因阻碍受孕,导致暂时不孕,一旦得到纠正仍能受孕者

答案:D

解析:此题暂无解析

438.(A1型题)口服铁制剂治疗缺铁性贫血,待血红蛋白正常后,还需继续服用铁剂的时间是

- A.3~7天
- B.1~2周
- C.3~4周
- D.4~6个月
- E.6个月~1年

答案:D

解析:铁剂用于治疗缺铁性贫血,疗效甚佳。口服铁剂1周,血液中网织红细胞即可上升。10~14天达高峰,2~4周血红蛋白明显增加。但达正常值需1~3个月,为使体内铁贮存恢复正常,待血红蛋白正常后,尚需减半量继续服药2~3个月。故选D。

439.(A1型题)阵发性睡眠性血红蛋白尿特异性的诊断依据为

- A.红细胞寿命缩短
- B.Coombs试验(+)
- C.尿含铁血黄素试验(+)
- D.Ham试验(+)
- E.网织红细胞增高

答案:D

解析:Ham试验即酸化血清溶血试验。该试验原理是由于阵发性睡眠性血红蛋白尿时,病态红细胞在pH6.4的条件下易被替代途径激活的补体溶解,而正常红细胞不被溶解,无溶血现象。本实验对阵发性睡眠性血红蛋白尿的诊断有较强的特异性。故选D。

440.(A1型题)中枢神经系统白血病发病机制是

- A.进入脑组织的白血病细胞对化疗药耐受
- B.化疗方案不彻底,不能杀死白血病细胞
- C.多数化疗药物,不能透过血脑屏障
- D.化疗不够早,白血病细胞大量繁殖
- E.患者个体差异

答案:C

解析:此题暂无解析

441.(A1型题)治疗中枢神经系统白血病首选药物是

- A.长春新碱
- B.环磷酰胺

- C.三尖杉酯碱
- D.6-巯基嘌呤
- E.甲氨蝶呤

答案:E

解析:甲氨蝶呤是最早应用于治疗白血病的有效药物,尤其是中枢神经系统白血病。鞘内注射甲氨蝶呤对预防和治疗脑膜白血病具有重要意义。该药物中枢神经系统不良反应有头痛、轻度偏瘫、麻痹症等。故选E。

442.(A1型题)下列治疗组合正确的是

- A.急性再障--雄激素
- B.MDS--手术治疗
- C.缺铁性贫血--输血
- D.遗传性球形细胞增多症--脾切除
- E.白血病--放疗

答案:D

解析:本题属于综合性考点,是今年命题趋势之一。①再障的治疗是雄激素,但是急性再障的治疗首选是免疫抑制剂治疗,首选抗胸腺细胞球蛋白(ATG),故A项错误。②MDS目前尚无满意治疗,常用治疗有支持、促造血、诱导分化、联合化疗、异基因干细胞移植等,故B项错误。③缺铁贫治疗是补充铁剂,故C项错误。④白血病的治疗主要是化疗,而不是放疗,故E项错误。⑤遗传性球形细胞增多症是红细胞膜的缺陷,导致红细胞变形、脆性减低,通过脾时易被破坏。所以切除掉异常红细胞破坏场所是主要的治疗方法。

443.(A1型题)迷走神经的耳廓凹面躯体感觉纤维中枢支终止于

- A.下涎核
- B.迷走神经背核
- C.三叉神经脊束核
- D.疑核
- E.孤束核

答案:C

解析:迷走神经的躯体感觉纤维分布于外耳道及耳廓凹面的一部分皮肤(耳支),终止于三叉神经脊束核。故选C。

444.(A1型题)一侧丘脑梗死多导致

- A.偏身抽动
- B.智力下降
- C.偏身无力
- D.偏身麻木
- E.偏身投掷

答案:D

解析:丘脑病变时,可产生丘脑综合征,包括对侧偏身感觉障碍、对侧偏身自发性疼痛、对侧偏身感觉过敏或感觉过度、对侧面部表情运动障碍、对侧偏身不自主运动。偏身麻木为偏身感觉障碍,故选D。

445.(A1型题)原发性与继发性三叉神经痛的鉴别主要依据是

- A.疼痛时间的长短
- B.疼痛发作的频率
- C.有无面部痛觉障碍,角膜反射有无改变
- D.有无触发点或扳机点
- E.疼痛的范围

答案:C

解析:此题暂无解析

446.(A1型题)格林-巴利综合征(现改称"古兰-巴雷综合征")的典型临床表现之一为四肢远端

- A.感觉障碍比运动障碍明显
- B.感觉和运动障碍均十分严重
- C.仅有感觉障碍
- D.疼痛明显
- E.感觉障碍比运动障碍轻

答案:E

解析:格林-巴利综合征好发于儿童和青少年,多数病前1~4周有胃肠或呼吸道感染史。肢体对称性弛缓性瘫痪,通常自双下肢开始,近端较明显。严重者可出现四肢完全性瘫、呼吸肌和吞咽肌麻痹。腱反射减低或消失,可有肌萎缩。感觉主诉通常不如运动症状明显,但较常见,多为感觉异常,30%有肌肉痛。少数出现脑神经麻痹的症状。自主神经功能紊乱症状较明显。故本题答案选E

447.(A1型题)治疗急性脊髓炎首选药物是

- A.抗生素
- B.维生素
- C.皮质类固醇激素
- D.神经生长因子
- E.血管扩张剂

答案:C

解析:此题暂无解析

448.(A1型题)颅底骨折通常的诊断依据是

- A.脑脊液鼻,耳漏
- B.头痛伴呕吐
- C.偏瘫
- D.头皮血肿
- E.昏迷

答案:A

解析:颅底骨折的临床表现主要有:耳、鼻出血或脑脊液漏;脑神经损伤;皮下或黏膜下瘀斑。故本题选A。

449.(A1型题)关于头皮裂伤,错误的是

- A.钝性撞击不会发生裂伤

- B.急救时应立即包扎止血
- C.24小时的裂伤清创后可一期缝合
- D.清创后,采用分层缝合为好
- E.头皮缺损应予修补

答案:A

解析:此题暂无解析

450.(A1型题)对频繁发作的短暂性脑缺血发作,应该应用的治疗是

- A.华法林
- B.阿司匹林
- C.噻氯匹定
- D.噻氯匹定加双嘧达莫
- E.尼莫地平

答案:A

解析:TIA是神经科的急症,应予以足够的重视,及早治疗以防发展为脑卒中。其治疗药物包括抗血小板聚集药、抗凝血药、钙拮抗剂等。抗血小板聚集药包括阿司匹林、噻氯匹定、双嘧达莫等,可以用来防止血栓形成,减少TIA的复发;TIA患者经抗血小板治疗,仍频繁发作者,考虑抗凝治疗,常用药为肝素或华法林;钙拮抗剂如尼莫地平能阻止细胞内钙超载,防止血管痉挛,增加血流量,改善微循环。故选A。